

PETRI PAAW

Amsteldamensis

SVCCENTVRIATVS ANATOMICVS.

continens

Commentaria in Hippocratem, de
CAPITIS VVLNERIBVS.

additæ

In aliquot Capita libri VIII. C. Celsi
Explicationes.


*Ad Illustres, Nobiles, Prepotentes, ac verè
Magnificos*

HOLLANDIÆ WESTFRISIÆQVE
ORDINES.



LVGDVNI BATAVORVM,
Apud IODOCUM à COLSTER.

Ann. cId Id cxvi.





PETRUS PAAW MED. DOCT ANATOMICUS
ET BOTANICUS PROFESS. ACAD. LUGDUNOBAT

DOMINI



Alterum hoc ingenij artis-
que meæ monumentum, pu-
blico nunc damus, in
scriptum consecratumque in-
clyto nomini vestro. meri-
to sane, quum ipso titulo vo-
bis respondeat. Spectate Au-
thorem quem explico: is est Hippocrates Cōs
Princeps Facultatis nostræ, & ut verbo dicam, na-
turæ magnum quid parturientis miraculum. Spe-
ctate argumentum; id vero est de Vulneribus ejus
partis quæ in nostro corpore prima est & prin-
ceps, quæque sola pro ipso homine usurpatur.
Hæc talia ad quos iustius quam ad vos irent, Prin-
cipes & Capita Reip: nostræ? quique domi mili-
tiæque, in toga pariter & sago capitis malis peric-
ulisque succurritis. Nam si castra movenda sint,
prima hæc cura est, capiti ut bene fiet. Si à Mar-
tio tumultu ad pacem vocamur (fruihur ea ve-
stris auspicijs, & velis ô Pacis author, diu, fruamur)
non minora sunt vobis à capite oblato discrimi-
na. quo fit ut in ipsa etiam quiete turbetur quies
* ij publi-

publica. Videre est quotidianos conflictus capito-
num quorundam belluinâ rabie seinvicem peten-
tium. Quot se undique offerunt capite læsi? quot
quibus capitis diminutione vel maximâ, vel me-
dia, vel minima opus esset, si jure Romano vive-
retur. Quam multi (fas sit dicere quod res est)
lucem hanc aspicerent, si debitè tractata fuissent
capitis vulnera ab ijs qui sibi hoc sumunt? Ma-
teria igitur & argumentum ad vos ibant. Cur
autem per me illud vobis non offerretur? Alexan-
drum illum verè magnum, initâ contra Persas
expeditione, priusquam classem conscenderet,
ferunt amicis, huic quidem agros, alteri pagum,
alijs vectigalia dilargitum; Perdiccæ verò inter-
roganti, quidnam sibi retineret, spem respondit.
Mihi à vobis eandem vocem audire videor. quid
non ab ijs sperem Dominis, quos studiorum
novimus mæcenates? qui huic fini Academiae no-
stræ fundamina posuistis. in quâ à nobilissimis
Curatoribus tot jam annis (lustra aliquot nume-
ro) stationem nactus, ita eam colui hætenus, mi-
hi ipsi uti satisfecerim non solum, verum insuper
quid illo annorum decursu præstiterim, nobilif-
simis Curatoribus primum, nunc etiam vobis,
Potentes Domini, velut rerum mearum rationes
offerre reddereq; ausim. Absit confidentia, absit
jactan-

jaſtantia (ab hiſce vitijs immunem me norunt, qui me norunt) curſum meum abſolvi. Quidquid in Anatomicis, Botanicis (hæc duo mihi impoſita) addo & Chirurgicis, dici doceri poteſt, eorum nihil à me neglectum. quid ultra? redit quotannis labor actus in orbem. quibus ſatisfactum ſtudioſi abeunt, ſuccedunt alij, quibus eadem inſtillanda. Ea quotidianis litteris à varijs expoſcuntur. parere ſtatui, confidens, ſcholæ veſtræ inde emolumenti aliquid accedere poſſe. Inter primos, notis noſtris explicatius prodit hic Author: cujus ſi quis brevitatem conſideret; ſi obſcuritatem, Interprete indigere judicabitur. Preſſa illi dictio eſt, interdum etiam abrupta, alicubi verò ita obſcura Delio uti natatore indigeat. Mirari ſane non infrequenter ſoleo Scriptoris hujus ſtylum; qui ſi non aliter loquutus fuit quàm ſcripſit, quis virum loquentem intellexit? fugerint ante verba neceſſe eſt quàm fuerint percepta ab Auditoribus. qui ſi in ijs expendendis animum intenderint quæ adhæſerant, fieri non poteſt, quin prætermiſerint cætera. Vix hodie illius omnia exactè capimus, quin collectis animi copijs hæremus in ſingulis. & putamus volantia ipſius verba inter docendum in illâ orationis brevitate potuiſſe intelligi? ſed voluit vir graviſſimus, & non ſui

solum, sed cujusvis ævi princeps, lectoris ingenium brevitate illâ & obscuritate excitare; quod jaceat langueatque oportet ubi omnia oggeruntur. Pungit suaviter mentem discientium scriptio-
nis brevitatis: irritat torpentem animum modera-
ta obscuritas. Etiam ab arcanis graviorum scien-
tiarum excludit eos qui vel à naturæ imbecilli-
tate, vel à propriâ ignaviâ hoc habent ut non pos-
sint nisi apertissimè dicta intelligere. Hunc ita-
que Authorem excutiendum sumsi, ea tractan-
tem, mihi quæ convenire videbantur. Quorsum
namque traduntur Anatomica nulla si inde speretur
utilitas? si quis ostentationis tantum causa (&
quî possint aliter, qui turgidis buccis Anatomica
crepant; eaque se scripturos pollicentur, quum
manum operi admoverint nunquam, me verò se-
cantem nisi cum fastidio non viderint) ea proferat
quæ domi nata, apud alios lecta, ipsi intellecta
nondum; hic per me licet, quod olim luscinia au-
diat.


Vox es, præterea nihil.

Et tamen ejuscemodi homuncionum ferax ad-
modum hæc ætas. quæ non capiunt carpunt, imo
quæ capiunt carpunt tamen; animi malitiâ, addo
impotentiâ, ingenijq; livore in Authorem quàm
ejus scripta (ut quorum mentem non assequun-
tur fa-

tur satis) potius affecti. Contrà horum malevolentiam patrociniū à nominis vestri celebritate, quin & auxilium à vestro peto splendore. Potentes auditis, verèque estis Domini, ne mihi quæso denegetur potentia vestra clypeus. Ita animus mihi dabitur elaborandi porro quæ Reipublicæ usui, Aca-
demia etiam honori futura spero. Deus opt. max. consilia vestra in Academia & Reipublicæ commodum dirigat ac fœlicitet,



PETRI



IN HIPPOCRATEM

De Vulneribus Capitis.



Natomicis scriptis fundamentum ab ipso corporis posui fundamento, edito de ossibus Tractatu. Is quot, & quæ sint humani corporis ossa, explicuit, quam acceperint figuram, quem positum, quamque ad se invicem connexionem; quem denique præstent homini usum. SVCCENTVRIATVM nunc subjungo, non naturales ossium adfectiones prosequentem, ac quænam ipsis debeatur medela. Adfectionum illarum aliæ sunt, substantiam ossium quæ infestant; ut sunt Caries, Fractura. Aliæ situm, ut Luxationes, Laxationes, Disiunctiones, Contorsiones. Aliæ figuram, unde Gibbi fiunt, Vari, Valgi, Vatiij, Loripedes, Silicernij, Macrocephali, Oxycephali. Initium facio ab affectibus, capitis ossa affligentibus, utpote qui frequenter incidunt, qui que nisi dextrè manus adhibeatur, difficultatis non parum secum trahere solent, tracto in consensum cerebro, parte principe, ipsis

affinitate iuncto. Nullo non mali genere illa corripì possunt: Dislocata etenim iure dixeris, in illa fracturæ Cranij specie quæ ἐσλφασις Hippocrati dicitur; Latini Introcessionem vocant: in Figura vitium pati, quum θλάσις corripuntur, Depressionem dixeris, apparente exterius in cranio lacuna. At verò potissimum ac ex instituto, de ijs substantiam ossium Cranij qui petunt agetur affectibus; ejuscemodi præcipuè ab externâ eaque violentâ qui originem sumunt causâ. Fit namque subinde, Carie uti substantia ossium corripatur, idque vel ab ambiente aëre, aut etiam pinguium similiumque topicorum, quibus cum ossibus inimicitia, usu. De his per occasionem etiam agetur, verum datâ operâ de Cranij Fracturis, affectibus summam difficultatem secum trahentibus; qui-que non paucas secum trahunt indicationes quas alia non habent vulnera. Vt non frustra à Veteribus dictum sit, *nullum capitis vulnus parvis faciendum, aut leviter perfunctorie tractandum.* quid enim? non infrequenter, dum maximè arrident, tum insidias vel maximè struunt; apoplexias, convulsiones, phrenitides nihil minus cogitante medico.

medico excitant. Præter alia ossa id peculiare cranio, facillimè quod inflammetur, ob medullæ, credo, copiam. ut non dicam quantum juris ambienti aëri, sit in Cranium. ut alias taceam causas, quarum censum sequentia dabunt. In capitis Fracturis nobis præbit Hippocrates, magnus ille naturæ Genius, multorum bonorum Parens, uno verbo, vir divinus. vel eò magis, non pauca quod in quotidianâ vulnerrum capitis curatione irrepsisse animadvertam, quæ hoc ipse scriptum redarguit, quæque idcirco non corriguntur, quia divinum hunc senem multi non legunt, idque quia non intelligunt. nos ei lucem dare conabimur, excussuri quidquid ab eo traditur; id ipsum firmis stabilituri rationibus, difficultates (quæ sane occurrent non paucae) ipso duce conciliare adnitemur, sicq; Hippocratem per ipsum conabimur explicare Hippocratem. Quem hujus libri esse Authorem à nonnullis dubitari miror: quum spurij, quodq; genium Hippocratis non referat, contineat nihil. Hunc Galenus pro genuino ubique agnoscit, uti cap. 6. lib. 6. meth. med. & comm. 2. in 3. Epid Aph. 1. Etiam proëmio

Comment. 4. in Hipp. de Vict. rat. in morb. acut. è quo non pauca Celsus citat, & quidem verbotenus in sua scripta transfert, uti volenti videre est cap. 4. lib. 8. Etiam Erotianus, recensens Hippocratis libros, inter χειρουργόμενα hunc refert; titulum tamen ei tribuens non Ionica dialecto *πεὶ τραμάτων*, verum *πεὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τραμάτων*.

Ἱπποκράτης

πεὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τραμάτων.

Per *τῆς κεφαλῆς* vocem non hic caput universum omnesq; tam externas quàm internas sive continentes contentasq; intelligit partes, sed solummodo Solutiones continui Cranii, sive capitis ossei. Quod notatu non indignum, vel ob eos qui ab Hippocrate hoc loco requirunt explicationem vulnorum Pericranij, Perioftij, Musculorum frontis, Temporum, Menyngum, imò & ipsius Cerebri. Mens ipsi solummodo est, caput osseum prosequi, quamvis hac occasione de vulnere Pericranij, tum & duræ menyngis mentionem injiciat. facit id Tractatus ratio, rerumq; affinitas, uti suo loco videbimus. Hac de causâ Celsus eandem hanc rem
perfe-

persequuturus cap. 4. lib. 8. capiti titulum facit, *De Calvariae Curatione*. Vbi sciendum, Calvariae vocem significare Osteologis, tam universum caput osseum, quod κεφάλιον à figurâ usûque Græci; quàm convexam solummodo Cranij partem, quâ primum calvescere homo conspicitur. Postremâ hac significatione κεφαλῆς vocem propriè hic sumit Hippocrates; expositurus modum rationemque quâ tractari debeant ossis frontis, occipitis, ossiumque syncipitis vulnera, nam illa quatuor calvam constituunt. Mentio tamen etiam hoc fiet libro vulnerum Temporalium seu Petroforum ossium; quum vix fieri possit, ut lædantur syncipitis ossa ijs, illæsis. ut non dicam, in Resonitu seu Contrassurâ, eadem ossa interdum offendi. *ὡς τῶν ἰσχυμάτων*. Per *τῶμα* non intelligit quamcunque continui solutionem quam incurrere cranium potest, verùm eam solummodò quam externa causa eaque violenta excitavit. non enim de Carie se acturum pollicetur. ipsam inspicere Græcam voculam *τρώμα* namque & Ionicè *τῶμα*, à *τρίωσκειν* deducitur; quod significat divellere, violenterq; distrahere; cum contrà *τρήδαν*, Caries, continuum

ossis solvat non violenter, sed paulatim, obscure; agnoscatque ut plurimum internam causam. Non me latet Gal. Comm. 2. in lib. de Artic. notare Græcos per τραῦμα & vocem intelligere generaliter quascunque læsiones, etiam citra vulnus incidentes. Ita τραῦμα, læsa, malè affecta; & τραῖν, lædere, offendere exponit Gal. in exegesi Vorum Hippocraticarum. Sed alio significato vox illa ab Hippocrate hic sumitur, nimirum pro solutione continui quam violentia excitavit. Ita hoc libro, vult medicum certiorum fieri ex vulnerati relatu; ἐκ τῶν λόγων τῶν τραυματίῃς. Etiam lib. περὶ πάθων, τοὺς τραυματίας λιμοκλονέειν, Vulneratos fame macerare jubet.

Porro vulnus secundum Hippocratis sententiam vocarim, *Solutionem continui evidētem, factam à causâ violentâ, in cranio.* Solutio continui necesse est sit, ut vulneris mereatur nomen. Evidens, ut ab ulcere distingui possit; à quo etiam causa distinguitur, quæ semper violenta; quum ut plurimum latens causâ, eaque interna, ulcus producat. In cranio, ut, quod jam dictum, pericranij, periostij, meningum, ipsiusq; cerebri læsiones excludat. Illud quinque fit modis Hippocrati, Fissione, Colli-

Collisione, Introcefsione, Teli fede & Contraffiffura. Nobis, Perforatione, Dedolatione, Fiffura, Fractura, Contufione. De quibus fequentibus plenius.

Τῶν ἀνθρώπων αἱ κεφαλαὶ οὐδ' ἐν ὁμοίῳ σφίσι
αὐταῖς, ἔδ' ἐαί ῥά φαι τῆς κεφαλῆς πάντων κτλ
ταῦτα πεφύκασιν.

*Humana capita neque eodem se habent modo; neque
cranij sutura omnibus similem ostendunt situm.*

Hisce verbis initium huic dant libro probatiora exemplaria; alia, nonnulla quædam præmittunt, quæ tamen pro spurijis habentur; idemque ego iudico. Movent me duo. Primum, quod spurio hoc præmio inter alia dicatur, Hippocratem alibi eorundem fecisse mentionem. ubi autem? Excute omnia ejus opera, nullibi hæc reperies. Deinde, quod optimi manuscripti codices horum nullam faciant mentionem: inter quos primas facile tenet, imo excellit, quem Regis Galliarum Bibliotheca. Opus est majore regio conscriptum caractere, donoq; datum Francisco. i. Galliarum regi à Cardinale Florentino. Illa itaq; pro supposititijs habebuntur; nec tamen meo iudicio omnino indigna quorum extet memoria. Sic se habent.

Nullum

Nullum capitis vulnus contemni debet. Sæpe enim cutis sola contusa ferro aut alia aliqua re, si non diligenter & cum quadam cautione curetur, Veluti si sanguis concretus non expurgetur, aut aliud quiddam negligatur, ulcus inrudesceat non parum molestiæ exhibet, imò interdum febrem inducit: Et medico quidem molestiam, agro verò periculum creat. Verum hoc multo magis contingit, si cum calvaria etiam cerebri membranae rumpantur. quamobrem si hæc singula medicus non diligenter animadverterit, sæpe mortis fient causa. Et de his quidem omnibus etiam alibi diximus. sed & nunc dicendum est. Primum igitur capite vulnerato, interrogare oportet, per quod vulneratum sit. deinde, quid homo fecerit quum vulneraretur. postea, qua parte vulnus inflictum sit.

Nullum capitis vulnus contemni debet. Imo nullum vulnus, cuiuscunque demum partis, leviter haberi aut contemni debet. Vidi læsâ superficiariâ tantum cute digiti manus, supervenisse febrem, quæ læsum sustulit. Celsus hanc ad rem eleganter cap. 26. lib. 5. In
 „vulneribus ante omnia scire medicus debet, quæ in-
 „sanabilia sint, quæ difficilem curationem habeant, quæ
 „promptiorem. Est enim prudentis hominis, primum
 „eum qui servari non potest, non attingere, nec subire
 „speciem eius, ut occisi, quem quem sors ipsius peremit.

Deinde ubi gravis metus, sine certâ tamen desperatione est, indicare necessarijs periclitantis in difficili rem esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel sefellisse videatur. Sed ut hæc prudenti viro conveniunt, sic rursus histrionis est, parvam rem attollere, quo plus præstitisse videatur. Obligarique æquum est confessione promptæ rei, quo curiosus etiam circumspiciat, ne quod per se exiguum est malum, majus curantis negligentia fiat. Egregie Celsus, quum non raro affectus per se exigui nulliusque momenti, aut chirurgi negligentia imperitiave, aut ægri ipsius peccato, aut denique inopinato aliquo casu, difficillima adferant symptomata, nec raro exitum.

Sæpe enim cutis sola contusa ferro aut aliâ aliquâ re, si non diligenter & cum quadam cautione curetur. Hoc est, si non diducatur aperiaturque locus contusus, ut exitus patere possit intus contentis. Eundem Celsum audi cap. 4. lib. 8. Quacunque autem de causâ curatio hæc necessaria est, si non satis cutis patefacta est, latius aperienda est. neque enim id ullum metum, nisi inter musculos qui tempora continent, adfert.

Veluti si sanguis concretus non expurgetur. Vides enim hic agere de contusione. quamvis & in ipsis cranij vulneribus locum habere

possit; uti os capillari rimâ fissum, nisi fissura scalpris deleatur, accidit non rarò ut ichor fissurâ contentus, acquirens acrimoniam os exedat, stilletque in subjectam membranam. Ipse subjungit dicens: *aut aliud quiddam negligatur, ulcus incrudescens non parum molestiæ exhibet.* nimirum corrupta illa materia quæ aliquamdiu sub cute ossi inhæret periostrium corrumpit, neque rarò ipsum subjectum os carie tangit.

Text. Et aliquando etiam febrem inducit. quatenus ratione doloris, subjectæ meninges in consensum trahuntur.

Text. Et Medico quidem molestiam, agro verò periculum creat. Agro periculum febris, aut phrenitidis; medico molestiam scalpturæ, rasuræ. imò etiam ignominiam.

Text. Verum hoc multo magis contingit, si calvarie & cerebri membranae rumpantur. tum enim in præsentaneo versatur vulneratus vitæ discrimine.

Text. Et de his quidem omnibus etiam alibi diximus. ubi autem?

Text. Sed & nunc dicendum. Primum igitur capite vulnerato interrogare oportet, per quid vulnertum sit. an nimirum acuto an verò obtuso te-

lo. an

ſo. an gravis fuerit ictus, an levior. an punctim inflictum vulnus nec ne. Deinde quid homo fecerit quum vulneraretur; num præviderit ictum. num potu obrutus. num vehementer inter conflagendum incanduerit.

Postea quâ parte vulnus inflictum sit. Hac in Text.
re maxima difficultas; illaque occupatur majore hujus Tractatus parte Author.


Τῶν ἀνθρώπων αἱ κεφαλαί.

Humana capita neque eodem se habent modo. Text.

Priusquam rem ipsam aggrediatur Author, quædam præmittit monita, serio consideranda chirurgus; quorum primum hoc est, non parum mutari curandi rationem ob capitum diversitatem. Nam pro materiæ, è qua caput natura format diversitate; diversimodè finguntur humana capita. Diversitas est in cranij circumscriptione sive universali figurâ; ejusdem crassitie; suturis. Circumscriptione sive figurâ; quàm paucos enim reperiās quibus cranium contigit figurâ præditum omnibus numeris ac absolutè naturali. Talis est quæ ad oblongæ spheræ accedit similitudinem. haud aliter inquit Galenus ac si globum cereum ambabus sumtum

manibus in lateribus tum & in summitate
parum premas, videbis antèrius posteriusque
leviter prominere, superius paulum deprimi.
ita naturalem finxeris cranij figuram.

Figura Cranij naturalis.





At quotusquisque reperitur hanc qui sit natus? alijs rotunda contingere capita; oblonga, acuminata alijs, quale Thersiti Homerico. Huic frons plana ac depressa, alteri in acumen prominens. idem de occipite, vertice, alijsque dicendum. Turcis, Groenlandis, Abissinis, rotunda, plana ac velut compressa sunt capita; nobis communiter productiora oblongioraque. facit id mos collocandi in cunis infantes; diversa fasciarum quæ capitibus infantum circumponuntur ratio. facit efficacissimè ipsum hæreditarium parentum jus, uti de Macrocephalis Indiæ populis scribit Hippocrat. lib. de aer. aqu. & loc. Locus lectu dignus ita habet: *Ac eas quidem gentes quæ parum inter se differunt, prætermittam, quæ verò plurimum aut naturâ, aut institutis inter se discrepant, de his quemadmodum se habeant mihi dicendum est, imprimisque de macrocephalis, cum ex his nulla alia gens capita similia habeat. Ac initio quidem hominum institutum longitudinis capitis causa fuisse videtur, nunc verò natura etiam ad institutum accedit. Longissima enim habentes capita generosissimos existimant. Hujusmodi autem est institutum; cum primum editus est infans, caput ejus adhuc tenellum & molle manibus effiugunt, & in longitudinem*

A. iij dinem


„ dinem adolefcere cogunt, vinculis & idoneis artibus
 „ adhibitis, quibus capitis rotunditas vitietur & lon-
 „ gitudo augeatur. Hoc institutum primum hujusmodi
 „ nature dedit initium. Successu verò temporis in na-
 „ turam abiit, ut proinde instituto nil amplius opus
 „ esset. semen enim genitale, ex omnibus corporis par-
 „ tibus provenit, ex sanis quidem sanum, & ex mor-
 „ bosis, morbosum. Si igitur ex calvis calvi gignun-
 „ tur, ex cæsis cæsi, ex distortis ut plurimum distorti,
 „ eademque in cæteris formis valet ratio, quid prohi-
 „ bet cur non etiam ex macrocephalo macrocephalus
 „ gignatur?

Iam quoad crassitiem, quanta hac in re
 varietas. Persarum capita leviori lapilli ictu
 pertundebantur, secus ac Ægyptiorum teste
 Herodoto lib: 3. Æthiopes quàm crassa du-
 raque habent capita. bone Deus, non os sed
 militarem te tangere dicas galeam. Norunt
 Hispani qui (Aloisio Cadamusto teste) du-
 cturi novum in insulam D. Thomæ, Ango-
 lam, vicinaque Æquatori loca militem, illud
 imprimis ipsis inculcant, ne cum incolis
 conflicturi unquam caput ipsis petant, ex-
 perientiâ docti protenus dissilire ense.
 Magnus mihi craniorum numerus in
 quibus incredibilem quoad crassitiem te-


nitiditatemque cernere est diversitatem.



De futuris etiam dixi. Capita reperias nequidem futurarum exhibentia vestigium. Alia, quibus stationem suam mutant futurae. in sagittali quam id notum, quæ licet communiter terminum suum in bregmate habeat, subinde tamen excurrit ulterius ad narium usque initium, frontem reddens bifidam.



Ab eadem etiam occiput sectum vidisse se
asserit Vesalius. Sylvius geminatas se futuras
observasse (rarum id admodum) scribit. idem
Eustatius asseverat. illud hac figura expres-
sum.



Fit interdum, nonnulla uti crania peculiare accepertint futuras, quale mihi non unum. Vidi bregmatis ofsiculum (illud dico quo natura locum illum in infantibus apertum postmodum replet) peculiari circumscriptum futurula, aspectu certe jucundo. Quod majus dico, observavi, in interna cranij tabula, loco inter os petrosum dextrum & verticem medio, duas exactè sphaericas futuras. Vidi, neque mirari satis potui. Ita est, non facit medicinam homini medicus in genere, speciem requirit. in qua tanta naturæ est varietas, verissimè uti Poëta dixerit

Ludit in humanis divina potentia rebus.

Nimirum hac ratione magnum illud Numen curiositatem ac philautiam nostram ridet, qui dum satagimus inquirendo quid supra coelos, infra terram quid geratur, quid Iunoni in aurem Iupiter, miselli quid ipsi simus ignoramus. Anne utilitatis aliquid hæc res adfert, dicat quis? sane plurimum. Gal. illud sæpè suis scriptis inculcat, figuram uti partis laborantis perspectam bene habeat medicus, cum ab ea pendeant partium actiones, circa quas universa versatur medici contemplatio. Ita, qualis scapularum ac costarum

rum ratio est, talis figura & consequenter actio pulmonis. Ita minor quibus obtrigit merus, grandescere foetu, abortiunt. quibus in figuræ defectu peccat vesica, hi singulis pene momentis, urinam reddere coguntur. Sic & qualis cranij, talis etiam contenti cerebri figura, talesque divini illius visceris actiones. Accedens itaque ad ægrum medicus vitiosâ præditum capitis figurâ, delirij, phrenitidis, similisve affectionis metum sibi ipsi incutiet, indeque majori talem ægrum esse in discrimine judicabit. Videat quem crasso præter modum præditum cranio (fragmenta vulneris hac de re certiores eum reddent) de tali protinus melius sperandum sciet, crassitie ictuum vehementiæ efficacius resistente. Iam verò, quantum ad vulnerati capitis curationem possit suturarum diversitas, vel inde patet, quod cum non liceat chirurgus scalpris uti ipso suturarum loco, si quem offendat inusitatas habentem suturas, hoc ipsum an non moram curationi injiciet?

ἔδε αἱ ῥαφαὶ τῆς κεφαλῆς πάντων καὶ ταῦτα
πεφύκασιν.

Neque cranij suture omnibus similem ostendunt
situm.

Idipsum prægresso jam explicatum paragrapho. Quem habet usum? maximum sane: ipsis namque futurarum locis quum ob filamenta membranosa, nec scalpris radere, nec trepano uti liceat, summè circumspectum esse chirurgum oportet, an non in illo ipso ad quod curandum vocatur cranium, futuræ
 ,, varient. Celsum audi cap. 4. lib. 8. Ergò quæ
 ,, plaga est, demitti specillum oportet, neque nimis te-
 ,, nue neque acutum, quod ubi ad os venerit, si nihil nisi
 ,, leve & lubricum occurrit, integrum id videri po-
 ,, test. Si quid asperi est, utique qua suturæ non sunt,
 ,, fractum os esse testatur. A suturis se deceptum esse
 ,, Hippocrates memoriæ prodidit: more scilicet magno-
 ,, rum virorum, & fiduciam magnarum rerum haben-
 ,, tium. nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi
 ,, detrahunt: magno ingenio multa quæ nihilominus ha-
 ,, bituro, convenit etiam simplex veri confessio, præci-
 ,, pueque in eo ministerio quod utilitatis causa poste-
 ,, ris traditur, ne qui decipiantur eadem ratione quâ
 ,, quis ante deceptus est. Vides? ipsi Hippocra-
 ti futuræ imposuere, neque id absque proxi-
 mi internecone. Verumne, dicat quis? mi-
 ror neotericorum nonnullos hac in parte
 velle Hippocratis manibus blandiri, quum
 ipse id fateatur imò testetur apertissime ac
 inge-

ingenue 5. Epidem. histor: xxvii. his
 verbis: *Autonomus in Omilo ex capitis vulnere* cc
amortuus est die xvi. media aestate, lapide ex manu cc
ictus in futuras in medio syncipite. quare non ani- cc
madverti ipsum secari opus habere: deceperunt enim cc
me futurae, habentes in seipsis jaculi lesionem: po- cc
stea enim id conspicuum fiebat. Anne ingenua haec cc
 veritatis confessio vitio verti debeat viro
 magno? honori. ita iudicat Celsus loco cita-
 to; ita Plutarchus de Pulchrit. Virtut. ita Fa-
 bius lib 3. cap. 8. nam Hippocrates clarus arte me- cc
 dicinae, videtur honestissime fecisse, quod quosdam cc
 errores suos, ne posterii errarent, confessus est. cc

Nunc Author exempla aliquot capitum in fi-
 gura laborantium, indeque vitiosarum futu-
 rarum dabit.

ἀλλ' ὅστις μὲν ἔχει ἐν τῷ ἔμμεσθον τὴν κεφαλὴν
 περβολῶν (ἢ δὲ περβολῇ ἐστὶ τὸ ὅς ἐξ ἐξέχον
 στρογγύλλον πρὸς τὸ ἄλλο) τέττε εἰσὶν ῥά φαι πε-
 φυκῆαι ἐν τῇ κεφαλῇ ὡς γράμμα τὸ ταῦ, Τ
 γράφεται. τὴν μὲν γὰρ βραχυτέρῳ γραμμῶν
 ἔχει πρὸς τὴν περβολῇ Πικαρσίαν πεφυκῆαν
 τὴν δ' ἐτέρῳ γραμμῶν ἔχει διὰ μέσης τὴν κε-
 φαλῆς κτ' μῆκος ἐς τὴν ἰσάχηλον αἰεῖ.

Verum priore capitis parte prominentiam habens (est prominentia, id ossis quod secus ac alia rotundè exstat) huic capitis suturæ litteram T referunt. Habet namque productam lineam breviorcm transversam à naturâ ad prominentiam, altera per mediam calviam semper ad cervicem pergente.


Proponit vitiosi craniij exemplum primum, cujus frons protensa, in acumen veluti definit. quo enim magis centrum frontis. (illud voco, locum contactus sagittalis & coronariæ suturæ) anteriora versus producitur, eò arcuatam suam, & unde nomen habet coronariam figuram, magis amittat sutura coronaria necesse est; perit enim frons, quæ res suturam illam non corniculatam ac incurvam amplius, sed planam reddat necesse est; manente interim eodem modo suturâ sagittali, quæ se habet in modum perpendiculi ad jam dictam. quod ipsum T majus græcum referat necesse est.

a. Locus concursus suturæ sagittalis cum coronariâ, extensus anteriora versus.

bb. Corniculata coronariæ suturæ latera, nunc oblitterata plana reddita, ob extensum, anterioraq, versus protractum locum.


c. Contactus lambdoidis suturæ & sagittalis.

22.



ὅστις δ' ὀπίθεν τ' κεφαλῆς τιῶν περὶ βολῶν ἔχει,
 αἱ ραφαὶ τέττε πεφύκασιν ἰα νανλία ἢ τῶν περὶ ἐ-
 ρω. ἢ

25.



a Concurfus suturae sagittalis & lambdoidis; cujus incuruae partes laterales jam deperdita, quia locus acuminatus. a. retractus posteriora versus planum efficit occiput. itaque una cum sagitali consideratus sutura, etiam hic Texhibebit.

ὅστις δὲ καὶ ἀμφολέρωθεν τῆς κεφαλῆς προβολῶν ἔχει, ἐκ τε τῆς ἐμπροσθεν ἔκ τε τῆς ὀπίθεν, τέτω αἱ ραφαὶ εἰσὶν ὁμοίως πεφυκῆαι ὡς γράμμα τὸ ἦτα H γράφεται. πεφύκασι δὲ τῶν γραμμῶν αἱ μὲν μακραί, πρὸς τῆς προβολῆς ἐκατέρας. Ἰπικάρσοι πεφυκῆαι, ἡ δὲ βραχείη διὰ μέσης τῆς κεφαλῆς καὶ μῆκος πρὸς ἐκατέρῃω τελευτᾶσαι * τὴν μακρὴν γραμμὴν.


* ἦσι
μακρῇσι
γραμῇσι
alii.

Cui verò caput utrimque tam antèrius quàm postèrius prominèt. huic futura H litteræ similitudinem habebunt. longiores verò lineæ transversæ super utramque feruntur prominentiam, cum brevis per medium caput in utramque desinat longam.

Tertium exemplum cranij ita vitiosi, tam uti frons quàm occiput producta, oblitterent acumina & coronariæ & lambdoidis futuræ. tali casu sagittalis velut rectâ lineâ utrimque in planitiem desinens. H græcorum referat necesse est, uti hæc exhibet figura.

a. & b.

27.



a. & b. loca quibus sagittalis c. tangit tam
 D ij coro-

coronariam quàm lambdoidem suturas. utraque namque producta & anteriora posterioraq; versus tracta, parte acuminata coronariæ lambdoidisque, utramque curvaturas suas amittere necesse est, ac relinqui lineas rectas, deletis cornicularibus. quas utrimque tangens sagittalis, ἡτα majus græcorum *Hex*hibet.


ὅστις μήδ' ἐτέρωθι μηδεμίαν περιβολὴν ἔχει, ἕως ἔχει τὰς ῥαφὰς τῆ κεφαλῆς ὡς γράμμα τὸ χι χ γράφεται. πεφύκασι δὲ αἱ γραμμαὶ, ἢ μὴ ἐτέρη, Πικαρσίη. πρὸς τὴν κροτάφον ἀφίκεται. ἢ ὃ ἐτέρη καὶ μῆκεθ' διὰ μέσης τῆ κεφαλῆς.

At caput neutra sui parte prominens, suturas ostendit instar litteræ χ. ita namque ductæ apparent lineæ, earum altera uti transversim ad tempus tendente, altera per capitis medium in longum se efferat.

Quartum cranij in figurâ vitium habentis exemplum, χιασµὸν efficiens. Cum et nim tam frons quàm occiput velut præcisa ac in totum oblitterata sint, adeo in se contrahantur necesse est loca acuminata tam coronariæ quàm lambdoidis suturæ, deleta uti sagitt-

sagittali, in modum x græcorum seinvicem
intersecant.

29.



D. iij

a. b. c.

a. b. c. d. denotant partes incurvas laterales tam coronariæ quàm lambdoidis suturarum. contracta namque tam frontis quàm occipitis prominentiâ adeo, acutos angulos necesse est faciant futura lambdoides & coronaria, ut acuminatis partibus sibi invicem occurrant ac seinvicem, tangant in vertice, loco hic notato. e. Ita ut acuti ambo anguli juncti transversis suis lineis lateralibus (quæ tunc rectæ necesse est sint, quum curvæ apparerent ante) in modum \times græcorum seinvicem ad angulos rectos secent. Verum hic casus imaginatione potius quàm revera excogitari existereve potest. nam naturalis quæ cranio contigit longitudo, jam in latitudinem aut rotunditatem conversa esset. monstrum te videre dixeris, ejuscemodi si occurrat caput, quid? quod ne vivere quidem videatur posse talis homo, homo si dicendus, quum tantum utrimque ab ipso cerebro decedat necesse sit. Videatur hanc ad rem Gal. 9. us. part. cap. 17.

Δίπλοον δὲ ἐστὶ τὸ ὁσέον κατὰ μέσῳ τῷ κεφαλῷ


Est autem cranium duplicatum in capitis medio.

Quum propositum sit Hippocrati hoc libello
 30. d. 3 31 C profc-

prosequi Capitis vulnera, præmittit nonnulla naturam conditionemque partis affectæ explicantia; cum absque partis affectæ probâ cognitione, impossibile sit nonnaturales ejusdem affectiones methodicè curare. Si namque similes fuerint partes, remedia sibi analogâ requirunt. illa quo pacto adhibebuntur ab eo, cui partis natura minus fuerit perspecta? si dissimiles, sciat medicus necesse est, diversimodam eas requirere curam, pro ut non omnes eas constituentes partes similes simili se habent modo. Icoris gibba, aliter quàm cava tractanda, quia exterior membrana, quàm interna exquisitius sentit. Pulmonis non nisi parenchyma tactum, aliam exigit curationis methodum, quàm ejusdem bronchia si quoque læsa sint. Idem in cerebro, prout ejus aut membrana, aut ipsa medullositas in vitio est, locum habet. Idem omnino in cranio observandum, quum se non eodem habeant modo omnes ac singulæ à quibus constituitur partes. patet futurarum exemplo, quum non eodem debeat modo tractari cranium loco futurarum, quàm ubi nullas habet. neque omnibus partibus eadem ratione se habere quoad crassitiam,

tiem, duritiem, mollitiem, nimis notum est. Hac de causa secundum monitum præmittit Hippocr: *Curaturus cranium cum iudicio, monendus est, διπλῶν existere.* Constat hæc cautela duabus partibus. 1. ait duplicatum esse cranium. 2. Duplicitatem illam, se ostendere circa calvæ medium. Ad prius quod attinet, notum illud, duabus tabulis sive laminis (uti vulgo loquuntur Chirurgi) per intermediam junctis medullam, constare capitis os. Nonne eodem modo alia se habent ossa? minimè verò. Fistulosa non possunt dici diploa; quum potius quatuor constent lateribus, quæ cavernosa. diploa illa cuncta dixeris merito, quamvis medulla non æquè luxuriat in omnibus. reperias adeo tenuia nonnulla, imaginatione uti potius quàm ad sensum tabularum duplicitatem ostendere queas. Petrosa ossa exemplo sunt; occipitis ossis non contemnenda portio; adde scapulas. In frontis osse, sincipitis, spinæ vertebri, costis, coxis, contrà se res habet. At annon ipsa substantia ossea fistulas brachiorum ac crurum cingens duplicata? Vix ac ne vix quidem apparet. & quorsum? duplici-tatis in ossibus latis laminosis illa causa, nu-
triri

33.



a. Externa Tabula.

b. Interna Tabulis.

c. Medullium Tabula interiectum.

triri uti possent. Interposuit namque duabus
 E tabu-

tabulis natura provida medullam, proximum ossium nutrimentum. at verò illam abundè fistulis sibi reconditam habent rotunda ac oblonga. Ita ipsa interior ventriculi, vesicæ, uteri capacitas; interna venarum ac arteriarum fistulositas, nullos neque ostendit neque habet sanguineos ramos; quum spatium membranarum intermedium habeat. inde namque est, dysentericæ quòd præbeatur ansa, si membranarum exterior exedatur in intestinis. quid? non eadem de causâ epidermis cuti imposita, eaque ablata protinus sanguine madere extimam ejus superficiem cernimus? eadem hic naturæ causa. Nullum autem in capite reperire est os, adeo liberaliter medullâ donatum, uti cranium, calva potissimum. quod evidenter ostendit crepani usus; simul ac namque trajecta instrumeto exterior tabula, obruit te sanguinolenta medulla. Causam porrò luxuriantis hic medullæ reor, ut calore cranij ossa largiter perfunderentur. Sunt namque non solum frigida reliquorum ossium in modum, aërique secus ac reliqua exposita, verum insuper tegumento existunt viscerum nobilissimo, ex sanguine, ac frigido; cui tegmen algidum pa-

rum

rum præstaret opis: Moneatur itaque chirurgus, facillimè cranio læso inflammatio-
nem supervenire, impredientem non parum
vulnerum capitis curationem. Documento
sit trepani usus, quod ferramentum nū dum
circumagis aliquoties exemptum lacti, aquæ,
aut rosæ immergis, sicque æstum ejus tem-
peras, scissum cranium inflammari cernes.
Quid trepanum dico? idem non semel in
scalpturæ usu observavi, incaluisse præ multi-
jugâ rasurâ scalprum, ossi quæ igneum com-
municasse calorem. Hæc itaque utilitas mo-
niti hujus secundi. Habebit quæ hæc res in se-
quentibus locum, ubi ad instrumentorum
cephalicorum usum ventum fuerit. Docebi-
tur etiam tum, aliter tractandum cranium,
cujus non nisi una, ac cujus utraque tabula
fissa fractave.

Illud porro in hac cranij duplicitate no-
tatu dignum, fieri subinde (exemplum non
unum mihi notum) præ ictu valido, à telo
obtusio in caput incidente, fieri inquam, ut
medullositas quam tabulis interpositam cer-
nimus, è suis excussa expressaque cavernulis,
inflammata ac putrilagine tacta, in eandem
inflammationem imò & putredinem ipsum

os traxerit; cranio dico integro, neque ullam ostendente fissuram, multo minus fracturam. Anne hic casus sub Infortunio, postremâ specie læsionis, cranij quam Hipp. statuit referri debet? Verè enim infelices tales ægri. quum namq; insensile sit os, sensu saltem præditum obtuso valde, paulatim ejus substantia contaminatur, exesaque interna tabulâ, stillans in subjectum cerebrum putrida sanies, vixdum querulos abripit ægros. Altera hujus moniti pars dicit, diploon esse cranium, καὶ μέσην τὴν κεφαλὴν. Quæ verba diversimodè interpretari video; alius *ad medium caput*; alius, *calvaria media duplex est*. Mens authoris est, medullositatem potissimum apparere loco sive spatio tabularum ossæarum medio; Meditullium non inconvenienter dixeris. Quamvis & illa interpretatio aliquando non displicuit, omnium manifestissimam esse medullam in capitis medio. quodnam illud? quod lateribus opponitur. ut hæc sit mens; memor sit chirurgus, si frangatur os aliquod sincipitis, aut os frontis, hisce locis magis luxuriare medullam, quàm si petrosa ossa aut faciei laborent. Hæc autem loca respectu laterum quibus opponuntur, capitis medium consti-

constituunt. Prior interpretatio placet magis, quòd hoc eodem paragrapho Hipp. pluribus mentionem faciat medullositatis huius, quam spatium tabularum medium continet; dicens, hac de causâ, eas quâ se invicem respiciunt tabulæ cranij superficies, externis molliores existere; nam ob medullam mollescunt. Esse ibi ossa spongiæ similia, quæ si digitis premantur, sanguinolentam erumpere medullam; ἡ δὲ διπλὴ καὶ ῥοῖον ἔχει καὶ μαλθακώτερον, καὶ μάλισα, σπαραγγῶδες ἐστίν, inquit. Ita hoc eodem de vulneribus Capit. libro locus est, ubi de carne & excrescentiâ vulneribus non rarò superveniente agens, inquit: (σποφύει) δὲ ἐκ τῆς διπλῆς ὅς ἐστιν *successit autem ex ossis diploe.* Huc accedit, quòd Gal. 6. meth. cap. 6. ipsam secundam sive internam tabulam διπλὴν vocari scribat; quod ipsum à nullo veterum notatum memini. Verba ejus sunt: *Ergo de calvarie sancturis quedam usque ad secundam laminam, quam græcè διπλὴν vocant, perveniunt.* Porro & illud sciendum, Græcos hanc vocem etiam alijs subinde accommodare. Gal. 6. meth. cap. 5. Cerebrum vocat διπλόν. ὅ ἐστιν κεφαλὴ τῆς ἀνθρώπου, inquit, ἐστὶ διπλόον, *Cerebrum humanum duplicatum est.* Ita Hippocrates de geminata

E iij respi-

respiratione agens lib: de morbo sacro, inquit: διπλόον ἐπαναπνεῖν, *geminatâ respiratione respirare.*

Etiam illud addo, neotericorum nonnullos, neque eos gregarios, cranium statuere triplicatum, habentes ipsam medullositatem tabulis interjectam pro lamina tertia. Neque revera omnino de nihilo est quod dicunt, sicuti diligenter ipsam medullositatem inveniendi, in cranijs potissimum crassioribus, patere poterit. Verùm hac de re paulo post plura.

Σκληροτάτον δὲ καὶ πυκνότερον αὐτὸ πέφυκεν τὸ ἀνώτατον, ἢ ὁμοχρεῖν τοῦ ὀσέος ὑπὸ τῇ σαρκί. καὶ τὸ κατώτατον τὸ πρὸς τῇ μηνύγῃ, ἢ ὁμοχρεῖν τοῦ ὀσέος ἢ κάτω. ἀποχωρεῖον δὲ ἀπὸ τοῦ ἀνωτάτου ὀσέος καὶ τοῦ κατωτάτου. ἀπὸ τῶν σκληροτάτων καὶ πυκνοτάτων ἐστὶ τὸ μαλθακώτερον καὶ ἥσον πυκνὸν καὶ ἐπικοινώτερον ἐς τὴν διπλόην. ἢ δὲ διπλὴ κοιλότερον καὶ μαλθακώτατον, καὶ μάλιστα *σπαραγμώδες ἐστὶν ἐστὶ τὸ πᾶν τὸ ὀσέον τὸ κεφαλῆς, πλὴν κάρτα ὀλίγα ἔτε ἀνωτάτε, ἔτε κατωτάτε, ἀσπράγγω ὁμοίως. καὶ ἔχει τὸ ὀσέον ἐν ἐνὶ ὧ *ὁμοία σαρκία πολλὰ καὶ ὑγρὰ καὶ εἰς αὐτὰ διατεῖσθαι

* Alij
σπαραγμώδες.
* ὁμοία
alijs.


τοῖσι δακτύλοις, αἷμα αὐτὸ διαγίνοιτο ἐξ αὐτῶν.
ἐν δὲ ἐν τῷ ὅσῳ καὶ φλεβία λεπτότερα καὶ κοιλό-
τερα, αἷμα αὐτὸ πλέα. σκληρότητι μὲν νυῦ καὶ
μαλακότητι ἐκοιλότητι, ὥδε ἔχῃ. παχύτητι δὲ
καὶ λεπτότητι, ὅτως.

*Cranij ossa & à parte summâ quâ carnem habet,
& ima quâ membranam tegit, durissima apparent,
densissimaque. Verum discedenti tibi à summo &
imo, loco duritiæ & densitatis, mollitiem majoremq;
offendes cavitatem, idq; pergendo versus meditull-
ium, ibi sibi invicem necantur. ibi cava, ma-
nifestè mollia, imo spongiæ similia deprehen-
des. Imò univèrsum caput, parte exiguâ exceptâ,
spongiam refert, plenam carunculis humidis, quas
digito si premas, sanguinem prodire cernes. Etiam
tenuēs venulas discurrentes videbis, sanguine abun-
dantes. Quod itaque ad duritiem, mollitiem, ac ca-
vitatem cranij attinet, res uti dixi sic se habet; Quod
verò ad crassitiem ac tenuitatem, hoc modo.*

Moni-

caput
supra

33.



a. Externa Tabula.

b. Interna Tabulis.

c. Medullarium Tabula interiectum.

Monitum prodromum tertium. Cui tamen
aliqua

aliqua cum secundo affinitas. Duabus quum constet tabulis cranium, certum est, extimam externæ tabulæ superficiem respicere perioftion; uti extimam internæ tabulæ superficiem; duram menynghem: contrà, internæ tabularum superficies illæ sunt, medullarum quæ respiciunt. Sciendum itaque est, exteriores superficies interioribus & duriores & solidiores longè esse, quum non mollescant ab humiditate medullæ. Quo fine hæc monentur, dicat quis? eo, sciat uti chirurgus, in purgando osse, delendis rasurâ fissuris, eximendis modioli usu fragmentis, liberius confidentiusq; tractari posse superficies cranij exteriores, interioribus. Celsum audi cap. 3. lib. 8. *Sed tum majore curâ agendum est, cum jam aut simplex os dimidium perforatum est, aut in duplici superius. Illud, spatium ipsum, hoc sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda habena (modioli nimirum) suspendaque magis sinistra manus est, & sæpius attollenda, & foraminis altitudo consideranda.*

Hæc itaque est hujus moniti utilitas. ad quod duo noto. 1. Exteriorem tabulam multo esse interiore crassiore. 2. interiorem exteriore esse & tenuiorem & multò duriorẽ,

F. magis

magisq̃ue fragilem. Ostendit id Resonitus seu Contrafissura, quā videmus præ ictu in externam incidente tabulam, findi internam, integrā manente externā. Ita hac de causā, Temporum ossa Petrosa dicta fuere, quod tenuia licet, dura tamen sint, & saxi instar fragilia.

ἡ ὁμοχρoία τῶ ὀστέω ἐστὶ τῆ σκελῆς. in ὁμοχρoίας voce nonnulli admodum se torquent. puto bene eos judicare, qui per hanc, lævitatem glabritiemve intelligunt. ita namque Celsus, fidelissimus Hippocratis interpres, cap. 1. lib. 8. *Cal-
varia ex interiore parte concava, extrinsecus gibba:
utrimque levis, & qua cerebri membranam conte-
git, & qua cute capillum gignente contegitur. Per
læve Celsus glabrum, nitidum, æquale, quod
nullam exhibet asperitatem, intelligit. talem
oportuit esse externam internæ tabulæ superficiem, ne ejus inæqualitate scabritieve, at-
tollente se cerebro, dura menynx offenderetur; debuit & exterior nitida esse, ad evitan-
dam deformitatem.*

ἐν δὲ ἐν τῷ ὀστέῳ ἔσθ' φλεβία λεπτότερα ἔσθ' καὶ
χρότερα.

Text. Sunt etiam in osse exiles venule, caue.

Dili-

Diligenter si quis excutiat quod meditullio continetur, non solum humidam fluxilemque inveniet medullam, verum insuper substantiam longè duriorem, quæ medullam continet; quæ manibus tractari potest, quæ circumscriptionem nacta est satis solidam; quam, in modum mollis spongiæ, si premas, exsudantem, haud aliter ac è spongiâ aquam, cernes medullam fluxilem. Haud pene aliter ac in alvearijs favum videre est, qui loculamenti vicem præstat melli ac ceræ, & quâ compressâ, mel se effundit. Tuberculis multis exilibus hæc substantia prædita, medullâ plenis, cavernosis. illa vocat *σάρκινά υγρόν*, comparative nimirum. Sicuti namque in ulceribus quotidie animadvertimus, lacunâ ficcata ac purgatâ, regigni novam carunculam guttatim & per certa quædam punctula quarum plura juncta integram partem cōstituunt carneam; eodem, inquam, omninò modo hoc loco se habent tubercula ista medullam continentia. Substantia est telis aranearum similis, mollis; & tamen certis intervallis discretâ. hanc venis comparat. Non enim dicit hoc meditullio venas sensui conspicuas reperiri, verum particulas haud aliter protuberantes,


ac si venarum extrema seu oscula videas. Ita, neque asserit hic esse carunculas sive particulas carneas, sed ὁμοίως utitur voce; καὶ ἐξ τῶ ὁμοίῳ ἐν ἑαυτῷ ὁμοία σαρξίς πολλή. Respectu hujus solidioris substantiæ quam spongiæ comparat Author, neotericorum nonnulli tres statuunt tabulas cranij, externam, internam, & hanc mediam, quæ tertiam faciunt. Nisi religio mihi esset, absque magnâ causâ, quid in Veterum scriptis receptaque tot sæculorum sententiâ mutare, subscribendum huic opinioni dicerem. vel eò magis, ab Arantio, maximo Anatomico, eam quod foueri videam. Vidi & illud, nec semel vidi, in vulneribus capitis quibus fragmentum ab externâ ablatum tabulâ medullarum detexit, quoties reficerentur vulnera, hæsitasse instrumenta quibus chirurgus utebatur, præsertim annosa si essent capita. ita ut puram putam medullam liquidam quis inmerito vocarit. Servavi aliquamdiu domi frustrum ossis cranij fracti, cui adhærebat media hæc tabula: in illo, siccatâ absumentaque ipsâ medullâ liquidâ, evidenter apparebant cellulae sexangulae, quadrangulae, triangulae, referentes omni ex parte apum operis fundamentum.

Συμπάσης τῇ κεφαλῇς τὸ ὀστέον λεπιοτάτον ἐστὶν
 ἡ ἀδενέσατον τὸ κτῖ βρέγμα, καὶ ἡ ἄρκα ὀλιγι-
 στω, καὶ λεπιοτάτῳ ἔχει ἑαυτῇ ταύτῃ τῇ κε-
 φαλῇς τὸ ὀστέον. καὶ ὁ ἐγκέφαλος κτῖ τῆτο τῆς
 κεφαλῇς πλεῖς ὅτι ὑπεστῇ.

*Vniversi capit is id os tenuissimum & maximè in-
 firmum est, ubi bregma apparet, idemque carne tegi-
 tur paucissimâ. Hoc item loco, plurimum subiectum
 est cerebri.*

Continent hæc quartam cautelam prodro-
 mam. Non sunt (inquit) æquè periculosa ca-
 pitis vulnera; sive non est indifferens (ipsius
 ossis respectu) quo loco seu qua parte capi-
 tis quis vulneretur. Quis locus maximè peri-
 culosus? plerique omnes, Tempora respon-
 debunt: quum illud, non tam ipsius ossis,
 quam temporalis musculi, ossi petroso im-
 positi, fiat respectu. Ipsius ossis læsi ratione,
 nullibi periculosiores incidere ictus asserit
 Hipp.; quàm in ipsum Bregma. Βρέγμα is dici-
 tur locus Osteologis, ubi concursus fit futu-
 rarum sagittalis, & coronariæ.

46.



a. *Locus Bregmatis, Apertus In Primum.
Natus, Palpitantem Ostendens Verticem.*


Vbi inquam sagittalis perpendiculariter tangit coronariam. Locus sic dictus græcis, *ὁ τοῦ βρεγμᾶτος*, à mollitie ac humiditate. nam illum locum aliquamdiu post partum, in infantibus, apertum manere, docet sensus quotidianus, ostendens palpitans cerebrum. Qui ob id, Fons capitis, obstetricibus dicitur, quòd per hunc superflua in utero tot coacer-

vata.

vata mensibus, eructare soleat natura provi-
 da. Nec in primum natis tantum, in adultis
 etiam quandoque; uti nobilis illa apud Cla-
 riss. Hildanum historia observat. Chirurg.
 Cent. 2. observatione 8. satis ostendit: Ma-
 gister, inquit, Petrus Faber Ferrarius, Vicinus
 meus Hildene, in patriâ, anno 1593, ad conjunctio-
 nem suturæ sagittalis cum coronali, securi percussus,
 cum insigni cranij fractione, mox in terram semiani-
 mis decidit, & cibum indigestum evomuit. Ego vo-
 catus, vulnus satis hians cum maxima, & ad du-
 ram menynghem usque, cranij fractione, offendi.
 Multa, gravissimaq; Symptomata supervenerunt, in
 primis verò dolor & inflammatio, quæ multum nego-
 tij mihi faceßere. Tandem summâ adhibitâ diligentia,
 multisque extractis ossium fragmentis, cerebro item
 satis expurgato, divino favore, Symptomata paula-
 tim remiserunt, ita ut convaluerit. ulcus verò in fi-
 sculam degeneratum, nullâ diligentia, nullaque arte
 adhibitâ, cicatrice obducere potui. Sed quod exitio-
 sum atque mortale sibi fore videbatur, in maximum
 commodum cessit. Cum enim antea continuo cephalicâ
 vexaretur, postea sanus, & ab omni dolore capitis
 liber, per multos annos vixit, & forsân adhuc vi-
 vit. Historiam verò hanc non ideo recensui, ut tere-
 brationem suturarum probem; quin potius tyrones, ut

„ ab eâ abstineant, adhorter, & quidem propter gra-
 „ vissima, quæ inde sequuntur symptomata. Sin autem
 „ contusiones maxime ad suturas occurrant, præstat
 „ ex unâ atque alterâ parte suturæ potius, quàm in
 „ ipsâ suturâ os secare.

Hiaturam illam, in pueris paulatim indu-
 cto osiculo, claudit natura; quod ipsum pe-
 culiari dote Epilepsiæ convenire, non de-
 sunt qui asseverent. Hunc locum dicit Hipp:
 etiam in adultis esse λεπτότατον, tenuissimum;
 docet id sensus, quò videmus bregmate lu-
 mini objecto, transparentem esse hunc lo-
 cum; & quia tenuissimus, idcirco etiam
 ἀσθενέστατον maxime debilem, quique levi de
 causâ pertundi potest. Hæc res peritos mo-
 vit medicos, qui topica convenientia altera-
 to cerebro (irrigationes, perfusiones, inun-
 ctiones, sacculos, cauteria) huic loco adhibe-
 ri præcipiunt, certi eorum efficaciam facilius
 per os hoc tenue, quàm crassum se trajectu-
 ram. Catarrhum ferinum, maximo impetu
 è capite in subiectum pulmonem ruentem;
 eumque exulcerantem, cauterio hic admoto
 ita compescere solemus. Num hac ossis hu-
 jus loci tenuitate motum credemus maxi-
 mum Fernelium, cur existimet, materiam





Arthritidis omnem hoc coäcervari loco, indeq; in subjectas fluere partes? Ex his facile est elicere hujus moniti rationes. Sunt eæ plures & notatu dignæ omnes; quarû nonnullas adfert ipse Hippocrates, reliquas nos adjiciemus. 1. συμπασης τῆ κεφαλῆς τὸ ὅσιον λεπτότατόν ἐστι καὶ ἀδενέωλον. *quoniam in universo cranio nullum reperire est locum, tenuiore infirmioreque osse præditum.*

Quo autem tenuius imbecilliusq; os existit, eo minus resistere ictuum potest vehementiæ. 2. hunc locum, *minimum habere carnis.* quid mirum, quum namque eo magis luxuriet caro, quò plus habet nutrimenti, os autem hoc ob tenuitatem parum contineat medullæ, quid mirum, inquam, minus hic luxuriare carnem? 3. *plurimum cerebri huic subjectum est loco.* an hoc ita est? non abundat hoc loco magis quàm alio cerebrum, sed cerebrum hic quum arcnetur attollaturque maximè, ut convexam cranij partem repleat, vicinius etiam est, propiusque calvæ adhæret; hinc fit præ externâ violentiâ uti efficacius patiatur, quam si in alium aliquem incidat ictus locum. Tribus hisce adductis rationibus jam **concludit.**

καὶ διότι οὕτω ταῦτα ἔχει τῷ τε τρωσίων καὶ τῷ βε-
 λέων ἴσων τε ἑόντων καὶ μέγεθος, καὶ ἐλαστώνων, ὅ-
 μοίως τε τρωθεὶς καὶ ἥσων, ὅς ἐστιν ταύτη ἡ κε-
 φαλῆς φλάται τε μᾶλλον, καὶ ῥήγνυται, καὶ ἔσω
 ἐσφλάται. καὶ θανασιμώτερά ἐστιν καὶ χαλεπώτερα
 ἰηθρῶεσθαι τε ὅσον ἐκφυγάνειν τὸν θάνατον ταύ-
 τη, ἥπου ἄλλοθι ἡ κεφαλῆς. ἐξίσων τε ἑόντων τῷ
 τρωμάτων, ὅμοίως τε τρωθεὶς καὶ ἥσων, ἀπο-
 θνήσκει ἄνθρωπος, ὅταν καὶ ἄλλως μέλλῃ ἀπο-
 θανεῖν ἐκ τῆς τρώματι, ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ ὅ-
 ταύτη ἔχων τὸ τρώμα ἡ κεφαλῆς, ἥπερ ἄλλοθι. ὁ
 γὰρ ἐγκέφαλος τάχιστα καὶ μάλιστα καὶ τὸ βρέγ-
 μα αἰσθάνεται τῷ κακῷ, τῷ γινουδρῶν ἐν τῇ
 καρδίᾳ τῷ ὅς ἐστι. ὑπὸ λεπτάτατον γὰρ ὅς ἐστι ταύ-
 τη ὁ ἐγκέφαλος, ὅσον λίγη καρδίᾳ καὶ ὁ πλείους ἐγκ-
 κέφαλος ὑπὸ τῷ βρέγματι κεῖται. Τῶν ὁ ἄλλων
 τὸ κατὰ τὰς κροτάφους ἀσθενέστατόν ἐστιν. συμβαλὴ
 τε γὰρ τῆς κάτω γνάθος πρὸς τὸ κρανίον καὶ κίνησις
 ἐστὶν ἐν τῇ κροτάφῳ ἄνω καὶ κάτω ὡς πρὸς ἀερίαν
 ὅσον ἀκοὴ πλησίον γίνεται αὐτῇ καὶ φλέψι ἀπὸ
 κροτάφου ἰεταία κοίτη τε καὶ ἰσχυρή.

*Hæcque quum ita se habeant, ubi tela percussionesque
 fuerint æquè magna aut etiam minores, tum et æquè
 valide*

Valide vulneratus, os hoc capitii loco magis colliditur, frangitur, aut deprimitur; sicque magis intereunt acri, difficiliusque sanantur, mortemque effugiunt, quàm alia aliqua capitii parte idem si eveniat. Imò ex pari vulneratione, parique ictu (cum aliquo lethalis est plaga) citius succumbet eger hac cranij parte percussus cum fuerit, quàm alià quavis nam cerebrum citissime efficacissimeque percipit labem, loco inter frontem & Verticem medio. Ex ceteris, infirmissimum post bregma est Temporum os: nam mandibula calue articulatur in temporibus, ibidemque sursum deorsum articuli in modum motitatur. Tum & meatus auditorius huic vicinus est loco. Insuperque cava Vena, eaque insignis, per tempora fertur.

Hæc verba quartam continent causam, quæ admodum periculosa bregmatis sint vulnera: nam hic locus perpendicularis ac rectilineus quum sit subjecto cerebro, ictus hic evenientes, in se recurrunt, ac velut duplicati, tremulo motu quatiunt concutiuntque quæcunque intrà cranium sunt; ipsum dico cerebrum, ventriculos, plexum choroidem, nervorum initia, ipsos animales spiritus. unde non raro mentis perversio, apoplexia, venarum cerebri disruptio, alia-

que periculofissima mala. Et sicut solares
 radij, quo perpendiculares magis subjectis
 locis, eo efficacius agunt; Pilam quoque re-
 ctâ lineâ terræ si allidas, altius resilire vide-
 bis, quam obliquus si fuerit jactus; Eodem
 hic fit modo; hocque hisce ingeminatis ver-
 bis tacitè vult Author. Qui ea quæ in sequen-
 tibus tradit fracti cranij symptomata, hunc
 potissimum respexit perpendicularem sub-
 jecto cerebro locum; nimirum si læsus instar
 dormientis, expers sensus, deprehendatur
 si obcæcati fuerint oculi: si obmutuerit: bi-
 lem vomuerit; si ἀδρόν instar animalis mal-
 leo icti, conciderit. Hæc enim omnia maxu-
 mam ac subitanæ significant cerebri com-
 motionem, perturbationem, ac concussio-
 nem, quæ non raro etiam integro manente,
 nec ulla ex parte rupto cranio, mortem per-
 cussio adferunt. Talem concussionem pecu-
 liari vocolâ *ῥεῖσιν* alibi vocat Hipp. uti Coac-
 sect. 12. aph. 2. ὅσοισιν ἀν' ἀεγνέφαλον *ῥεῖσθῃ καὶ πο-
 νέσῃ παληγείσιν, ἢ ἀλλῶς πίπῃσιν; τὸ δαχρῆμα ἄφωροι γίνονται,* καὶ
 ἔτερόωσιν, ἔτε ἀκούουσιν, καὶ τὰ πολλὰ θνήσκουσιν. *Quibus*
 cerebrum concussum doluitque percussis aut lapsis;
 continuo non vident, nec audiunt, ac fere moriuntur
 Sic & cap. de Cephalalgia aph. 4. τὰ παύσειντα

κεφαλῇ; ὁλεθρὰ Caput concutientia; mortifera. Exemplum concussi præ tremulo motu cerebri est in sternutatione. Etiam Rigor, concussio- nis totius corporis præbet exemplum. Ita & in tussi concussio- nis est idea; locusque ad eam rem Hipp. Coac. sect. 16. aph. 47. αἰσιν ἐν σφοδαῖσιν, πρῶν βορβορώδες ἔρχεται, καὶ δυσώδες, διὰ λ. λυσιγ. αἰς τὰ πολλά. Quibus concutiendo pus editur cæ- nosum ac male olens, ut plurimum intereunt. σφοδαῖσιν inquit. Tremulo hoc motu vehementer con- cutiatur cerebrum, omniaque capite con- tenta necesse est, quoties in ipsum incidit bregma ictus, tumque potissimum, quum te- lo obtuso plaga inferatur, aut quis è loco sub- limi præceps in caput cadit, idque in sub- jectum corpus durum aut solidum, in saxum puta.

His quintam, si lubeat, adde causam, quod in bregma quoties incidit vulnus, metus sit ne in subjectam cerebri divisuram instil- lans sanies, certam adferat mortis cau- sam. Hisce itaque rationibus motus Hipp. chirurgum monet, magis uti sollicitus sit de vulneribus in bregma, quam in alium ali- quem incidentibus locum. Et certe ita est, præter ea quæ paulo ante de perfusionibus,

canterijs, similibusque diximus localibus
huic loco adhiberi solitis, etiam illud effica-
citer ostendit, non leviter offendi cerebrum
ab externis in hunc locum incidentibus cau-
sis, quod notante Michaële Ephesio, Vete-
res non fuerint soliti infantibus nomina an-
te octavum imponere diem; experientiâ
edocti, perfusionem bregmatis aquâ frigida,
non parum offendere cerebrum subjectum,
facereque ut pueruli convulsionibus, Epi-
lepsiâ (quam hæc mala infantibus apud nos
familiaria) alijsque periculosis affectibus
corripiantur. Credo hoc motos Libyes, qui
Herodoto teste, lib. 4. infantum bregma oc-
sypo ovillo accenso inurere solebant, ut ea
ratione ipsis siccius redditum, firmaretur ma-
gis cerebrum. Afferitque ibidem idem Au-
thor, sana admodum corporis frui consti-
tutione Lybries.

*lib. 4. cap. 1. §. 1. Cerebrum enim
citissime percipit, &c. Licet Hippocr. hoc loco
conceptis dicat verbis cerebrum sentire, ni-
hil tamen aliud intelligit, quam percipere,
non vero judicare. uti ex Fallopij sententia
hæc verba bene interpretatur Mercurialis,
suis in hunc librum notis. Qui ibidem ple-
nius videatur* iii


Ex cæteris, infirmissimum post bregma est Temporum os, nam, &c.

Est hæc pars moniti quarti, dicentis non quemcumque cranij locum indifferenter aut æquè periculosè lædi. Omnium periculosissimè in bregmate dixit; addit nunc, post bregmâ cum difficultate ac discrimine ægri, vulnerari os petrosum, ejusque causas adducit tres. I. quod osse hoc læso, metus sit, ne motui inferioris maxillæ, detrimentum inferatur. Inde non contemnenda incommoda, non enim comedere, nec loqui æger posset. at quo pacto? lædi non potest petrosum os, illæso temporali musculo; at is maxillæ motui addictus. præterquam, ossi petroso quòd articuletur arctè immediateque maxilla, rotundos suos processus immittens sinibus temporum prope auditorium meatum; unde & illud oritur incommodum, difficulter quòd solidescat vulnus, ob perpetuum maxillæ motum.

II. Etiam auditui creatur periculum osse hoc læso, ut cui universum auditus organum insculptum.

III. Lædantur necesse est insignia illa temporali musculo concessa vasa, vena, inquam,

56.



A. Os Jugale; quod subit aentus maxilla processus, cui tendo tempo-
poralis adnascitur muscoli; notatus B. Ad radicem vero Jugalis,
C. videre

Cvidere articulationem processus maxilla rotundi, in sinum, petroso ossi ad jugalis radicem insculptum, se immittentem.

insignis arteria; adde etiam nervi, unde hæmorrhagia, spasmus cynicus, convulsio, febris, imo & tracto in consensum cerebro, (cui maxuma cum temporali musculo symphateia) delirium, aliaque incommoda, vulneribus capitis periculi non parum minitantia. Notavit id non uno loco idem Author.

2. de Articul: sect. 20: *Temporalis musculus si lesa inferiore maxilla distendatur, aut loco moveatur.*

torporem ac delirium excitat. Eiusdem lib. sect. 4:

Vulnera in temporalem incidentia musculum, lethalia sunt, vomitum ac convulsionem facientia. Coac:

sect. 6. aph. 1. Quibuscunque tempora præciduntur, convulsionem è diverso partis præcise incurrunt.



Vide hanc ad rem prolixam apud præstantissimum Chirurgum Guil. Fabricium Hildanum, historiam Centur: Observat. Chirurgic. 2. observat. 8.

ἰσχυρότερον δὲ ἐστὶ τὸ κεφαλῆς τῆς ὀσέως πάντες τὸ ὀσέον τῆς κορυφῆς καὶ τῶν οὐράτων, ἢ πᾶν τὸ πρὸς τὸ ἐν, καὶ σάρκα, πλέονα, καὶ βαθυτέλει ἐφ' ἐαυτῷ ἔχει τὸ τῆς ὀσέως. Καὶ δὴ τῶν ἔτως ἐχόντων ὑπὸ τῆς τρωσίων καὶ τῆς βελέων ἴσων

ἀπάντων καὶ ὁμοίων, καὶ μαιζόνων καὶ μόνων ὁμοίως λιπεωσκόμην, ἢ μᾶλλον ταύτῃ τ' κεφαλῆς τ' ὅσέον ἥσον ῥήγνυσθαι καὶ φλάται.

Ex universo cranio, id quod post aurem & verticem est robustius existit, quàm id anteriore quod parte apparet, habetque carnem copiosiore & altiore. Et ubi laciones ac tela sunt equalia, os hac capitis parte minus frangitur, tum & colliditur.

Et hæc pars est moniti quarti. Quum enim exposuisset, quibus locis cranium periculosius lædatur, subjungit nunc ubinam minus periculosè offendatur. Dixit de capitis parte mediâ & lateralibus, nunc comparisonem instituit partis anterioris & posterioris: dicitque, ceteris paribus, periculosiora esse vulnera anteriore quàm posteriore capitis parte incidentia. Causas ibidem duas adducit: 1. quod ossa posteriora anterioribus crassiora sint, hinc & ictus minore noxâ sustineant, & quoque si findantur, sordes fissurâ collectæ, non ita cito in subjectum destillent cerebrum. Anne crassius osse frontis occiput? non vèd, sed firmitus dicere voluit Author. Firmatur à limbis ac exstantibus lineis, quas superficie ostendit internâ.



A. Os occipitis à reliquò cranio separatum.

B. Prominentes limbi, superficiè ossis internâ.

2. quod occiput carne tegatur crassiore. ita

H ij

est,

est, pericranium in occipite crassius est. Accedit, quòd pericranium in fronte musculum constituat, cuius læsiones magna secum trahunt incommoda. Notari tamen hic debet, occiput omnino periculo non vacare, cum & ibi musculi sint, motubus capitis dicati. Verùm in infima ij apparent occipitis parte, neque facile lædi queunt

Vide ad hosce musculos præcedentem figuram, in qua,

A Os indicat occipitis.

B Musculos parvos vocatos, capitis motui dicatos.

C Portionem musculorum qui caput extendunt.

καὶ ὑπὸ μέλλῃ ἀνθρώπῳ ὁ ἀποθνήσκειν ἢ ἄλλως ἐκ
τῶματι, ἐν τῷ ὀπίθεν τῆς κεφαλῆς ἔχων τὸ
τῶμα, ἐν πλείονι χερόνῳ ἀποθανεῖται. ἐν πλείονι
ᾧ χερόνῳ τὸ ὀστέον ἐμπυίσκει αἰ τε καὶ διαπυίσκει αἰ
κάτω Ἰπὶ τὸν ἐγκέφαλον, διὰ τὴν παχύτητα τῆς
ὀσέως. Ἐλάσσωνταύτῃ τῆς κεφαλῆς ὁ ἐγκέφα-
λος ὑπεστὶ καὶ πλείονες, ἐκφυγάνουσιν τὸν θάνα-
τον τῷ ὀπίθεν ὑπερσφοδρῶν τῆς κεφαλῆς ὡς Ἰπὶ
τοπολὺν, ἢ τῷ ἑμμερῶν.

Et si vulnus homini lethale fuerit, diutius tamen
superuiuet posteriore capitis parte plagam qui acce-
pit. nam tardius ibi os, utpote crassius pus colligit,
ipsumque ad cerebrum transmittit. minus etiam ce-
rebrum hac capitis parte subest. fereque fit ut plures
evadant posteriore quam anteriore capitis parte qui
vulnerati.

Con-

Conclusio est prægressi paragraphi, ponens casus læsi cranij, idq; lethalter, in fronte & occipite. Ictus vehementia, circumstantiæ, ceteraque paria sunt, asserit tamen diutius tracturum vitam qui posterius, quam antè qui vulnus accepit. causæ hæ. 1. quod robustius sit occipitis os, frontis osse, uti jam dictum. 2. quod universa frontis cutis musculosa sit, secus ac occipitis. 3. quod frontis os insignem illam contineat cavitatem, quâ præparatur cerebro aër. nihil autem tale in occipite. 4. quod sub fronte cerebrum sit bifidum, hinc metus sit ne destillans ichor divisuræ se infundat, unde educi nequeat. at hac de re, in occipite non est metus. 5. Quod cerebrum in occipite non adeo uti in fronte caleat, ideoque non ita facile ac frequenter inflammetur. Calêt magis frons duabus de causis; ob copiam calidorum vaporum, quos subjectum corpus affatim affundit bregmati, utpote loco subjecto corpori qui perpendicularis, & per quem consuevit superflua eructare natura. Accedit, quod sinus membranæ duræ falci comparatus, continens sanguinem fervidum, desinat in frontem. *Frons* *Tum ex eodem hoc libello, paulo post. inquit in Coac. * Hipp. sola continetur non continet.

Pag: 62.




Figura ostendens quo pacto cerebrum anterius bifidum sit.

AA Membrana cerebri separata ac reflexa.

BB Cerebrum ipsum paulum diductum, ut conspicua magis sit divi-

C Cerebri divisiura ab occipite ad nares usque.

(Sura
tinet.

*tinet. Frons sola inflammationem incurrit à ca-
tarrho concitato, cetera loca à catarrho consistente,
vide Hipp. Coac. sect. 2. aph. 12. Cephalagiciis
ex calvaria postica fracturâ, si crassior è nare sanguis
copiosè fluat, grave malum denuntiât.*

6. Quòd frons oculos habeat, partes no-
bilissimas, quæ hac læsâ in consensum facile
traherentur:

καὶ ἐν χειμῶνι πλεονα χροῖον ἢ ἀνθρώπου ἢ ἐν
θερί, ὅστις ἐὰλλως μέλει ἀποθανεῖν ἐκ τῶ-
μας, ὅπου οὖν τῆ κεφαλῆς ἔχων τὸ τῶμα.

*Hyeme autem vulneratus diutius vivit, quàm
æstate, quacunque demum capitis parte vulnus acce-
pit, ubi aliòqui interiturus est.*

Est hoc monitum prodromum quintum
ac postremum. Statue ditos æquè periculose
vulneratos, æstate alterum, alterum hyeme.
qui æstate percussus est, succumbet citius,
quàm qui hyeme. quæ hujus rei causa? non
una. 1. quod innatus calor omnia regens &
in sua conservans integritate, alacrior sit, &
plus possit hyeme quàm æstate. vide aph.
12. 1. 2. æstivi aëris nos ambientis æstus evo-
cat dissipatque nativum cranij calorem, hinc
medullositas ejus facile putredinem incurrit.
putredo autem quæ invasit cuncta, humida,
flacca

flaccida, ac inertia reddere solet. Ita videmus feminas, pueros, capite læsos, fréquentius mori, aut magis periclitari saltem, quàm viros aut adultos; quòd humidiora putredini-
 que magis obnoxia illorum sint corpora. Notum est, insaluberrimum esse aërem circa æquinoctialem lineam. testes nostri, infælici illâ Ann. 1599. in illa loca expeditione. Testatur, Orientalem adnavigantes Indiam, quum ad æquatorem perveniunt. 3. minus periculi est hyeme à calamitosis, quæ vulneribus supervenire eo assolent tempore symptomatis, febre dico, &c. observavi febrem capitis vulnere æstate frequenter die. 7. hyeme tardius accidere. 4. hibernus aër familiarior est, habetque plus cum temperamento ossis similitudinis, æstivo. At, dicit aph. 34. 2. minus nos affici ab ijs quæ nobiscum similitudine familiaria. Dicat quis, Hippocratem aph. 18. 5 monere, frigus ossibus esse inimicum. Resp. Eum ibi de ossibus in genere loqui, non de cranij ossibus, nam illa calidiora reliquis sunt ossibus, sicuti ante probatum. Etiam de urente intensoq; ibi loquitur frigore Hippocrates, cui temperies addi hyeme potest, extructo foco, alteratoque

que decubitus loco. Accedat huic paragra-
pho locus Celsi cap. 1. lib. 2. Ex anni partibus
saluberrimum ver est: proxima dein ab hac hyems:
periculosior estas: autumnus longè periculosissimus.

αἱ δ' ἔδραι τῶν βελέων τῶν ὀξέων καὶ κεφαλέρων, αὐ-
ταὶ ἐπὶ σφῶν αὐτῶν γινώσκονται ἐν τῷ ὀσέῳ ἀνδρῶν
ῥωγμῆς τε, καὶ φλάσιος, ἢ ἔσω ἐσφλάσιος. αὐταὶ δ'
γινώσκονται ὁμοίως ἐν τε τῷ ἐμπερῶθεν τῆς κεφαλῆς,
καὶ ἐν τῷ ὀπισθεν. ἐκ τῶν θανάσιος ἔγινεται κα-
τάγε δίκην, οὐδ' ἐν γένηται. ῥαφὴ δ' ἐν ἑλκεὶ φα-
νέσκει ὀσέου ψιλωθέντι, πανταχῶς τῆς κεφαλῆς
ἐν ἑλκεος γινώσκονται, ἀσθενέστατον γινεται τῇ
πρώτῃ καὶ τῷ βέλῃ ἀντέχον, εἰ τύχη τὸ βέλος ἐς
αὐτὴν τῶν ῥαφῶν σπειχθέν. πάντων δὲ μάλιστα
ἐν τῷ βέλῃ ἐν τῷ βρέγματι γινώσκονται καὶ τὸ ἀ-
σθενέστατον τῆς κεφαλῆς, καὶ αἱ ῥαφαὶ εἰ τύχοιεν
ἔσθαι παρὰ τὸ ἑλκεος, καὶ τὸ βέλος αὐτῶν τύχοι
τῶν ῥαφῶν.

Postquam acutum & leve telum ossi impressum in
id vestigium fecerit, idque ut neque findatur, neque
collidatur, neque desidat, (quod tam antica quam
postica capitis parte evenire potest) ex his quamvis
mors sequatur, non tamen similiter neque eodem mo-

do id fit. Verum ubi osse detecto sutura in vulnere conspicitur, quocunque id conspiciatur loco, omnium minimè vulnere ac telo resistit, si forte in ipsam inciderit telum futuram: potissimum tamen si bregma, (locus capitis maxumè debilis) telum senserit, suturaeq; in ulcus incurrant, & telum ipsas attingit suturas.

Præmissis monitis ac cautelis nonnullis, velut prolegomenis, ipsam rem jam aggreditur Author, ante omnia exponens, quorū modis lædi cranium possit. Eos, quinque refert. Hoc paragrapho quatuor; ἑδπλεω; πρὸς γυμλῶ; φλασιν; ἐσφλασιν; paulo post, συμφορῶν adjiciens. Singulas ordine explicabimus.

Traditas priores quatuor vulnerum cranij differentias, priusquam explicet, id præmittit; ab hisce modis non æquè periculosè lædi caput: neque id mirum: quid enim? ubi leviter impressum cranio telū fuerit vestigium, illa res non potest tantum adferre periculi, ac si fissum fractumve cranium foret. neque si leviter ac superficialiter capillari rimā fissā sit externa tabula, tantæ molis res est, ac si insignis rima utramque tabulam penetraret, aut internam (quæ major difficultas) integrā externā. Si fractura cum Depressione

coincidat, ita ut fragmentum ab una avulsum parte sub oppositi ossis latitet limbo, subjectum premens cerebrum; quis non videt, majorem longè hic esse difficultatem, quam si punctum aut dedolatum tantum fuerit cranium? Hæc tantum est mens hujus paragraphi. Quo viam ad ipsam parat rem. Addit tamen duos casus per se semper periculosos. Primus, quoties ictus in locum incidit futuræ nam filamenta membranosa per futurarum se trajicientia locum, prohibent impediuntque quo minus aut fissura scalpris deleri queat, aut sordes loco fisso collectæ educi. ejuscemodi, itaque æger non potest non summè periclitari. Alter, si in ipsam bregma inciderit vulnus. cujus causæ jam ante plenè fuere datæ.

Τῆς ὥσκειαι δὲ ὁσέον τὸ ἐν κεφαλῇ, τοσὺς δὲ τρόπους. Τῶν δὲ τρώπων ἑκάστῃ πλέονες ιδέαι γίνονται τὸ κατ' ἕνα ἐν τῇ τρώσει.

Tot modis vulneratur capitis os; agnoscitq; quisque modus plures fracture species.

τοσούτους δὲ τρώπους. Tot modis. quot? relatis præcedente paragrapho, Rimâ sive Fissura; Collusione; Depressione; Teli fede; jungitque I ij statim

Tot.

statim Infortunium. Addit, singulos hosce modos agnoscere *πλείονας ιδέας*. Certè plurimæ sunt singularum læsionum idèq. Exemplo sint Rimæ five Fissuræ, quarum alia longa, brevis alia, alia incurva, alia recta, profunda, aut superficialia, fracturam conjunctam habens, aut non, cum depressione concurrens, aut secus, internam solvens tabulam, illasâ externâ, Frontem solvens, cum occiput ictum, aut contra. aliæque plurimæ differentia. Idem in Collisione seu Contusione evenit, aut cranium tantum deprimens, aut simul findens, imò & frangens, tales namque Collisionis modi eveniunt quotidie. Iam Vestigium seu Teli sedes quantam parit indies diversitatem: fit, ex ipsâ vestigij forma solo intuitu uti conjicere possis, quonam teli genere datus ictus: est, quum portio superficialia cranij deperdita est; accidit, fragmentum teli uti etiam ostendat locus læsus. Hæc exactè in singularum specierum examine prosequemur. Illud nunc præmitto: Hippocrates quinque modis lædi posse cranium statuit, vocat autem *ἑδρῶν, ρωγμῶν, φλάσων, ἐσφλάσων, συμφορῶν*. Vestigium, Fissuram, Contusionem, Depressionem, Infortunium, quæ hodie contrafissura Vestigium est, cū teli sedes in osse læso etiam

num apparet. Fissurâ sive Rima, quum simpliciter ossis continuum solutum est, non tamen vacillant ossa. Contusio, cum intus depressum fuerit cranium. Depressio, composita ex fissurâ & Contusione est species, ubi & fissum os, & simul introrsum depressum. Infortunium, quum ossis continuum alio solvitur loco, quam in quem incidit plaga. Galenus 6. Meth. cap. 6. totidem habet genera, verum alijs expressa vocibus, appellans, ρωγμήν, & ρήξιν, & κοπήν, διακοπήν, ἑδρίω, θλάσμα ἢ καὶ θλάσιν, καὶ ἑνθλασιν. Aegineta multò plures habet læsionum Capitis differentias lib. 6. cap. 90. sed quæ ad has quinque ab Hippoc: traditas referri posse videntur. Celsus Cap. 2. lib. 8. hæc latinis verbis ita prosequitur: *Omne autem os ubi injuria accessit, aut Vitatur, aut Finditur, aut Frangitur, aut Foratur, aut loco movetur.* qui Celsi locus eam mihi aliquando peperit difficultatem, quod Author is (gravis profecto, quemque maxumi facio) inter Fissuram & Fracturam distinguat, quum Fracturæ vocem non habeat Hippocrates, & tamen evidenter à fissurâ differat fractura. Satisfacere mihi ipsi soleo, si fracturam sub fissurâ comprehendi posse dicam. Quod ut intelligatur, is meam

audiat vulnereꝝ capitis distributionem. Dico cranium lædi, Perforatione siue Punctura; Dedolotiane; Fissurâ; Fracturâ; Contusione. Puncturâ, cum quis stylo, pugione, cultro, acuto ve aliquo feritur telo. hæc duplex, alia extimam solummodo pervadens tabulam; quam Puncturam propriè voco; aut utramque, quæ Perforatio dicetur. Dedolatio vulnus cranij est, cum substantiæ abolitione, uti, glans à sclopeto emissa, superficiemque cranij tangens, portiunculam ab externâ tabulâ secum si auferat. aut machærâ latioreve gladio idem si fiat. Hoc enim casu, nec punctum, perforatum, fissum, nec fractum erit os; & tamen ejus continuum violentè solutum. Sub hac specie, *è d'aleo Hipp.* comprehenderim. Fissura dicitur quum cranium per longitudinem dividitur, ita ut fissum, naturalemque suam figuram, nihilominus seruet integram; hoc est, partes ejus loco non moventur, uti in Fracturâ accidit. hujus magna diversitas; est namque aut conspicua, aut cæca, aut media. Sub cæcâ, Contrafissuram Hippoc: comprehendo. Fissuræ varias differentias prolixè hoc libello paulo post prosequitur Hippocratis. Fractura, con-

minuum ossis ita solvit, loco suo uti ossa moveantur. Exempli gratiâ, ictus adeo vehemens si sit, duobus-uti locis cranium findat, ita ut fissuræ intermediam ossis partem solutam, ac fluctuantem comprehendant; dixerim os esse fractum. sicuti etiam, quum in fragmenta aliquot comminutum os est. aut si avulsa à cranio ossis pars sub oppositâ parte lateat; quod ἰσφλασιν Hipp: vocat; ἐνθλασιν Galenus. Contusio, Hippocrati θλάσις, vulnus propriè non est. Fit enim quoties à telo obtuso, violentiâ quadam, introrsum compulsus cranium incurvatum apparet, exhibens sensui exterius cōspiciuam lacunam, seu locum cavum, integris licet partibus crani cunctis. eodem uti in stanneis plumbéisve quotidie usu venire cernimus vasis.

Tot igitur modis lædi caput potest. Qui singuli suas admittunt differentias ac subdivisiones, quemadmodum in singulorum pleniore expositione dicetur; quod jam prosequetur Author. Quem priusquam excutiamus, operæpretium erit audire Æginetam enumerantem distinctè & curiosè admodum vulnere Capitis differentias cap. 20. lib: 6. Sic ergo ille,

ἰδίως δὲ τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ κατὰ γμα, διαίρεσις ἐστὶν τῷ κρανίῳ
 ποτὲ μὲν ἀπλῇ, ποτὲ δὲ πολυχεδρῆς, ὑπο πινθῶ ἐξοθεν βίαις
 γινόμενη. τῷ δὲ κατὰ γμα τῆς κεφαλῆς αἱ διαφοραὶ εἰσιν
 αὐται. ῥωγμὴ, ἐκκοπὴ, ἐκπίεσμα, ἐκγίστωμα, καμάρωσις. ὅτι
 δὲ τῶν νηπίων καὶ θλάσις. ῥωγμὴ μὲν ἐν ἐστὶν, διαίρεσις τῷ κρα-
 νίῳ ὅτι πολλαῖς ἢ βαθεῖα, μηδαμῶς. ἕως ἐξω μετὰ κινήθῃ τῷ
 πεπονθότῳ ὅσες. ἐκκοπὴ δὲ, ἐστὶ διαίρεσις τῷ κρανίῳ μετὰ
 ἀνακλασμῷ τῷ πεπονθότῳ. εἰ δὲ καὶ ἀποθραυσθεῖ τὸ
 πεπονθός, ἀποσκεπαρισμὸν πινεὶ τὸ πᾶνθῳ προσηγόρευ-
 σαν. ἐκπίεσμα δὲ, ἐστὶν πολυμερὲς τῷ ὅσες διαίρεσις μετὰ τῷ
 καπαγότῳ ὅσα ἐλα ὑποκεχώρηκεναι κάτω πρὸς τὴν μήνι-
 γα. ἐκγίστωμα δὲ, ἐστὶ τῷ ὅσες διαίρεσις μετὰ τοῦ τὸ πεπονθός
 ὅσῃν, ὑπεληλυθέναι τῷ κατὰ φύσιν κάτω πρὸς τὴν μήνιγα.
 καμάρωσις δὲ, ἐστὶν διαίρεσις τῷ κρανίῳ μετὰ ὑψώσεως τῶν πε-
 πονθότων, ὡς φησὶν ὁ Γαληνός, ὅτι τὰ ἐξω ὑποχώρησις καὶ κοί-
 λαισις, ὡς ἀπαλησίως πῖς ἐκπίεσμασι. οὕτω γὰρ ἐκείνῳ ὀίε-
 ται. πινεὶ δὲ καὶ τριχισμὸν τέτοις περιελθῆναι. ἀλλ' ἐστὶν ὁ
 τριχισμὸς ἐνωθέντῃ ῥωγμῇ, καὶ τὴν αἰσθησὶν διαλασθάνουσι.
 διὸ πολλάκις λεληθῆα διὰ τὸ μὴ ἀκριβῆ γενέσθαι τὴν σημείω-
 σιν, θανάτῳ γέγονεν αἰτία. ἡ δὲ θλάσις, ὅτι ἐστὶ διαίρεσις τῷ ὅσες,
 καὶ ταύτῃ ἀντις εὐλόγως ἔδε κατὰ γμα φαίη τὴν ποταύτῃ δια-
 θεσιν. ἀλλ' ἐστὶν ὡς καὶ εἰσὶν κάμψις ὅτι τὰ ἐνδον τῷ κρανίῳ, κοι-
 λάνουσα χωρὶς τῷ λυθῆναι τὴν συνέχσαν, καθάπερ ὅτι τῶν
 χαλκῶν τε καὶ ὠμοβυσσίνων ἀγγείων ἐξοθεν πληθρομένων γίνε-
 ται. εἰσὶν δὲ τῆς θλάσεως δύο διαφοραὶ. ἡ γὰρ δι' ὅλας τῷ πᾶν-
 χος ἐαυτῇ θλάται τὸ ὅσος. ὡςε πολλάκις καὶ ἀποσπῆναι τὴν μήνι-
 γα, ἡ πάντως γε θλίβεσθαι πρὸς τῷ κρανίῳ δι' ὅλας. ἡ δὲ δι' ὅλας,
 ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐκτὸς μόνον πυγμῇ ὅτι φαίνεται ἄχει τῆς δι-
 σπλῆς. πινεὶ δὲ ταύταις ταῖς διαφοραῖς καὶ τὸ ἀπήχημα πρὸς-
 θήκασι. ὅπερ ἐστὶ καὶ αὐτὸ ῥῆξις κρανίῳ κατὰ τὰ ἀντικείμενα
 τῶν πεπληγμένων γινομένη μέρων. πλανῶνται δὲ οὗτοι. οὐδὲ γὰρ
 ὡςπερ ὅτι τινων ὑαλινῶν ἀγγείων, ὡς αὐτοὶ φασι, καὶ αὐτὰ
 γίνεται. ἐκείνα μὲν γὰρ διὰ τὸ εἶναι κενὰ τῷ πᾶν χέσιν. τὸ δὲ
 κρανίον πλήρες ἐστὶ, ὥς ἄλλως ἰσχυρόν.

Ea Latine sic reddi possunt.

Fractura in capite peculiariter calvaria est divisio, nunc simplex, nunc multifida; à vi quadam exteriorè facta. Porro differentia capitis fracturarum hæc númerantur: Rhogme, Eccope, Ecpiasma, Ecgisoma, Camarosis, in infantibus etiam Tblasis. Rhogme, Calvaria per summa est divisio, aut rima profundior, in qua nequaquam os vitiatum foras emovetur. Eccope, calvaria fissura est, cum ossis offensi rupturâ. At si à reliquo osse pars offensa discesserit, Aposcarnismon nonnulli vitium appellant. Ecpiasma in multas partes calvaria effractio est, in qua profundius ossa descenderint, & cerebri membranam contactu suo præmant. Ecgisoma, calvæ ictus est, in quo os vitiatum ad interiorem cerebri membranam descenderit. Camarosis, divisio calvaria est, in qua pars affecta calvæ modo exaltata relinquitur, ut Galenus tradit, ac intro à sanis fracturæ partibus ossa magis recedunt, membraneque innituntur, quemadmodum in ecpiasmate. sic enim ille exestimat. Alij etiam Trichismon, quasi dicas Capillationem his adnumerant. Est autem Trichismus, arctissima rhogme, sensum plerumque fallens, eoque latens: quæ quia non facile se ostendit, mortis causam sæpe adfert. Tblasis calvaria divisio non est, eoque nec fracturam rectè dixeris ejusmodi affectionem; verum est ossis calvæ

in interiorem partem impulsio, aut inflexio, concavitate integra calvæ continuitate efficiens tantum, ut licet in plumbeis, ex crudove corio confectis vasculis, si foris percutiantur illidanturve, conspiciantur. Porro Contusionis hujus duæ existunt differentie, vel enim calva per totam ipsius crassitiem contunditur, ut frequenter etiam cerebri membrana abscessu occupetur, vel omninò à calvariâ, hæc per totum, aut non per totum premitur, sed juxta exteriorem dumtaxat superficiem usque ad laminam secundam deprimatur. Sunt qui his differentijs Apechema, quasi dicas ab Echo responsionem, addiderint. Ea est, à contrariâ idus parte facta calvarie fractura. At falluntur hi, quoniam non fit in hominis calvâ quemadmodum in vitreis quibusdam vasculis fieri illi docent. Illa siquidem vacua sunt, ideoque id patiuntur: calva autem hominis undique plena & alioquin solida est.

Ὅσέον ρήγνεται τι τρωσκοῦλον, καὶ τῷ περὶ ἐχόντι ὅσέον τῷ ῥωγμῷ, ἀνάγκη φλάσιν περὶ γενέσθαι, ἢ ὑπὲρ ἐργῆ. Τῶν γὰρ βελόνων ὁ, ἢ περὶ ῥήγνυσθαι ὅσέον, το αὐτὸ τρωσκὰ φλάτο ὅσέον ἢ μάλλον, ἢ ἥσόν. αὐτὸ τε ἐν ὧπερ ἔ ῥήγνυσθιν τῷ ῥωγμῷ. εἰς ἑτὸ τρώπῳ. * ἰδεαὶ δὲ ῥωγμῶν τοῖαι γί-

* placet
hoc loco
acumen

Mercurialis, qui sic legit: ἰδεαὶ δὲ τῶν ῥωγμῶν παντοιαὶ γίνονται, καὶ γὰρ λεπτότεραι, καὶ πᾶν λεπταί, ὥστε & κατὰ φανέας γένωνται ὅτε αὐτὰ καὶ

τιῶν τραύματιν, ἢ τε ἐν τῇσιν ἡμέρησιν ἐν ἣσιν ἂν καὶ πόγων ὄφελ-
 γένοιτο ἔθναται τῷ ἀνθρώπῳ. species fissuratum diversa sunt,
 nam & tenuiores, & multum tenues, adeo ut minime conspiciantur,
 neq̃, statim post vulnerationem neq̃, in diebus, in quibus, & laborum
 necessitas mortis hominibus contingat.

γίνονται. καὶ γὰρ λεπτότεραί τε ἢ λεπταὶ παντὸς ὅς ἐστι
 καταφανέες γίνονται. ἐστὶ δὲ αἰλιον ῥωγμέων, ἔτε
 αὐτίκα μὲν τῷ τραύματι, ἔτ' ἐν τῇσιν ἡμέρησιν ἐν ἣσιν
 ἂν καὶ πόγων ἂν * ὄφελ- γένοιτο ἔθναται τῷ
 ἀνθρώπῳ. αἱ δ' αὖ παχύτεραί τε καὶ βιρύτεραι γί-
 νονται τῶν ῥωγμέων. ἐνταῦθα καὶ πάντες οὐρέαι. καὶ αἱ
 μὲν Ἰππὶ μακρότερον ῥήγνυν. αἱ δ' Ἰππὶ βραχύτε-
 ρον. καὶ αἱ μὲν ἰδύτεραι. αἱ δ' ἐμβείαι τε καὶ πάντες. αἱ δ'
 καμπυλωτέραι τε καὶ καμπύλαι καὶ βαδύτεραι.
 αἱ δ' ἐπὶ, εἰς τὸ κάτω, καὶ διὰ πάντες ὅς ἐστι.

* magnus
 Scaliger
 hic te-
 lit. le-
 git. Quē
 meo judi-
 cio Mer-
 curialis
 immerito
 carpit.

nam sub-
 jungit ip-
 se Hipp.
 hanc rem
 finem sive
 mortem
 homini
 adferre.

Os vulnere finditur. Cum autem finditur collidi
 necesse est quod fissum fuerit. quoties namque os à
 telo finditur, ab eodem plus minusve colliditur, idque
 ubi rimam fecit, Hic est unus modus. Variæ porro
 sunt rimarum species; tenuiores namque aliæ; aliæ te-
 nuissimæ; adeo ne quidem oculis uti pateant, neque
 statim post ictum, neque quo tempore dolores intendi
 solent: hocque vulneratum abripit. Aliæ rur-
 sus crassiores latioresque; quedam latissimæ; nonnullæ
 breviores, longiores aliæ; aliæ rectæ, rectissima que-

dam; nonnullæ magis minusve curvæ; superficialiæ nonnullæ, aliæ totum os ad imum usque pervadunt.


A Fissurâ, tanquam primâ Vulneris capitis specie, quæque fræquenter admodum incidit, initium facit Hippo.; vocatque ῥήγμα & ῥωγμὴ. Gal. 6. Meth. ῥήξις vocat, quamvis ῥήγμα propriè Hipp. sit Fissura; ῥωγμὴ verò Rima. ita ut Fissura ei, nil nisi major sit rima.

Text. ὁσείον ῥήγνυται ἡ κεφαλὴ τοῦ κρανίου. os vulnere finditur. hoc est, causa vulnerans violenter in caput incidens, frequenter causa est, ut cranium findatur, sive rimam agat.

Text. καὶ τὸ ἐπὶ ἐχόντι ὁσείω &c. quum autem finditur, collidi necesse est quod fissum fuerit Hic locus nonnullos interpretes torquet, existimantes Hippocratem velle, quod nunquam possit findi os nisi simul intus fidat, sive comprimatur. Ego non ita censeo, sed Hipp. velle puto, nullam posse fieri in cranio rimam sive fissuram nisi à telo obtuso. Audi eundem Coac. sect. de Tromatis Capitis aph. 5. Rumpuntur autem potissimum (capitis nempe ossa) obtusis telis. obtusum autem corpus incidens in pericranium, in eò contusionem faciat necesse est. ut per contusionis vocem Hipp. hic intelligat.

gat.

77.



a. Vestigium Felli.
b. Angustia, Capillares. Obliqua Fissura.

gat. contusionem cutis capitis, non cranij.

K. iij,

Verum,

Verum, quid si acuto gladio findatur os, dicat quis, nonne erit fissura absque contusione? illa, licet rimam referat, non tamen ita vocat; verum ἰγχοπλὴ Dissectionem; quam ego sub Dedolatione aut Perforatione comprehenderim.


Text. ἰδέαι δὲ ῥωγμῶν τρεῖς γίνονται. *Varie porrò sunt rimorum species, quas hoc paragrapho enumerat. Est rima alia evidens, cæca alia, alia media. Evidens, quæ diducta cute oculis conspici specilloque, citrà omne dubium, tangi potest. Hæc autem unicam solummodo, aut ambas cranij tabulas pervadit. Quòd qui scire possit chirurgus, postmodum exponemus. Media, quæ levior solummodo, aut ad summum extimam pervadens laminam, aut ejus superficiem solum infestans. hanc Capillarem vocant chirurgi, græcorum imitatione, Ægineta namque τειχισμὸν aut τειχοειδὴ ῥωγμὴν appellat. definiens lib. 6. cap. 90. Trichismum τειχισμὸς, σενότατη ῥωγμή καὶ πλὴν αἰσθησιν διαλαθάνουσα διὰ πολλάκις λεληθῆσα διὰ τὸ μὴ ἀκρεβῆ ἡμετέρας πλὴν σημείωσιν, θανάτου γέγονεν αἰτία. *Trichismus est artissima Rhogime, sensum plerumque fallens, eoque latens, que quia non facile se ostendit, mortis causam sepe adfert. Cujus insignis loci autoritate fretus**

græcum hunc Hipp. textum doctissimè corrigi-
 git, magnus ille Anutius Boësius, legens;
 καὶ τὸ λεπτότερά τε, καὶ λεπταὶ πάντες οστέα καταφανέες γίνονται
 ἐνίαι τῶν ῥωγμῶν, ὅτε αὐτὰ μετὰ τῶν τρώσιν, ὅτε ἐν τῇσιν ἡ-
 μέρησιν, ἐν ἧσιν ἀνὰ καὶ πόναν ὁφθαλμοὶ αἴτιον γίνονται τοῦ θανάτου
 τῷ ἀνθρώπῳ.

Cæcam portò Rimam (quæ tertia erat) vo-
 co) quoties non in quem ictus incidit lo-
 cus, sed alius aliquis in capite finditur, seu ri-
 mam accipit. Hæc ἀπήχημα dicitur Græcis.
 Hanc Soranus antiquus medicus primum no-
 tavit; Vidit Celsus. Frustraque eam aliquando
 contingere, cum Paulo nonnulli ex neoteri-
 cis negant. De hac plenius paulo post, in po-
 strema vulneris specie cum Hippocrate.

καὶ γὰρ λεπτότερά τε καὶ λεπταί. *Tenuiores enim aliæ, Text.*
aliæ tenuissimæ. Fissuras alias alijs latiores, an-
 gustiores, alias profundiores superficiariasve
 esse jam dictum. Illud verò monitum, sci-
 tu necessarium chirurgo; quò angustiores
 sunt rimæ si profundæ sunt, eò plus adferre
 periculi; patentiores ac hiantes minus. Cu-
 jus rei causæ, primò, quò amplæ rimæ Chi-
 rurgi visum non effigiant, uti contrà angustæ
 aut cæcæ faciunt non rarò; eoque securo, nec
 de sculpturâ, rasurâ alijsve, cogitante reme-
 dijs,

80.



a. Fels. Scels.
b. Fissura Ampla.

dijs, invalefcens malini agrum obruit. Ac-
cedit,

cedit, quòd patentiores rimæ, naturæ ad expellenda noxia præbeant spatium, hincque ad periculosum modiolii usum confugere opus non sit. Ipse hanc ad rem ita loquitur Hipp. Coac. sect. 12. aph. 7. *ossum rimæ occultæ interdum non ante septimum diem, decimumquartum interdum, interdum serius se ostendit. Nam caro ab osse abscedit, tumque os lividum apparet. dolores item ichorum diffluentium exitantur. Atque hæc talia remedijs difficulter cedunt.* Occultam hic vocat rimam, quæ non conspicitur, idque; aut ipsius fissuræ ratione; aut chirurgi negligentia. Fissuræ ipsius, si capillaris sit; si in suturas incidat. Negligentiâ chirurgi non pauci moriuntur. In occultâ rimâ, aut subtili admodum, id maxumam difficultatem adfert, quòd carunculæ illæ quæ in tabularum visuntur meditullio, præ concussione (nam rimas ut plurimum obtusum facit telum) compressæ, sanguinis aliquid effundant. is dicto putrescens loco, os in inflammationem rapit. Observatum non semel, inflammatione tactum fuisse locum inter duas tabulas medium. Hincque fit, aliquot interdum septimanis, addo & mensibus post acceptum ictum, ut percussus nihil mali suspicetur

cetur, sicq; præter expectationem succum-
bat. Vide de morte subsequuta, ex neglectâ
capitis rimâ, apud Schenck. Observ: tom: 1.
34. Et exemplum valde nobile. apud Vale-
riol: cap. 5. Appendicis loc. comm. Præter
plurima à me observata. Vnum admodum
est nobile; Quidam Anno 1603 poculo stan-
neo à compotore in bregmatis os dextrum,
non procul à musculo temporali, percussus
fuit. Aperto pericranio, nihil fissi se depre-
hendisse asserbat Chirurgus. (qui medicum
non acciverat) consolidato itaque quod in
pericranio erat vulnere, æger obambulans,
rerumq; suarum satagens, pancreaticè se vale-
re quotidie asserbat. Post decimum men-
sem interambulandum vertigine correptus
concidit, neque diu post obiit; aperto cra-
nio, depressum, os loco ictus planè com-
putruisse; Nigricans enim non absq; insigni
fœtore, ipsam menyngem in consensum
traxerat. Notent itaque chirurgi, majores
patentioresque fissuras, angustis minus esse
debere suspectas; audiantque Celsi consi-
lium *Omnia suspicari.*

Text.

ὅτι βαδύτερον. rectè à nonnullis animadver-
sum. V oculam hic desiderari, legendum-
que

que: αἰ μὲν Πιπλούτεραι, αἰ δὲ βαθυτέραι. Vult enim, (quod jam à nobis explicatum) fissuram aut superficiariam, aut profundiore[m] esse.

φλασείη δ' ἂν τὸ ὅσέον ἐν τῇ ἐπιφάνει φύσει, καὶ ῥωγμὴ τῇ φλάσει οὐκ ἂν προσχέουτο τῷ ὅσέῳ ἐδεμία. δαύτερθ' ἔτθ'. ἰδέαι δὲ τ' φλάσιθ' πλείους γίνονται. Ἐν μᾶλλον τὲ καὶ ἥσων φλάται, Ἐς βαθυτέρον τε καὶ διὰ παντὸς τῷ ὅσέῳ, καὶ ἥσων ἐς βαθὺ, καὶ διὰ παντός τῷ ὅσέῳ. καὶ ἡ πλεον τε καὶ ἐλασσον, μήκεός τε καὶ πλατυπύθ'. ἀλλὰ τετέων τῷ ἰδεῶν, ἐδεμία, ἐστὶν ἰδόντι τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν γινώσκειν, ὅποιον ἕς ἐστὶ τὴν ἰδέαν, καὶ ὅποσον τὸ μέγεθ' ἔσθ'. ἐδὲ γὰρ εἰ πέφλασαι, εἰσὶν πεφλασμένων καὶ τῷ κακῷ γενηνημένων, γίνεθ' τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι καταφανὲς ἰδεῖν αὐτὴν καὶ μὴ τὴν τεῶσιν. ὥσπερ ἐδὲ τῷ ῥωγμῶν ἕναι ἐκὰς ἔσθαι καὶ ἔρρωγ' ἔτθ' ὅσέῳ.

Contundi quoque os potest, quomodo in suo statu maneat, et nulla offi colliso se jungat rima. Atque secundus hic est modus. Sunt vero contusionis species plures; etenim aut plus aut minus contunditur; etiam, aut contusio pervadit totum os, aut in summo magis heret, non in toto. Etiam longitudinem latitu-

autum

L ij


dinem-

dinemque nunc maiorem, nunc minorem ostendit. Nulla autem harum contusionum aspectu dignosci potest, qualis nempe quantave sit. nam postquam quid contusum est, non protinus ab ictu malum se videndum præbet; sicuti etiam osse fisso nonnullæ ex rimis quæ longius tendunt.

Descriptâ Rimâ sive Fissurâ, læsionis cranij specie primâ, Secundam nunc proponit; quam *φλάσι*, vocat, *θλάσι* Galenus ac Paulus. Vertunt interpretes Contusionem, & Collisionem. Quamvis inter eos qualisnam hæc sit species, seu quonam modo cranium in hoc læsum sit, non conveniat. Non desunt, qui solutæ in osse continuitatis velint esse speciem, cum sub irruente extrinsecus aliquo violento, valido & duro corpore, os ita contunditur, ut externa facies integra permaneat, at in profundo sint parvæ & multæ divisiones. quod in puerorum ossibus maxumè contingere volunt. Alij (quibus nos accedimus) *φλάσι* cranij affectum dicunt, quo ossis continuum non solum, forinsecus saltem ac ad sensum. ita conceptis verbis hic ait Hipp. *Contundi quoque os potest, quamvis in suo statu maneat, & nulla colliso ossi se jungat rima. Quid potest dici manifestius? nisi dicere velimus*

linus, nullam accedere ossi sensualem continui solutionem. Eodem modo, ut in convulsione medici dicunt, esse continui solutionem, sed sensibus incompertam, quia adest dolor. at verò, nunquam credo vocaverint vulnus. Idem si hic dicant, jam non est magna difficultas. quis enim non videt, quum præ contusione intus deprimitur os, in se cogi, atque eâ ratione aliquam sed obscuram sensibusque non perceptibilem dare continui solutionem? origo namque vocis Græcæ est à $\phi\lambda\acute{\alpha}\omega$ & $\theta\lambda\acute{\alpha}\omega$, quod est conquasso, premo, collido. at verò id citrà rimam, fracturam, aut fragmentorum potest fieri a vulsionem, quæ in verâ sive manifestâ requiruntur continui solutione. quid? quòd priorem si amplectamur sententiam, jam inter secundam & tertiam læsi cranij speciem, discriminis fuerit nihil. Statuimus itaque, $\phi\lambda\acute{\alpha}\sigma\iota\sigma\iota$ seu $\theta\lambda\acute{\alpha}\sigma\iota\sigma\iota$, Contusionem, Collisionem, esse cranij ad interiora depressionem, ita ut tangentibus ac intuentibus exterius lacuna sive fovea appareat. Eodem modo, uti indies in stanneis, plumbeis, cupreis, aut etiam figulinis nondum coctis accidere cernimus vasis. Quod ipsum pueris, fœminis,

86.



etque quibus molle ductile sive depressile

non

non tamen fragile contigit cranium, evenire solet. Hi namque si à corpore obtuso valide in caput feriantur, cedit ac desidit, non tamen rumpitur cranium. Etiam in adultis interdum accidit. Habet exempla hujus casus plura Clarissimus Hildanus, observat. Chirurgic: Centur. 2. eaque lectu dignissima. Accidit tamen subinde, ut cum fractura hæc incidat species. Exemplum videre est est apud Pareum lib. 9. Cap. 8. de nobili quodam equite turmæ ducis Stempiani. Is dum in disjecta murorum castri Hefdini parte propugnaret, glande tormento manuario missa ictus est in bregmate, alioqui casside armato. Cassidem quidem glans impulsæ depressit, non fidit: imò nec cutem musculorum, nec cranium, quod saltem cerni posset. nihilominus sexto die Apoplecticus interijt. aperto cranio, visum, laminam internam fractam, fragmentaq; ex se emittem, quæ tanquam aculei cerebro inhærebant, integrâ interim tabulâ cranij externâ. Verum hic casus proponit verum cranij vulnus, pertinetque ad sequentem modum seu *ισφλασι*. In hoc, non nisi depressio est cranij, citra ullam continui divisionem, nam retrah-

ctum

etum cranium inque suum locum restitutum nihil amplius mali habet. Huic negotio non unus inventus est modus, prout diversa fuerit capitem varietas. Crasso namque duroque cranium alia debetur ratio quam puerili, foemineo, molli ac flaccido. Hisce, cucurbita denudato depressoque admota loco, si naribus oreque clauso valide expirare nitatur æger, idonea. Doctissimus ingeniosissimusque huius ævi chirurgus Guilielmus Hildanus, eidem fini corneam excogitavit cucurbitam, parte fastigiata paulum incurvam, ibidemque foramine non amplo apertam, quam lacunæ appositam, ægro nares ac os claudente, ore apprehendit minister, cui latera firma, validaque præditus inspiratione, ut forti illâ suctione in suum redeat locum depulsum os. Idem sequentem miscellam emplastri formâ loco læso admoveat, & postquam topicum siccatum firmiter cranio glutinatum hæserit, illud sursum trahendo ac avellere conando (funiculi eo fine emplastro extus additi) eâ ratione thlasin suæ restituit integritati.

Farina triticea 3j. Ichthyocolle aqua betonica & salviae dissolutæ 3ß pulve. mastichis, thuris



Fig. prima.
DT orcu-
lar.

E. Vectis,
transiens
per tere-
bram no-
tatam. B.

C Sufful-
crum, aut
latior tor-
cularis

pars, ca-
piti impo-
nenda.

A Bifida
terebra
pars, de-
presso infi-
gēda loco.

Fig. secunda
* Empla-
strum, cui
additifu-
niculi,
quib² sur-
sum trahi
possit.

Fig. tertia.
X Cornea
cucurbi-
ta, incur-
va, habēs
altero ex-
tremo o fo-
ramen.

thuris, farine volatilis, sanguinis draconis.

M

gipsi

gipfi ana q. s. misce. coque in aqu: betonica & salvia ad debitam consistentiam. applicetur calide

Firmioribus cranijs major debetur conatus. ijs itaque in centro depressi loci apprimitur elevatorium manubriatum, habens altero extremo forantem terebram, quò infixò conandum retrahere in suum locum depressum os. Aut instrumentum, cuius jam dedimus figuram, depresso affigitur loco, eaque ratione reducitur.

Cum autem hic læsionis cranij modus vulnus dici nequeat, anne incommodi aliquid secum adfert? maxumum certe. Quò namque depressio validior, eò extus lacuna apparet major; eoque intus magis protuberet cranium necesse est; locus ille protuberans premens menynge, imò cerebrum, impediat ejus liberum motum necesse est; inde apoplexiæ periculum. haud aliter namque hic fit, ac in pleuritide, in quâ distentâ tumidaque thoracis capacitatem versus pleura, motum pulmonis impediri videmus; inde namque respiratio intercepta. Vt non dicam, ictus vehementiâ non posse non validè cerebrum concuti, indeque lacerari aut medullo-

firatam

ficatem cranij, aut rumpi exilia illa quæ inter duram ac tenuem membranam sunt vascula; unde maximus mortis metus.

καὶ ἦσαν ἐς βαθὺν, καὶ διὰ παντός τοῦ ὁσέως. Nonnulli hic Τεκ.
ex Aegineta restituunt, καὶ ἔτι διὰ παντός. retineri
malim priorem lectionem, utpote affirmati-
vam. Mens enim Authoris est; Collisionem
interdum adeo esse validam, ut subjecta
membrana insigniter prematur; levio-
rem interdum, ita ut non nisi externa tabula de-
pressa sit, ad meditullium usque. qua in re
minus difficultatis. Quamvis juvenem vide-
rim 26. annorum, cui licet levis appareret in
externâ tabulâ lacuna, nihilque æger inde se
incommodi percipere diceret, eoque secu-
rus nihil moliretur chirurgus; tamen trime-
stre post succubuisse vulneratum, laceratis
meditullij carunculis, indeque in putredi-
nem imo sphacelum tractâ non solum inter-
nâ tabulâ, verum ipsa insuper subjectâ mem-
branâ.

ἐσφλᾶν τὸ ὁσέον ἐν τῇ φύσει τῇ ἐωυτῇ ἔω σὺν
ἐω γμῆσιν. ἄλλως γὰρ οὐκ αὖν ἐσφλαδεῖν. τὸ γὰρ
ἐσφλάμενον, ἀπορρήγνυμενον τε καὶ καταγνύ-
μενον, ἐσφλάται ἐς ὡς ἀπὸ τῆς ἄλλης ὁσέως μέρους.

τὸ ἐν τῇ φύσει τῇ ἐωυῖ. καὶ οὖν οὕτως ἐρωγμὴ αὐ-
 πορσεῖν τῇ ἐσφλάξῃ. τρίτῳ ἔτῳ τρέπτῳ
 ἐσφλασαι δὲ τὸ ὅσέον πολλὰς ιδέας. καὶ γὰρ Πι-
 πλέον τὸ ὅσέον καὶ ἐπ' ἑλασσον. καὶ μᾶλλον τὸ καὶ
 ἐς βαθυτέρον κάτω, καὶ ἥσσον τὸ καὶ Πιπολαίο-
 τερον.


*Deprimitur verò os, & fissum a suo statu in interio-
 rem partem desidit. nū enim fissum esset, medium de-
 sidere nequireret. Etenim ab integro abruptum osse,
 quod in suā integritate permanet, intrò cedit: ut ne-
 cesse sit ita depressum os findi. Tertius hic est mo-
 dus. Deprimitur autem os diversimodè; aut enim
 majus minusve est ossis quod desidit fragmentum; aut
 idem multum sub alio se effert osse, aut parum.*

Tertium nunc proponit vulnerati cranij
 modum, quem ἐσφλασιν ἢ φλάω deprimο, im-
 pello, vocat. Galenus sub θλάσει nomine
 comprehendit. Ita Hipp. Prorrhet. 2. ἐμπε-
 φλάσμιμον ὅσέον habet: quod hic vocat ἐσφλάμιμον
 ἔσω. Est hoc verum capitis vulnus; continui
 solutionem non solum secum trahens, sed
 veram fracturam. Latini Depressionem, De-
 selsionem, Introcessionem; Contrusionem
 dicunt. Vitium magnum, & si quod aliud,
 summo conjunctum cum periculo; Ægi-

neta ἀποσπερσισμὸν dicit, credo à dolabra
 (σέπαρον Græci vocant) fabrili instrumento;
 in quo sicuti ferramentum quo ligna dedolan-
 tur semper exstat ac prominet, ita hoc casu
 semper pars ossis abrupta visitur. Est vitium
 compositum ex duobus jam explicatis, & à
 paucis bene intellectū. Accidit enim quoties
 præ ictus vehementiâ os non solum finditur
 ac intro truditur, verum insuper frangitur;
 fragmentumq; fracturâ secedens, sub ora sive
 limbo ossis vicini integri truditur. Hic valida
 necesse est adsit contusio sive collisio; nam
 pars ossis sub osse trusa non potest non com-
 primere menyn gem, ejusq; impedire motum.
 Ita ἐσφλάδαυ ὁσέον, intro cedere os dicitur, quum
 medium desidit & intro deprimitur. Mo-
 dum hunc Celsus probè novit, utpote nulla
 vulnere cranij specie tantum uti hac occu-
 patus; quum revera à nullo vulnere tantum
 periculi. quod ita describit: Cap: 4. lib: 8.
Duo verò sub ictu calvaria pericula sunt, ne vel fin-
datur, vel medium desidat. si fissum est, possunt ora
esse compressæ, vel quia altera super alteram excessit,
vel etiam quia vehementer rursus se commiserint.
Ex quo evenit, ut humor ad membranam quidem
descendat, exitum verò non habeat, ac sic eam irri-

„ tet & graves inflammationes moveat. Vbi medium
 „ defedit, eandem cerebri membranam os urget; inter-

94.




V. loca exhibentia Teli sedem sive vestigium.

B. vera Esphlasis; in qua fractum depresso, os sub oppositi integri limbo se ingerit.

dum

dum etiam ex fracturâ quibusdam, velut aculeis pungentibus. Quid posset elegantius Celsus? qui ibidem prolixum subjungit modum, quo succurri huic debeat malo. quem paulo post in curatione ab Hippocrate allata examinabimus. Hæc porrò vulneris species pluribus potest fieri modis. 1. si solummodo portio ossis, etiamnum integro adhærens, ex parte lateat sub oppositi ossis limbo. 2. si fracturâ, portio ossis ab integro avulsa, & fragmentum universum sub osse integro aut vicino se receperit, ita ut nec conspici queat, nec instrumentis chirurgicis apprehendi extrahive. 3. si in aliquot fragmenta divisum os, eorum nonnulla menynge infixâ hereant, imò eam pervadentes ipsi cerebro. 4. si ipso fissuræ fracturæve loco utraque ora ita sit depressa ac introrsum trusa, neutrius uti limbus orave forfice ut retrahantur, apprehendi possit. quo casu, rasis prius scalpro fracturæ ac depressionis labijs, commodus erit usus instrumentorum quorum descriptiones ac picturas in præcedentis speciei explicatione dedimus. quæ si educendis non sufficiant fractis depelsisq; ossis fragmentis, trahatur in usum sequens instrumentum.



οὐν ῥωγμῆσιν, *Fissum*. His verbis Hipp. manifestè requirit in Esphlasi, ut os fissum sit: ut mirandum sit Gal. lib. de Caus. morb. sufficere in hac specie, tantummodo ossis in interiora recessum absque continui solutione; nam hoc fit in Phlasi, præcedente specie. Neque minus miror, eundem Galenum ita à præceptoris sui, Hippocratis, quem tanti ubique facit, sententiâ abire, ut eodem lib. non nisi duas ἐσφλάσεις species faciat; unam, cū cavitas feriente remotò servatur; alteram, ubi mollia corpora post ictum ad priorem habitum redire solent; neque cavitatem retinent. nam prior ab ipso relata species vera Contusio est; altera ne quidem cranij læsio. ubi enim nihil neque fissum neque fractum neque collisum est, sed ossa depressa post ictum sponte in suum redeunt locum, quænam quæso hic læsio? Cum verò Hipp. hic ait ἐσφλάσαι δὲ τὸ ὀστέον πολλὰς ἰδέας, *Deprimitur os diversis modis*, non adstringit se ad duos illos loco jam citato à Gal. relatos, nam eos ne novit quidem, saltem sub Esphlasi non comprehendit; sed intelligit illas ἐσφλάσεις species quas paulo ante dedimus, iisque similes.

καὶ ἔδρης γυρομήνης ἐν τῷ ὀσέῳ βέλεσθαι, πρὸς
 γυροῖς ἀνρωγμὴ τῇ ἐδρῇ, τῇ τε ῥωγμῇ καὶ φλά-
 σιν πρὸς γυνεᾶς ἀναγκαῖον εἶναι, ἢ μᾶλλον, ἢ ἥσ-
 τον, ἢ ἥπερ καὶ ῥωγμὴ πρὸς γυνή) ἐνθάπερ ἔ-
 ἔδρη ἐγγύς. καὶ ἡ ῥωγμὴ ἐν τῷ ὀσέῳ τῷ περὶ
 χονί τινι τε ἔδρῳ ἔτι καὶ φλάσιν. τέταρτος ἔσθαι
 τρόπος. καὶ ἔδρη δὲ ἔξ βέλεος γίνε) ἐν τῷ ὀσέῳ.
 ἔδρη δὲ καλεῖ), ὅταν μῦρον τὸ ὀσέον ἐν τῇ ἐνυλῇ
 φύσει, τὸ βέλος σηρίξαι ἐς τὸ ὀσέον δῆλον ποιήσῃ
 ὅπῃ ἐσήειξεν. ἐν δὲ τῷ τρόπῳ ἐκάστῳ πλείονες
 ιδέαι γίνονται. καὶ περὶ μὲν φλάσιος ἔξ ῥωγμῆς,
 ἢν ἅμφοταῦτα πρὸς γυνή) τῇ ἐδρῇ, ἔτι καὶ φλά-
 σις μόνῃ γυνή)ται, ἥδη πέφρασαι, ὅτι πολλὰ
 ιδέαι γίνονται) καὶ τὸ φλάσιος καὶ τὸ ῥωγμῆς. ἡ δὲ
 αὕτη, ἐφ' ἐωυτῆς γίνεται μακροτέρη καὶ βραχυτέρη
 ἔσθαι, καὶ καμπυλωτέρη, ἔτι καὶ κυκλω-
 τερέη. καὶ πολλὰ ἄλλα ιδέαι ἔτι καὶ τριῶν τρόπων,
 ὁποῖον ἀνὴρ καὶ τὸ γῆμα, ἔξ βέλεος ἢ. ἔτι δ' αὖται
 καὶ βαθυτέρας τε καὶ ἥσσον καὶ μᾶλλον καὶ ἥσσον.
 καὶ στενότεραι καὶ εὐρύτεραι, καὶ παῖν εὐρέαι, ἢ
 διακεκόφαιαι. διακόπη δ' ὁπόσῃ τις οὖν γυνο-
 μὴν μήκεός τε καὶ εὐρύτης ἐν τῷ ὀσέῳ ἔδρη
 εἶναι. καὶ τὰ ἄλλα ὀσέα, τὰ περὶ χονί τινι διακο-


πλῆ

πῶ μὲν ἐν τῇ φύσει τῇ ἐωυτῶν, καὶ μὴ συνεσ-
φλᾶ τῇ διακοπῇ ἔσω τ' ἐκ φύσεως τ' ἐωυτῶν, ἔτι
δ' ἐσφλασις δ' αὖ εἴη καὶ ὅκ ἐπὶ ἐδρῇ.

Ubi verò telum sedem sive vestigium in osse re-
liquit, potest etiam adesse rima; & cum rima adest,
necesse est plus minusve collidatur os, quum qua par-
te rima ossi inciso accedit, eadem vestigium teli se
ostendit. Modus hic quartus est; cum nimirum ve-
stigium teli in osse remanet. Vocatur namque sedes
sive vestigium, cum osse alias in sua integritate ma-
nente, videre tamen licet quâ parte telum fuerit.
Sunt singulorum modorum plures species. quod nam-
que ad fissum & collisum attinet, sive ambo hæc sedi
adsint, sive tantum collisio, plures emergere tum fissi-
tum collisi species jam dictum. Sedes porro per se lon-
gior breviorve est, recta magis aut curva rotundave;
multæque alie sunt differentie, pro teli diversitate.
Num aut profundius aut minus se immittit: estque
aut angustius, latius, aut latissimum vestigium, si
adsit Precisio. Precisio autem quantum ossis in lon-
gitudine latitudineve occupaverit, refertur ad vesti-
gium, modo alia ossa que sic incisa sunt in sua ma-
neant integritate, neque precisa à suo statu in inte-
riora compellantur. id namque si fieret, jam sedes si-
ve vestigium non amplius esset, nam os medium de-
pressum esset.

Tres descripsit violati cranij differentias, quartam nunc adjicit. hanc ἑδρῶν peculiari vocat voce. Interpretum alij Sedem, alij Vestigium vertunt. Derivatur Græca vocula ab ἑῶν quod est colloco. ἑδρᾶ enim ipsis sella, ac sedes. ita Hipp. ἑδρᾶ, ipsas quibus insidemus, nates significat Epid. 5. Aurelianus Sessionem vocat. Explicaturus hanc vocem Erotianus, διακοπή γὰρ καὶ ἑδρῶν ταύτων ἐστὶ, inquit; Præcisio & teli vestigium idem sunt. quod cum Galeni sententiâ convenit, qui 6. Meth., ἐγκοπῶν, διακοπῶν, καὶ ἑδρῶν, unum idemque esse asserit. Ita hic ἑβέλει ἑδρῶν dicit Hippocrates. Quæ evidenter ostendunt. non parum eos errare, qui ἑδρῶν tantum putant esse quum teli vestigium in cranio apparet; nam tum ἐγκοπή dici potest, διακοπή non potest. Auferatur alicui latâ acutâque machærâ portio superficialia ab externâ tabulâ, intacto meditullio, nonne ex vestigio quod machæra reliquit quivis facile iudicabit id lato telo factum esse? est ibi in osse continui solutio. quam tamen nullus ἐγκοπῶν dixerit, cum illo acuto gladio rectâ lineâ in caput incidente fiat necesse est; sed διακοπῶν Præcisionem, nam pars ossis præcisa ac ablata est.

101.



A. Exemplum Vestigij, exhibens partem cranij superficialiariam, machera ablatam.


N. iij.

Vt

Vt res intelligatur, potest εἰδέναι sive quarta hæc vulneris capitis species quatuor contingere modis. 1. quum quis pugione ita feritur, vestigium ictus uti in osse appareat, aut cum machaerâ, aut glande è tormento emissâ portio superficiei cranij aufertur.

Hic casus omnium minimè periculosus; nam ejuscemodi ictus obliqui sint omnes necesse est, qui tantam capitis concussionem aut tremorem excitare nequeunt, uti ictus rectilinei, ut qui in se recurrentes, ictuum vim duplicant: 2. quum acumine gladij aut pugionis ita læsum cranium, teli uti vestigium in exteriori se ostendat cranij superficiei, simulque quod reliquum est cranij fissum sit. nam faciliè videbit chirurgus quousque os tetigerit telum; apparente sensim rimâ. 3. Quum cranium collisum seu intus depressum, simul fissum est. nam depressio ab acuto telo difficulter fieri potest. uti si quis ex alto in declive rectâ in caput cadat. Si quis lapide, fuste, globo cathenæ nexo, vulneretur. Talis erat ejus quem vidimus casus quem adversarius, pugionem manu tenens, ferierat globo quem habet pugionis summitas. is composito ex rimâ & collisione laborabat vulnere.

103.



- A. Teli vestigium, sive sedes in cuius medio. B. apparet simul rima.
 C. Exhibens veram Fractura ideam; utpote in qua rima necesse est
 omni ex parte fractum, fluctuansq; fragmentum, cingat.
 D. Fissura, citra fracturam.

Nam rotunditas manubrij ita sui vestigium
 in osse

in osse reliquerat, evidenter cognosci uti posset; unaque rimam insignem utramque pervadentem tabulam ostendebat cranium.

4. Quoties cranium finditur, frangitur, deorsum deprimitur, & simul introtruditur, hoc est, quum ῥήξις, θλάξις, ἑσφλασις cum ἑδρα coincidunt.

Sed anne hæc ex mente Hipp., dicat quis? planè. textum inspicite: *Vbi telum sedem sive vestigium in osse reliquerit*, primus hic modus. *potest etiam adesse rima*, secundus. *Et cum rima adest, necesse est plus minusve collidatur os*, tertius. *quin quâ parte rima ossi insciso accedit*, modus quartus, quæ ipsa citato jam paragrapho plenius adhuc profequitur.

Illud porrò notandum, tam ἑσφλασιν quam ἑδρην plures admittere Hipp. differentias, quæ tamen nonnisi species existunt singulorum generum; at quæ Hipp. species sunt, ex illis Ægineta alijque genera facere conati sunt. Hæc causa longè plura læsionum cranij genera, apud nonnullos, quàm Hipp. quòd repariantur. Hippocrates namque, ne res in infinitum aut incertum excreceret, omnia ad quinque universalia summa genera redegit. Laudanda certe in eo est antiquitas, compen-

diosè

diosè omnia quod tractarit nobisq̃ue reli-
querit, quum nihil magis discentium ingenia
turbet, distrahatq̃ue, quàm multijugæ illæ
subdivisiones. Cujus rei luculentissimum
nobis præbet testimonium, botanicum stu-
dium. Ita Hippocrates, duas solummodo sta-
tuit medicinæ partes, Adjectionem, & Ab-
lationem; posteriores multo plures. Veteres,
pathognomonicum morbi signum esse di-
cunt, actionum læsionem, illudq̃ue tribus ap-
parere modis, diminutè, depravatè, abolitè;
Neotericorum nonnulli, impeditam, pro
quartâ, nimiam, pro quintâ; dubiam, pro
sextâ adjiciunt. Veteres tria statuunt summa
morborum genera, Intemperiei, Conforma-
tionis, Vnionis; Neotericorum nonnulli a-
lia adhuc duo adjici volunt. Paracelsus plura
quàm duodecim nova excogitavit. Et tamè,
dicunt, qui bene distinguit bene docet; Verè
dicis, sed aliud est bene, aliud nimium di-
stinguere. Verius illud, nimium subdisting-
uendo amittitur veritas. nam dimidium
plus toto, uti prudenter Hesiodus. Senecam
hanc ad rem audi Epistola 89. *Faciám ergo quod* “
exigis, & Philosophiam in partes, non in frusta, di- “
vidam. Dividi enim illam, non concidi, utile est. “
O
Descri-

- „ Describitur in tribus populis, in centuriis exercitus.
 „ Quidquid in maius crevit, facilius agnoscitur, si dis-
 „ cessit in partes: quas (ut dixi) innumerabiles esse et
 „ paucas, non oportet. Idem enim vitij. habet nimia,
 „ quod nulla divisio: simile confuso est, quidquid us-
 „ que in pulverem sectum est.

ὅς ἐον ὑπερώσκει ἄλλη τ' κεφαλῆς ἢ τοῦ ἐλκθ-
 ἔχοντος ἀνδρῶπι, καὶ τὸ ὅς ἐον ἐψιλώθη τ' σαρκός.
 πέμπει ἔτι πρόπι. καὶ ταύτῃ τῇ συμφο-
 ρῇ ὅταν γῆται, ὅσα ἂν ἔχοις ὠφελῆσαι εἰδέν.
 εἰδὲ γὰρ εἰ πέπονθε τὸ κακὸν τῆτο ὅσα εἰσι ὅπως χεῖ-
 αι τὸν ἐξελέγξαντα εἰδέναι εἰ πέπονθεν τὸ κακὸν
 τῆτο ἀνδρῶπι, καὶ δὲ ὅπη τ' κεφαλῆς.

Os sub vulnere frangitur loco alio, quàm qua vul-
 nus est osque nudatum fuit. Hic modus quintus.
 Quod infortunium ubi accidit, nullis ei remedijs suc-
 curras. Non enim scire potes ubinam malum ha-
 beat; imo num ager vulneratus sit, aut quam ca-
 pitis parte etiamsi maxumè quæras certior fieri
 potes.

- Hic proponit quintum postremumq; vul-
 „ nerati cranij modum; quem peculiari voce
 „ συμφορῇ Hipp. appellat; Vertunt Interpretes,
 „ Infortunium. Et certè verè infelices ac in-
 „ fortunati ejuscemodi existunt ægri, qui nec
 ipsi

ipsi sciunt, an & quo loco læsi sint, nec quoque medicus aut chirurgus hac de re certior fieri potest, nisi cum jam conclamatum est. Multis autem fieri potest modis. Fronte icta integra, finditur occiput; aut contra. Vulneratur tempus dextrum; ibi omnia illæsa, nisi quod fissum tempus oppositum; aut viceversa. Aut etiam si non locus rectè oppositus, vicinus læditur, illæso eo qui ictum accepit. Vidi ictum bregmatis os sinistrum quâ lambdoidi jungitur, fisso sincipitis osse dextro, idque prope bregma, loco ita vicino coronariæ futuræ, in ipsam uti rimæ pars se extenderet. Iam subinde accidit (hic omnium miserrimus casus) in externam uti tabulam incidens ictus, illâ illasâ manente rimam agat subjecta: neque solum rimam agat, sed & interdum fragmenta de se emittat, meningem, imò ipsum quæ pungant cerebrum.

Hæc vulneris cranij species Celso fuit nota, qui eam ita adumbrat Cap. 4. lib. 8. *Solet etiam evenire, ut alterâ parte fuerit ictus, & os alterâ fiderit. Itaque si graviter aliquis percussus est, si mala indicia subsequuta sint, neque ex parte quæ cutis difficillima est, rima reperitur, non incommodum est parte alterâ considerare, num quis locus mollior sit, &*

fit, & tumeat, eumq; aperire. Quid si nihil mol-
litiei illic ostendat locus? Quid si opposita
parte non fuerit fissura, sed aut vicina aut aliâ?
quid si interna tabula fissa sit? certe si quis
non nisi merâ fretus suspicione hanc illamve
capitis partem fecerit, nihil inibi detrimenti
inveniat, & æger postmodum moriatur, non
poterit crudelis medici evitare nomen, ve-
rum notam tam sibi quàm arti inuret non
eliendam. Miserum ac infortunatum hunc
casum, Resonitum alij, alij Contrafissuram
vocant, ejusque non unum videre est exem-
plum apud Pareum, Fallopium aliosque. Mi-
ferrimum mihi visum in pago vicino. Juve-
nis quidam currui insidens metuensque ne
vacillans concideret, e curru dum pro-
filere conatur, capite pronus in terram
concidit. Sublatus pro mortuo, aphonus,
vix respirans. ad se paulum ubi redisset, vo-
luit obijt tertio post casum die. Dissciso
post obitum pericranio, in externâ cranij su-
perficie apparuit nihil, ne lationis quidem
vestigium; calvâ ablatâ, conspectum, eo in
quem ceciderat, loco ab internâ parte, ingens
avulsum fragmentum, quod per utramque
cerebri partem perque intermediam divisu-
ram

ram se trajecerat, unde motus ejus visceris
 dubio procul impeditus, indeque mors. Ad
 quem casum notandum, multis de causis fie-
 ri apoplexiam; quas ad duas referri posse pu-
 tem. Fit namque, aut ab externâ, aut internâ
 causâ. Externâ, uti præ valido in caput inci-
 dente ictu, cerebri concussione, mentisq;
 percussione adferente. præ subito tremore,
 mentisque perturbatione. præ fulgure, ful-
 mine. A causâ internâ, quatenus animali spi-
 ritui exitus, aut aditus prohibetur. aditus,
 uti subito si obstruantur iugulares venæ, ca-
 rotidesve arteriæ. Exhaustis namque anima-
 libus spiritibus, restauratio nulla fit, inter-
 cluso spiritibus vitalibus aditu. apoplexiam
 ab hac causâ notat Hipp. aph. 43. 44. 2. tum
 & aph. 6. 6. exemplo eorum qui potu obruti.
 nam illi est vera ἀπώλησις, arteriarum nimirum
 venarumque interceptio. Huic curationem
 præscribit Epid. 2. *aphoniam febris expertem, san-* cc
guinis missio solvit. Et ibidem paulo post: *quod* cc
quis repente obmutuerit in causa est, venarum in- cc
terceptio, si bene Valenti accidat; oportet itaque ve- cc
nam cubiti interiorē secare. Hanc eâ quâ anima- cc
 litati exitus prohibetur ideo minus periculo-
 sam iudicari, quoniam hic nimia illa ma-

teriarum copia intra vasa quum hæreat, educi potest, institutâ tempestivè liberali evacuatione. Exemplo sit eclipsis Solis & Lunæ; quarum illa cum mora est nunquam, hæc sæpissimè. Quam causât denegatus spirituum animalium exitus, plures agnoscit causas. Cum nimia nonnaturalis humoris copiâ, capacitas ventriculorum cerebri repletur, simulque ventriculis contentus choroidis plexus. Si tantum arteriolæ dictum plexum constituentes nimis repleantur, ventriculis liberis manentibus. Universum cerebri corpus alienâ si inferciatur materiâ, pori dico illi quos habet dicti visceris porosa foraminulentaque substantia, ut quæ spongiæ in modum se habet. Quod si ventriculi, plexus choroides, ipsa que cerebri porositas, omnia hæc inquam simul repleantur, maxuma orietur apoplexia. uti & si concidens callosum corpus, ventriculis instar Athlantis impostum, eos obturet. Si fragmentum à cranio avulsûm cerebro se infigens motum ei adimat, uti hoc casu factum.

τέτων τῶ πρόπαν τ' κατ' ἑξίος ἐς πρίσιν ἀφ' ἡκεί, ἥτε
φλάσις ἢ ἀφανὴς ἰδεῖν, καὶ ὡς πῶς τύχη φανερὴ
γνο-

ἡρομερήν. καὶ ῥωγμὴν ἐν ἀφανὲς ἰδεῖν, καὶ ἐν
 φανερῇ ἢ καὶ ἐν ἔδρῃ ἡρομερήν. ὁ βέλτερος ἐν τῷ ὀ-
 σέω περὶ ῥωγμὴν ὁ φλάσις τῇ ἔδρῃ. καὶ ἐν
 φλάσις μένος περὶ ῥωγμὴν ἀνδρὶ ῥωγμὴς τῇ
 ἔδρῃ, καὶ αὐτὴς πρὶς αὐτὴν ἀφήκει. τὸ δ' ἐσὼ ἐσφλώ-
 ρημον ὅς ἐστιν ἐκ τῆς φύσεως τῆς ἐσφλῶς, ὀλίγα τῶν
 πολλῶν πρὶς αὐτῇ περὶ δέχεται, καὶ τὰ μάλιστα ἐσ-
 φλαδέντα καὶ μάλιστα κατὰ ῥαγμὴν. ταῦτα πρὶ-
 σιός ἢ κίς καὶ ἐκχρηται. ἐδ' ἐδρῃ αὐτῇ ἐφ' ἐσφλῶς γε-
 νομένη ἄτερ ῥωγμῆς καὶ φλάσιος, ἐδ' αὐτῇ πρὶ-
 σιός δέχεται. ἐδ' ἡ διακοπὴ ἐν μεγάλῃ καὶ εὐρέῃ
 ἐδ' αὐτῇ διακοπὴ καὶ ἐδρῇ ὅτι αὐτὸ ἐστίν.

Hisce fracturae modis de sectione cogitandum, si-
 collisum sit os, idque aut evidenter aut obscure; si-
 fissum manifestè sit, aut non. Præterea quum os ita
 inciditur teli uti vestigium in osse appareat, si-
 mul absque collisione fissum sit, si-ve collisum absque
 fissurâ; nam et tum ad sectionem accedendum. Ac
 verò id quod à suo abiens status desidit, rarò secan-
 dum. Vti et illa minus sectionem exposcunt, quæ
 maxumè infederunt, admodumque fracta fuerint. V-
 ti neque sectione est opus, ubi teli vestigium absque
 rimâ aut collisione per se remanet; veluti neque, si
 lata magna que fuerit præcisio. Nam præcisio et teli
 sedes idem sunt.

Expo.

Exposuit distinctè Hippocrates, quot modis capitis os lædi possit, Fissione nimirum, Collisione, Introtrusione, Teli sede, & Contrassurâ. Pergit nunc, explicaturus qua ratione hisce incommodis medelam adferre possit debeatque chirurgus. Primum ac ante omnia, iubet sectionem ossis institui, dicens: τῶν ἰῶν τρόπων τῆς κατῆξις, ἐς πρίον ἀφῆνθ. Per πρίον autem, ipse intelligit ossis sectionem, non cutis capitis seu pericranij. Est namque origo voculæ ἀ πρίον. πρίον ferram significat. inde πρίω & πρίζω, ferro, ferrâ seco vel divido; indeque πρίσις, sectio seu divisio quæ ferrâ seu ferreo fit instrumento in corpore duro. Et tamen aliter, quotquot sunt exercitati chirurgi, priusquam in capitis ictubus ad sectionem ipsius deveniant cranij, de pericranij apertione, diductione, seu dilatatione agunt omnes. Respondeo, Hippocratem id ipsum paulò post monere ac præscribere, hoc eodem libello. Præterquam, quòd existimet, perito chirurgo monitore hic non esse opus. Sicque reverâ est, in omni capitis vulnere illud veterum monitum animo circumferre oportet, *omnia suspicari*. Itaque si vel minima fuerit læsi cranij suspicio, quamprimum

primùm diffcindendum pericranium; illud
namque si negligatur, fueritque vel minima
in osse rimula, præcipitabit se in subiectum
cerebrum saburra fissurâ collecta, corruptaq;
mortemq; vulnerrato adferet certam. Celsus
hanc ad rem audiatur cap. 4. lib. 8. *Quacunque* “
autem de causâ curatio hæc necessaria est, si nondum “
satis patefacta cutis est, latius aperienda est, donec “
quidquid læsum est in conspectu sit. Nec enim magno “
negotio cutis sanescit. etiamsi * *frustrâ defecta est.* “

In quo ipso videndum est, ne quid ex ipsâ membra- “
nulâ, quæ sub cute calvariam cingit, super os relin- “
quatur. Siquidem hæc scalpro terebrisve lacerata, “
vehementes febres cum inflammationibus excitat. “

* Vulga-
ris hæc
lectio pla-
cet, non
vero
quod nõ-
nulli.
in fru-
stra.

Itaque eam commodius est ex toto ab osse diduci. Pla- “
gam, si ex vulnere est, talem necesse est habeamus, “
qualem acceperimus. Si manu facienda est, ea fere “
commodissima est, quæ duabus transversis lineis lit- “
tere X figuram accepit, ut deinde singulis proceden- “
tibus† angulis cutis subsequatur. Locus insignis, “
metum sectionis pericranij chirurgus adi- “
mens, cum dicit, capitis cutem facile solidescere. Ita namque est, substantia ei data mol-
lis, succulenta, pinguis, eoque facile solida-
bilis. nisi autem separetur, non potest nec
purgari, multo minus deleri si quæ subsit ri-

† Ita le-
gendum
centio.

ma. Addit Celsus observationes chirurgo in pericranij dissectione observandas. 1. ut unicâ sectione non solum cutis, verum & subiectum periosteon disseccetur, simulque ab osse separetur. nam illa acutè quum sentiat, nî removeatur, doloribus excarnificabit ægrum, quoties vulnus reficitur; indeq; febris ac inflammationis metus. 2. quâ incisionis figurâ uti chirurgus debeat; nimirum quæ decussatim chiasmum faciat. nam illa quatuor supeditat angulos, quibus in diversa diductis, fatis superque denudabitur cranium.


Sciat tamen chirurgus, non indiscriminatim quemcunque capitis locum incidi debere; vitanda etenim, aut saltem admodum circumspectè & cum iudicio dissecanda frontis cutis, ne palpebris detrimentum inferatur. Etiam abstinerebit à læsione muscutorum capitis motui dicatorum, si in occiput incidit vulnus. Omnino verò idque admodum religiosè, abstinerebit à temporalibus musculis.

Idem Celsus monet loco citato: *neque id*

” *vitium ullum metum, nisi inter musculos, qui tem-*
 ” *pore continent adfert**, nam ibi nihil tuto fit.

* Italego,
 nullus alias
 sensus erit.

115.



A. Musculi frontis, superiori palpebrae addicti, fibrasque suas rectas eò efferentes.

B. Musculus temporalis, maxillam versus fibras extendens.

* ad musculos occipitis, quorum hac pagina sit mentio, vide figuram pag. 59.

Norrit & illud chirurgus; quum in omni ci-
 pitis


Amo 3. A

P ij

pitis vulnere iubemus absque morâ discindi pericranium, duabus tamen cum cautelis id ipsum fieri debere. 1. tum quum aliqua est suspicio læsi cranij; aut cum insignis est contusio continens sanguinem concretum, hanc instituendam. non enim debet sine causâ doloribus inestari æger. 2. non temere ad hanc sectionem in pueris veniendum, nam in illis minus id tutum. ideo potius convenientibus topicis conandum resolvere discutereque tumoris contusionisque materiam, quàm sanguinis profusione, vires in illâ ætate minus firmas, magis deicere. ut non dicam præ clamore ac eiulatu puerorum, distendi capitis vasa, unde facile supervenit inflammatio, aliaque symptomata.

Hiscæ itaque, si per se vulnus capax satis non fuerit, protinus tum *πρίν* præscribit Hip. quâ non id vult, semper ad modiolum recurrendum; eoque partem ossis excidendam. nullo modo: periculosa plena aleæ illa res. Distinguendum itaque hic: Si namque superficialia fuerit Fissura, primam non transcendens tabulam, conandum scalpiorum usu eam delere. Sunt variae figuræ scalpæ.


1017.



A. Scalpra rasoria.

B. Scalpri quos μηδιστὲς vocat Paulus.

118.



- A. *κυκλῶν*, *stve* scalper ex *isanti* capus, qui
malleo impelli solet.
- B. *Planus* scalper.

Erant

Erant veteribus scalpra exciforia & eava
 (quos *καλίσκας* Galenus, Paulus *καλίσκωντος* vo-
 cat) tum rasoria, quæ *ξυστήρις* vocabant. E-
 rant & scalpri lenticulares, *Φανίλοι* dicti, qui-
 bus ad membranæ tutelam in calvariâ secan-
 dâ utebantur. Paulus etiam *μηκιστοῦς* scalpros
 specilli formam habentes in excidendis emi-
 nentibus ossibus celebrat, quam ad rem pla-
 nos scalpros Celsus adhibet: Erant & *χοινίτιδες*
 seu *χοινίτια* Celso, non longè abfimiles.

Ex his hoc illove utendum, prout du-
 molliusve tractandum fuerit cranium, tum
 rarius & profundiores aut superficialiæ ri-
 mæ. Nam id ferio observare chirurgus de-
 bet, quam minimum uti ossis capitis auferat.
 nativum namque cerebri tegmen calvæ os
 est. innuunt id hujus paragraphi verba: *ossa*
que admodum fracta fuerint, sectione opus non ha-
bent. Tali namque casu, satis à seinvicem dis-
 fident fragmenta, naturæq; ad superfluum
 expulsionem, satis superque datur spatij.

Alia adhuc quò ad pristin subest difficultas,
 an nimirum ad ferramentorum usum proti-
 nus, & simul ac inflictum fuerit vulnus aut
 dissectum pericranium, accedendum sit.
 Fuerunt inter Veteres, suntque etiam hodie
 chirur-

chirurgi periti id qui negent, iubentes negotium naturæ relinqui; usu namque emplastrorum cephalicorum asserunt proventurum callum, quo ferruminari possit non rima solum, verum insuper fracturæ, eaque ratione divisa ossa glutinari. Celsus controversiam tangit, imò satis plenè tractat, Cap. 4. lib. 8. aiens: *In omni verò fisso fractove osse pro-*
tinus antiquiores medici ad ferramenta veniebant,
quibus id exciderent. Sed multo melius est empla-
stra experiri quæ calvarie causâ componuntur. Eo-
rumque aliquod oportet ex aceto mollitum per se super
fissum fractumve os imponere, deinde super id ali-
quanto latius quàm vulnus est, eodem medicamento
illitum linteolum, & præterea succidam lanam ace-
to tinctam. Tunc vulnus deligare, & quotidie sol-
vere, similiterque curare usque ad diem quintum.
A sexto die etiam vapore aquæ calidæ per spongiam
fovere. cætera eadem facere. Quod si caruncula in-
crescere ceperit, & febricula aut soluta erit aut le-
vior, & cupiditas cibi reverterit; satisque somni
accedet, in eodem medicamento erit perseverandum.
Procedente deinde tempore emolliendum id empla-
strum, adjecto cerato ex rosâ facto, quo facilius car-
nem producat. nam per se reprimendi vim habet.
Hac ratione sæpè rimæ callo quodam implentur, estq;
ea offis

ea ossis velut cicatrix; & latius fracta ossa si qua in-
 ter se non coharebant, eodem callo glutinantur, estq;
 aliquanto melius velamentum cerebro, quam caro
 que exciso osse increfcit. Si vero sub primâ curatio-
 ne febris intenditur, brevesque somni & ijdem per
 somnia tumultuosi sunt, ulcus madet, neque alitur,
 & in cervicibus glandule oriuntur, magni dolores
 sunt, cibique super hac fastidium increfcit, tum de-
 mum ad manum scalpriumque veniendum est. Vi-
 des Celsum aliquot diebus periculum face-
 re cephalicis emplastris, spemque dare spon-
 tē coalitura ossa fracta. Quam sententiam
 omnino explodendam puto, standumque
 Hippocrati, iubenti ut statim sectio rasurave
 instituat. Statim dico, ita namque paulo
 post hoc libro: τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἡμῶς ἐπιτέλλειν χρὴ τὸν ἔν-
 ος καὶ τὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὴν μύτην τοῦ ἀνθρώπου αἷς πύκνειν.
 Postridie scalprio radendum est os, in altitudinem &
 longitudinem, prout hominis natura fuerit. En, non
 vult differri rem, aut tempus teri emplastro-
 rum usu, sed jubet ut ad pristinam veniamus po-
 stridie. Nimis enim periculosum in capitis
 vulneribus negotium nature relinqui. Subest
 enim pars princeps quæ facile in consensum
 trahitur. Quotidianus id ostendit usus, nimis
 periculose chirurgiam in hisce diff-
 cultibus

et ubi quum licet postmodum ad pristinam venias, nihilominus succumbat æger, qui in tempore si purgatum os fuisset, servari potuisset. os enim fractum nisi protinus succurratur, gravibus inflammationibus afficit, difficilisque postea tractatur, uti bene idem Celsus. Fida-
mus rationi, quotidianæ experientiæ, consilio magni nostri Ducis, idque ijs quas hic proponit conditionibus.

Text. *is πείρα ἀφ' ἧς de sectione cogitandum, id est ad usum instrumentorum chirurgicorum convenientium accedendum. dictum etenim jam, non semper per pristinam exsectionem quæ trepano fit, intelligendam. Tentandum delere fissuram; planandæ ossis fracti oræ; si angustæ valde sint rimæ, dilatandæ, ut superfluis exitus detur, idque accommodatorum scalp-
prorum usu. abradentes scalpri si non suffecerint, etiam ad cycliscum accedendum. Bre-
viter, omnia tentanda, priusquam modiolus in usum trahatur, periculo enim non vacat, unde non nisi summâ urgente necessitate eo utendum.*

Text. *ἢ τε φάσις si vel os collisum sit. Vides eum per pristinam non semper exsectionem ossis quæ fit, intelligere, nam hic in collisione*
pristinæ

prisin præscribit, quæ curatur infigendo in locum depressum, terebram. Vide hanc ad rem figuram pag. 43.

καὶ τὸ ἔδρη θροῦρον. Præterea quum ita inciditur os. Text.

Si rima patens satisque conspicua sit, sufficit exasperatas inæqualesque fissi ossis oras scalpendo delere, ut saniei ac sordibus pateat exitus. si rima capillaris, illa in totum radendo deleatur.

τὸ δὲ ἔσω ἐσφλάσιον ὁ σείον. At verò id quod à suo Text.

abiens statu defidit os, raro secundum. Non vult prisi utendum in Esphlasi sive Introtrusione; nam membrana satis premitur à depresso osse aut ejus abrupto fragmento, ita ut majorem quam sculptura esset allatura pressuram, ferre nequiret. Quid itaque tali casu instituaturs usus modiolis, isque applicetur à latere introtrusi ossis; hoc est ossi integro.

ὅυδ' ἔδρη αὐτὴ ἐφ' ἐωυλῆς θροῦμένη. Vti neque prisi opus Text.

ubi teli vestigium absque rimâ ac collisione per se remanet. Nam sufficit sola sculptura. Modo enim asperitas quam tum ostendit os, deleatur id satis est, ne nativo suo regmine privetur cerebrum.

ὅυδ' ἡ διακοπή τὸ μεγάλη. Veluti neque si lata ma- Text.

gnaque fuerit præcisio. nam quum satis ossis te-

lo ablatum est, quid opus amplius auferre modiolò? nam de hoc agit.

Text. *διακοπή γὰρ καὶ ἰδὲν τ' αὐτό ἐστιν. nam præcisio & tel-
li sedes idem sunt. Hoc est, utriusque eadem
est ratio, potest namque utrique scalpturâ sa-
tisfieri.*


Ad intelligendum porrò hunc paragra-
phum inspiciendus Celsus lib. 4. cap. 8. nam
ibi modos habet auferendi & excidendi os,
scalpris excisorijs, aut terebratione, absque
tamen modiolì usu. nimirum in eo casu ubi
fragmentum ossis à reliquo avulsum se rece-
pit sub osse opposito aut vicino, membra-
namque urget, similiter etiam ubi collisum
sive introrsum depressum fuit os, simulque in
centro depressionis rimam habet, fit ita an-
gustum præ ossibus seinvicem prementi-
bus, nullo uti pacto detur exitus superfluis.
Quid in hisce casibus? simplex rasura sive
scalptura hic non suffecerit. Celsus itaque
hanc rationem init: *Duo verò, inquit, sub ista
calvarie pericula sunt, ne vel findatur, vel medium
desidat. Si fissura est, possunt ora esse compressa, vel
quia altera super alteram excessit, vel etiam quia
vehementer rursus se commiserunt. Ex quo evenit,
ut humor ad membranam quidem descendat, exitum
verò*

verò non habeat, & sic eam irritet & graves inflammationes moveat. ubi media desedit, eandem cerebri membranam os urget, interdum etiam ex fractura quibusdam velut aculeis pungentibus. His ita succurrendum est, ut tamen quam minimum ex osse dematur. (Notanda verba, nam os nativum cerebri tegmen est.) Ergo si ora altera insedit, satis est id quod eminet plano scalpro excidere, quo sublato jam rima hiat quantum curationi satis est. hanc ad rem radens scalprum non suffecerit, opus malleolo erit quo scalper adigatur. At si ora inter se comprimantur, à latere ejus interposito digiti spatio terebrâ foramen faciendum est, ab eoq; scalper duabus lineis ad rimam agendus ad similitudinem litteræ, sic ut vertex ejus a basi foraminis ad rimam sit. Quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debebit: & ita nihil latens in osse concavum est, abundeq; exitus datur intus † latentibus. Ne si fractum quidem os desedit, totum excidi necesse est. Sed si ve totum perfractum est, & ab alio ex toto recessit: si ve circumposita calvaria inheret exigua parte, ab eo quod naturaliter se habet scalpro dividendum est: deinde in eo quod desedit juxta rimam quæ fecimus foramina addenda sunt. Si in angusto noxa est, (id est, si longa non fuerit rima) duos; si latius patet tria: septaq; eorum exci-

* Ita lego, nam vulgaris lectio sensum turbat.

† non ledentibus.

126.



- A. Rima in osse
 B. Foramina in osse facienda, a quibus initium excisionis fiat.
 C. Sinus lunari in rimam terminati, quorum intermedium septum
 excidendum.

-T.A

iii 0

denda;

enda: Et tum scalper (excisorius) utrimque ad
rimam agendus, sic ut lunatum sinum faciat,
imaq; pars ejus intus ad fracturam, cornua ad cs in-
tegrum spectent. Deindè si qua labent (vacillent,
fluctuent.) Ex facili removeri possunt, forfice
ad id facta colligenda sunt.

Egregius Celsi locus, elegantissimè ac per-
spicue docens modum utendi excisorio scal-
pro. neque ullum ex Veteribus video qui
eandem adeo distinctè prosequatur. Præter-
quam quod curationis sit ratio admodum
tuta, ut merito idem author subiungat: Hoc
genus curationis efficit, ut qua parte fracta ossa ta-
men inherent, (nondum omni ex parte ab osse
integro abrupta avulsaq; sint) solidentur: qua
parter abrupta sunt, sine ullo tormento, sub medica-
mentis tempore exsident, spatiumque inter hæc satis
illis: magnum ad extrahendam saniem relinquatur;
Plusque in osse propugnaculi cerebrum habeat, quam
habiturum fuit eo exciso.

πρωτον δε χη τὴν τεωρατῆρα σκοπεῖας, ὅπῃ
ἔχη τὸ τεωρατῆ κεφαλῆς, εἴτ' ἐν ταῖς αὐτῆς ἐν-
ερίαις. καὶ τὰς τεύχας καταμαρτάνει τὰς αὐτῆς
τοῦ

τὸ ἔλκεθ, εἰ διακεκόφεται ὑπὸ τῷ βέλεθ. καὶ ἐν
 ἔσω εἴησαν ἐς τὸ τραῦμα, κινδυνεύειν τὸ ὅσέον ψιλὸν
 εἶναι τὸ σαρκός.

*Considerare autem imprimis oportet, qua capitis
 parte vulnus inciderit, anne imbecilliore. Tum et
 capillos circa vulnus intueri. nam hi si telo præcisi
 vulnerei que sint impæcti, verisimile fit os nudatum
 esse, quod quum evenit, dicendum à telo labem acce-
 pisse.*

Dixit Author, cranij vitia πρίν requirere.
 Ejus usum cum cautione tamen incundum
 nunc monet. Inter cautiones primo loco
 prognosin adfert, ne si victa ars malo fuerit,
 aut fefellisse aut ignorasse videatur chirurgus.
 Vult itaque ante omnia examinari vulneris
 locum, ut necessarios monere possit de peri-
 culo. Hac in re inconsideratus si sit chirur-
 gus, redundabit in ipsam artem calumnia.

Text. ὅπῃ ἔχῃ τὸ τραῦμα τῆς κεφαλῆς εἴτ' ἐν πῶσιν ἀσθενέστερον
 qua parte capitis vulnus inciderit, num imbecilliore.
 Nam quo imbecillior locus læsus, eò pericu-
 li plus ægro imminet. Etenim ictum vali-
 dum absque cerebri membranarumque of-
 fensa difficiliter perferet debilis, quàm validus
 locus. Quibus verò locis imbecillius sit cra-
 nium,

nium, ante dixit; nimirum anteriores cranij partes imbecilliores sunt posterioribus: omnium autem maxumè debile est bregma.

καὶ τὰς τρίχας κατὰ μανθάνει. *Et capillos circa vul-* Text.
nus intueri. Et hæc verba ad prognosin spectant. Si namque simul ac ad vulneratum accedit chirurgus videat, capitis pilos in ipso vulnere erectos esse, antequam manum adhibeat, monebit proximos non videri rem carere periculo; nam ut plurimum id significat pericranio dissecto ipsum os læsum esse.

Ταῦτα μὲν οὖν καὶ ἀπόπειρα ἐν σκεψάμενον λέξαι, μὴ ἀπλόμενον δ' ἀνθρώπου. ἀπλόμενον δ' ἤδη πεφραῶς εἰδέναι ῥάφα, εἰ ἐπὶ ψιλὸν τὸ ὅσέον τ' ῥαχὸς ἢ οὐ. καὶ μὲν κατὰ φανὲς ἢ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν τὸ ὅσέον ψιλόν; εἰ δ' ἐμὴ, τῇ μήλῃ σκέπειται.

Et quidem hæc animadvertenda veniunt, dicendæque priusquam homini manus injiciatur. Postquam manum admoveris, adnitendum est, ut num os carne nudatum sit scias, & an, nudatum si sit, conspici queat. Videri enim si nequeat, specillo res exploranda.

ἀπλόμενον δ' ἤδη. ut num os carne nudatum sit, scias. Text.

R

Per

Per carnis vocem periosteon intelligit; dicitque fieri posse ut adeo angustum sit pericranij vulnusculum, ut neque digitis, multo minus visu iudicare queas, num periosteon pertusum. Fieri namque potest; os uti fissum sit, membranulâ hac integrâ; hinc scalpris tractari os nequit, nî singulis refectionibus recrudescere dolores velis. Tali casu cutem & cum eo unâ periosteon discindere præstat, sicque os nudare. Quæris certus?

Text. τῇ μήλῃ σκέπειας. *Hæc periculum specillo.* μήλη chirurgicum est instrumentum, quo ad exploranda vulnere vulgò uti solent. quo vulnere profunditatem, rectitudinem, cæteraq; pertentare solent; unde vulgò Tentam vocant. Hinc μήλωω tento, exploro. μήλωσις pertentatio, exploratio. Hoc, Specillum Latinis, diminutivè uti videtur à specium, quo usus est Pacuvius, cui origo à specularando. Vult itaque, specillo per pericranij vulnusculum demisso, explorari ac speculari num pertusum periosteon; num quæ subfit rima. Quo pacto? Rima si subfit, hæsitabit instrumentum; integrum si periosteon, obtusum habebis sensum. Quid si auditu? solent namque emissio specillo leviter pulsare fundum; clarum
nam-

namque dabit sonum os, denudatum si sit. Utendum autem hanc ad rem specillo obtuso. Nno: una etenim specillorum figura. Celsus audi, Cap. 4. lib. 8: Ergo qua plaga est, de-
mitti specillum oportet, neque nimis tenue, neque acutum; ne cum in quosdam sinus naturales inciderit (inequalitates aut asperitates quas nonnullorum habent crania intelligit) opinionem fracti ossis frustra faciat: neque nimis plenum, (latum, obtusum) ne parvula rima fallant. Vbi specillum ad os venit, si nihil nisi leve & lubricum occurrit, integrum id videri potest. Si quid asperi est, utique qua suturae non sunt, fractum os esse testatur. (Dic tu, nisi vulneratus peculiare sibi que proprias habeat futuras, uti in nonnullis fit. Vide Osteologiae meae Cap. 6.)

καὶ ὡς μὲν δέχεται ψιλὸν ἐὼν τὸ ὀστέον τὸ Καρχῆος, καὶ μὴ ὑγιὲς ἀπὸ τοῦ τραύματος, καὶ τὰ ἐν τῷ ὀστέῳ εἶναι τὴν διάγνωσιν πρῶτα ποιέειν, ὁρῶντα ὅσον τέ ἐστι τὸ κακόν, καὶ ἴνῃ αἰετοῦ ἔργον.

Ubi vero os carne nudatum ac à telo læsum offenderis, dignoscere tum opus est quantum sit vulnus, & quam exposcat operam.

Quantum sit vulnus. Num magnum, num parvum

parvum. an utraque, an verò unica solummodo tabula pertusa.

Text. *Quam exposcat operam.* Num sola sufficiat scalpura, an etiam cyclyfco excisorio opus, num terebratione, ossis sublevatione, excisione quæ modiolò fit.

ἤν ὃ καὶ ἐρωτᾷ τὸν τετραμήριον ὅπως ἔπαθε καὶ τίνα τροπον.

Etiā examinandus vulneratus, ut sciamus qualiter & quò pacto inflitum vulnus sit.

Text. *Qualiter,* quo teli genere nempe, acuto, obtuso: si conciderit, an ex alto ceciderit, nec

Text. *ne.* *Quo pacto.* Num ictum præviderit. nam prævisa tela minus nocent. Itaque quærendum, num ad manus cum adversario devenit. Etiam quænam vulnerati fuerit cum ictus infligeretur conditio, num potu obrutus. Hæ etenim circumstantiæ, majorem minoremve ictus facient vehementiam, indeque num plus minusve æger periclitetur, colliget chirurgus.

ὡς δὲ μὴ καταφανές ἢ τὸ ὁσέον, εἴ ἔχει πικρὸν ἢ μὴ ἔχει, πολλὰ εἴη καὶ μάλλον τὴν ἐρώτησιν ποιεῖσθαι ψιλὰ τε ἰόντων ὅσους τὸ τραύμα ὅπως ἐχθρῶς, καὶ ὅτινα τροπον.

Sin verò nulla ratione appareat num læsum sit os nec ne, osse nudato multò magis interrogandum, qualiter vulneratus & quo pacto.

Infortunij seu Contrafissuræ casum hisce verbis proponit. Si nimirum tam ex inflictivulneris circumstantijs, quam præsentibus symptomatis chirurgus oriatur suspicio cranium esse læsum, neque tamen sensui se offerat læsio. tali casu omnia suspecta sunt chirurgus, cujus erit summa cum curiositate, ad singula quæ se offerent, diligentissimè attendere.

Osse nudato ait, hoc est, ubi ipso in quem plaga ictusve incidit loco, os nudatum oculis conspici possit, specillo feriri ac explorari, nullam tamen labem deprehendat chirurgus; symptomata nihilominus fissi fractive adsint cranij, vomitus nempe, vertigo, obcæcatio, prostratio, similiaque: hoc inquam casu, ne sit securus. metuendum namque est, alio aliquo loco cranium divisum esse.

τὰς ὅφλασις, ἢ τὰς ῥωγμὰς τὰς ἐφαινομένης ἐν τῷ ὀσέῳ, ἐνεύσας ᾧ, ἐκ τῆς ὑποκείμενης τῆς τετραμύνης πρῶτον διαγνωστικῆς πειρῆδος ἐπὶ πέπονθε τῷ ὀσέῳ ἢ ἐπέπονθεν.

Quum enim collisa aut fissa ossa non tamen talia apparent, ex vulnere relatu primo adniti debemus cognoscere, num os aliquam noxam habeat.

Interrogandus nempe æger, num bilem vomuerit, num oculi ejus obcæcati sint; num obmutuerit; num per nares auresve sanguis ei effluerit; num conciderit; num sine sensu quasi dormiens jacuerit. Hæc enim raro, nisi fracto osse eveniunt. At ubi inciderunt, scire licet necessariam, sed difficilem curationem esse. Sed de hisce similibusque, e quæ ex ægri relatu scire chirurgus debet, statim ipse aget Author.

ἐπεὶ δὲ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἐξελέγχοντα πλεὺς μὴλωσις. μὴλωσις γὰρ οὐκ ἐξελέγχει εἰ πέπονθε τὸ τῶ κακῶν τὸ ὀστέον, καὶ εἰ μὴ ἔχει ἐν αὐτῷ, ἢ ἔπεπονθεν, ἀλλ' ἐδρῶν τὸ τοῦ βέλους ἐξελέγχει μὴλωσις. καὶ μὲν ἐμφλαστῇ τὸ ὀστέον ἔσω ἐκ τῆς φύσεως τῆς ἐαυτοῦ. καὶ μὲν ἰσχυρῶς ῥαγῇ τὸ ὀστέον, ἅπερ καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι κατὰ φανέα, εἰς ὁρῶντα γινώσκουσιν.

Dein rem citrà specillum ratione explorare. non enim deprehenditur specillo ullamne talem noxam os senserit, & num violatum sit an non. Verum ubi

vesti-

vestigium teli in osse manet, vel à suo statu recedens
desidit, aut vehementer ruptum est, id specillo depre-
henditur; uti id ipsum etiam tum oculis cerni po-
test.

Idem est hujus qui præcedentis paragra-
phi sensus. nimirum si ictus vehementia alia-
que arguant os divisum, neque tamen spe-
cillo eâ de re certus esse possis, suspicari de-
bes alio quàm ictus loco hæere offensam.
Quum verò vestigium teli ostenderit os: aut
quum idem vehementer perfractum est, id
ipsum non solum specillo sed & visu co-
gnosci potest.

ῥήγνυ) δὲ τὸ ῥέον τὰς τε ἀφανέας ῥωγμὰς
καὶ τὰς φανεράς, ἢ φλαῖ) τὰς ἀφανέας φλά-
σας, ἢ ἐσφλαταγῆ (ω ἐκ τ' φυ(εως τ' ἐσωτ' ἔμα-
λιστα ὅταν ἑτέρω * ὑφ' ἑτέρω ἡτρωσκόμῳρος ἰπ-
πιδες τῶ (αι * βουλόμῳρος. ἢ ὅταν ἔξ ὑψηλο- * βυλο-
τέρης γίνῃται ἢ βολῇ ἢ ἡ πληγῇ, ὅποτερ ἀν' ἡ μίνα alij.
μᾶλλον. ἢ ὅλ' ἀν' ἔξ ἰσοπέδ' εἰς χεῖρας. καὶ ὡς ἰπ-
ποκράτη τῇ χειρὶ τ' βέλ(ω ἢ τε βάλλῃ, ἢ τε τυ-
πῇ. καὶ ἰσχυρότερος ἐὼν ἀδυνεσέρως ἡτρώσκη.

Finditur autem os obscuris & conspicuis rimis;
colliditurque ita ut collisum non appareat, tum &
statu suo recedens desidit, cum alter alterum de in-
dustria.

*industria vulnerat : quumque a loco sublimi vel jacie
telum, vel etiam manu tenens ita ferit. Quocumque
id fiat modo, gravius erit vulnus quam si equaliter
consistat, & si quis manu tenens telum ita jaciatur
feriatve. etiam gravius futurum est vulnus, robustus
imbecilliorum si ledat.*

Circumstantias aliquot nunc enarrabit
quarum examine colligere medicus poterit,
majore minoreve num vulnus cum periculo
conjunctum sit.

Text. *Vbi alter alterum de industria vulnerat.* Nam id
probatione non eget, eos qui deliberato a-
nimo inferuntur ictus, efficacius graviusque
afficere vulneratum, quam si quis per incogi-
tantiam, aliud agens, aut etiam invitus la-
dat.

Text. *Quumque è loco sublimi vel jacet telum.* Hæc
intellectu facilia sunt. quo enim propin-
quior vulnerato vulnerans, eò truculentius
feriet. Ita & robustus deliberato animo ac-
cedens ficarius, graviolem ingeret ictum,
quam debilis, nec firmis præditus lacertis.

ὅσοι δὲ πίπτοντες ὑπερσκόνται, πρὸς τὸ
ὀσέον, καὶ αὐτὸ τὸ ὀσέον. ὁ δὲ πρὸς ὑψηλοῦ πίπ-
των καὶ ἐπὶ σκληροτάτῳ καὶ ἀμβλύτάτῳ, τὸ
κίνδυνον

κίνδυνον τὸ ὅσέον ραγῆναί τε καὶ φλαδιῆναι·
 ἔξω ἐσφλαδιῆναι ἐκ τῆ φύσεως τῆ ἐπιτομῆς. παρὰ δὲ
 ἐξ ἰσοπέδου μᾶλλον χερεὺς πίπτοντι ἢ ἐπὶ μαλ-
 θακώτερον, ἥσονται αὐτὰ πάχει τὸ ὅσέον, ἢ ὅτε
 αὐτὰ πάθοι.

*Si ex casu aut ea quæ circa os sunt, aut ipsum os
 vulneretur, is qui ex valde sublimi loco in decli-
 vem, eumque durum ac obtusum pronus ruit, peri-
 clitatur ne os findatur, collidatur, aut a suo recedens
 statu desinat: is verò qui è loco plano in subiectum
 mollius decedit, minus certe aut nullo pacto noxas
 istas incurret.*

Circumstantia ejusdem cum præcedente
 intentionis. Sicuti enim cominus, quàm e-
 minus illati ictus validiores; ita omninò is,
 qui ex alto cadens illidit in saxum aut fer-
 rum, magis offendetur, quàm si in terram,
 eamque sabulosam nec compactam delaba-
 tur.

ὅσα ὅ ἐπιπίπτει εἰς τὴν κεφαλὴν βέλεα πρῶ-
 τος πρὸς τὸ ὅσέον, τὸ ἀπὸ ὑψηλοτάτου ἐμπεσόν,
 καὶ ἥκιστα ἐξ ἰσοπέδου. καὶ σκληρότατον τε καὶ ἀμ-
 βλύτατον, ἢ βαρύτατον, καὶ ἥκιστα κῆφον. ἢ ἥκιστα
 τε ἢ ὅτε καὶ μαλακόν. τὰ αὐτὰ ῥήξει τὸ ὅσέον

καὶ φλάσκει. καὶ μάλιστα γε ταῦτα πάχυνται ὅς
 εἰς κίνδυνος, ὅταν ταῦτα τὸ γίνηται, καὶ εἰς ἰδί-
 πτωθῆναι καὶ αὐτίον γρήται ὅς εἰς τοῦ βέλους. ὡς
 τε πληγὴ ἐκ χειρὸς. ὡς τε βληθῇ. ὡς τε ἡ ἐμπέ-
 ση αὐτέω. καὶ ὡς αὐτὸς καταπεσὼν πτωθῇ. ὅσοι
 σὲν πτωθεῖς καὶ αὐτίον γρήτοι τοῦ ὅς εἰς τὸ βέλ-
 * *πει.* Τα δὲ πλάγιον ὅς εἰς * *ἀδυσούραντα* βέλεια,
ἀνέρινα. ἥσονται ῥήγνυσιν ὅς εἰς, καὶ φλάσκει εἰς κεφα-
nonnulli, λῶ, καὶ καὶ ψιλωθῇ ὅς εἰς τὸν σαρκός. ἐνία γὰρ
quod minus τῶ πτωμάτων τῶ ἐπὶ πτωθέντων οὐδὲ ψιλῶται
placet. ὅς εἰς τὸν σαρκός.

E telis Verò quæ in caput cadentia vulnerant ea
 quæ juxta os sunt, tum & ipsum os, quod à loco
 maxumè sublimi ac inæquali incidit, quodq; valde
 ponderosum, hebes, ac durum non leve, neque acu-
 tum aut molle, illud findere collidereq; os poterit;
 maxumè Verò periclitatur os ne ita ledatur tum
 quum recta telo occurrit ager, sive telum manu ja-
 ciatur, sive feriat, sive quid in ipsum illabatur,
 sive corruens offendatur, seu quomodocunque percu-
 tiatur osse è regione ad lineam rectam ipsi telo occur-
 rente. Tela Verò obliquè ferientia os minus findunt,
 collidunt, ac desidere faciunt, licet etiam os carne
 nudatum sit. Nam a nonnullis ejuscemodi vuln-
 eris os ne nudatur quidem.

Hoc paragrapho illud quod in prolegomenis inter monita à nobis fuit explicatum proponit; nimirum ictus rectilineos obliquis efficacius afficere. Nam in illis ictuum vis in se perpendiculariter recurrens duplicatur, fitq; tremor concussioq; cerebri longè major. Ejuscemodi itaque vulnera majore cum discrimine conjuncta sunt. Docuit id ante exemplo ictuum in ipsum bregma recta incidentium, ut quibus periculosiora in caput non cadunt. Tantum hæc res potest, ut exercitati chirurgi minoris faciant partem magnam cranij diacope ablatam esse, quam rectilineo ictu non nisi vestigium teli in osse si apparet. Vidi, quibus globulus plumbeus ex arcu emissus rectâ lineâ in verticem inciderat, ita ut plumbum cranio infixum hæreret, obijisse; alios non paucos, quibus glandes, è sclopeto ejectæ, os insigniter dedolaverant, tamen evasisse. Simile exemplum is dedit, quem cestrâ in caput recto ictu percussum concidisse vidimus. Huic enim quamvis nulla appareret in externâ tabulâ neque fissura, fractura, imò ne teli quidem sedes, multò minus collisio, vidimus inquam avulsa ab internâ tabulâ fragmenta,

apoplexiæ citæque mortis dedisse causam.

Τῶν δὲ βελέων ῥήγνυσσι μάλιστα τὸ ὀστέον, τὰς τε φανεραῖς ῥωγμαῖς καὶ τὰς ἀφανέας, καὶ φλαῖν καὶ ἐφλαῖ ἐκ τῆ φύσεως τῆ ἐωυτῆς τὸ ὀστέον, τὰ στρογγυλά τε καὶ περὶ φερέα, καὶ δρεῖσομα, ἀμβλέα, τὰ ὄντα καὶ βαρέα, καὶ σκληρά. καὶ τινὲς σάρκα ταῦτα φλαῖν, ἃ πέπρον ποιεῖ, καὶ κόπῃ. καὶ τὰ ἑλκεα γίνετ' ὑπὸ τῶν τοιούτων βελέων ἐς τὸ πλάγμον. καὶ ἐν κύκλῳ ὑπόκοιλα καὶ διάπυά τε μᾶλλον γίνετ', καὶ ὑγρὰ ἔστι, καὶ ἐπὶ πλέονα χρόνον καθαίρετ'. ἀνάγκη γὰρ τὰς σάρκας τὰς φλασθεύσας καὶ κοπεύσας πύον χρομύρας ἐκτακῆναι. Τὰ δὲ βέλεα καὶ περιμήκεα ἐπὶ πολὺ λεπτά ἐόντα, καὶ ὀξέα καὶ κῆφα, τινὲς τε σάρκα διαλάμνει μᾶλλον ἢ φλαῖν καὶ ὀστέον ὡσαύτως, καὶ ἐφ' ἑαυτῷ μὲν ἐμποιεῖ αὐτὸ καὶ διακόψαν. διακοπὴ γὰρ καὶ ἐσθῆ τωυτῶν ἔστι. φλαῖν δὲ ἔμάλ' α τὸ ὀστέον τὰ τοιαῦτα βέλεα. ἔδ' ῥήγνυσιν, ἔδ' ἐκ τῆ φύσεως ἔσω ἐς φλαῖν.

Rotunda verò & orbiculata, plana, retusa, gravia, & dura tela findunt os, tam conspicuis quàm obscuris rimis; tum & collidunt, & à naturali suo statu medium desiderare faciunt. Carnem quoque illa contundunt, maturant & lacerant. Vulnera præterea sub

rea sub huiusmodi telis lateralialia in orbem cava fiunt, magis purulenta ac humida tardiusque purgantur. Necesse enim est carnem collisam contritamq; in pus versam, tabescere. Oblonga Verò tela, maiore parte tenuia, acuta, & levia, carnem uti & os sic incidunt, ut magis penetrent quam collidant. incidens enim telum potissimum sedem relinquit. nam præcisio & sedes ad idem referuntur. Huiusmodi Vero tela os non admodum collidunt, findunt, aut ita percurrunt, ut a suo statu recedens desinat.

Rotunda, obtusa, gravia, dura tela præ acutis ac scindentibus duo adferre solent incommoda: minorem etenim excitant in capite cerebroque contento tremorem ac concussionem: tum & pericranium cum periosteo magis contundentia atterentiaque, composita faciunt vulnera, quæ & os findunt franguntve & carnem collidunt. Plus autem negotij chirurgo, plusque periculi faceffunt agro vulnera composita, quàm simplicia. Celsus id eleganter monet lib. 5. cap. 26.

Aliquid etiam in Vulneris genere figuraq; est. nam peius est, quod etiam collisum, quam tantum discissum est. adeo ut acuto quoque quam retuso telo Vulnerari, commodius sit.

Dicit non parum ad faciliorem difficilio-

remvé curationem facere qua figura prædictum vulnus sit. Etenim cui collisio adest sive contusio pejore habet loco, quàm quod incisum solummodo. Ratio est, quod priori, præter cerebri concussionem (loquimur namque de Capitis vulneribus) adsit carnis contusio, attritioque; quum telum acutum tantum discindens carnem, solutionem continui licet, partium attritum tamen non inducat. Etenim attritæ ab obtuso telo partes carnee, vasis laceratis sugillationem adferunt non tantum, verum insuper carniū læsarum putredinem ac in pus conversionem. Quod ipsum etiam hoc paragrapho monet Hippocrates.

Text. *Oblonga verò acutaq; tela carnem & os magis incidunt.* Id ipsum antea monuimus, os potius findi a telo obtuso quàm acuto. nam acutum tremorem concussivum non infert, uti obtusum.

Text. καὶ ἀρῆστομα. ἀρῆστομα tela exponit Gal. in Exeg. πανταχόθεν ὅμαλα, undiquaque plana & æqualia. Alioqui δῆρστομα is dicitur qui linguæ alicujus verba integra, non truncata, aut mutilata, sed distinctè ac perfectè profert. Hippocrates duo hic proponit telorum genera,

genera, obtusa & acuta. Aegineta hac in re admodum curiosus, telorum differentias ita prosequitur, non semel uti miratus fuerim Scriptoris illius *σμιερολογία*. Sic inquit Cap. 88. lib. 6. ὅλη τὴ βελυλικὴν τῆς χειρουργίας μέρος τῶν αἰαγ-
καιότητων ἐστὶ, διηλοῖ ὁ ποιητὴς ὁμηροῦ εἰρηκῶς,

ἰητὴρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξι' ἄλλων.

ἕως περὶ τῆς ἀπὸ τῆς ἡπα φάρμακα πάσης.

λεπτόν ἐν πρῶτον πὰς διαφορὰς τῶν βελῶν. Διαφέρεισι πο-
τω τὰ βέλη, ὕλη, σχῆμα, μέγεθος, ἀριθμὸς, χεῖρ, διωμάτι.
ὕλη μὲν, καθ' ὅ τῶν καλαμῶν ἀτράκτων αὐτῶν, ἢ ξυλῶν ἢ κα-
λαμῶν ὑπερχόντων. αὐτὰ δὲ τὰ βέλη, ἢ σιδηρεῖ ἐστὶ ἢ χαλκῆ,
ἢ κασιτέρεινα, ἢ μορίδινα, ἢ κεραῖνα, ἢ ὑάλινα, ἢ ὀστῆ, ἢ καλὰ-
μινα καὶ αὐτὰ, ἢ ξύλινα. Τοσούτη γὰρ τις διαφορά μάλιστα παρ'
αἰγυπτίοις ἐξέσπεται. σχῆμα δὲ καθ' ὅ τὰ μὲν εἰσι τρογγύλα.
Τὰ δὲ γωνιωτά, οἷον τριγῶνα. Τὰ δὲ γλωχινωτά, ἢ γιγλωτά καλα-
μῶνα. Τὰ ἢ τριγλῶνα. καὶ τὰ μὲν ἀκιδωτά, τὰ δὲ χωρὶς ἀκίδων.
καὶ τὰ ἀκιδωτῶν, τὰ μὲν ὅππῃ τὰ ὀπίσω νόμισσας τὰς ἀκίδας ἔχουσιν,
ἵνα ἐν τῇ ἐξολκῇ ἀντιμπεύρῳ. Τὰ δὲ ὅππῃ τὰ ἔμπροσθεν, ἵνα ἐν τῇ
ὠδῇ τὰ τοιοῦτα. Τὰ δὲ ἐκ ἀντιθέτως δίκλω τῶν κεραυνῶν,
ὑπερ τὰ καὶ ἐλκόμενα αὐτὰ καὶ ὠθέμενα, ἀντιμπεύρῳ. ἵνα ἢ
καὶ κινέμενα διαγγυλῶν πὰς ἀκίδας ἔχουσιν. σπαραγμῶνα. αἱ
ἵνες ἐν τῇ ἐξολκῇ ἐξαπλῶνται, κωλύουσιν ἐξέλκεσθαι τὸ βέλος.
Μεγέθος δὲ καθ' ὅ τὰ μὲν εἰσι μεγάλα ἄχρη πειρῶν τῶ μῆκος διακ-
τύλων. Τὰ δὲ μικρὰ ὅσον διακτύλου, ἀδὴ καὶ μικρὰ καλῶσι καθ'
αἰγυπτον. Τὰ δὲ τῶν μετὰ. ἀριθμὸς δὲ καθ' ὅ τὰ μὲν εἰσι
ἁπλᾶ, τὰ δὲ σύνθετα. λεπτὰ γὰρ ἵνα αὐτοῖς ἐπενήτε) σιδηρεῖ
αἵνα ἐν τῇ τῷ βέλους ἐξολκῇ διαλαθάνοντα μένη καὶ τὸ βάθος.
χεῖρ δὲ καθ' ὅ τὰ μὲν οὐραχον ἔχουσιν τοῖς ἀτράκτοις ἐγκείμενον. τὰ
δὲ αὐλόν. καὶ τὰ μὲν ἀσφαλῶς ἐνηρμοσθαι πρὸς τὸν ἀτράκτον.
Τὰ δὲ

Τὰ δὲ, ἀμελέστερον, ἵνα κατὰ τὴν ἐξολικὴν χωρὶς ὠδύνα εἴσῃ καὶ
 ταμίην. Δυναμὴ δὲ καθ' ὃ τὰ μὲν εἰσιν ἀφάρματα, τὰ δὲ πεφάρ-
 μακωμένα. αὐτὰ μὲν αἱ τῶν βελῶν διαφοραί.

Chirurgicæ partem telis extrahendis dicatam
 maximè necessariam esse, Poëta Homerus his ver-
 sibus innuit :

Vir medicus multis alijs præstantior, ut qui
 Corpore tela trahens, medicamine vulnera curret.
 Primum itaque telorum differentia enumerari de-
 bent. Differunt autem tela materiâ, figurâ, magni-
 tudine, numero, habitu, viribus. Materia quidem,
 quatenus bastilia aut lignea sint, aut arundinea.
 Ipsa verò tela aut ferrea sunt, aut ærea, aut stannea,
 aut plumbea, aut cornea, aut vitrea, aut ossea, aut
 arundinea, vel etiam eadem lignea, tot enim diffe-
 rentiæ potissimum apud Ægyptios reperiuntur. Fi-
 gurâ autem, quatenus alia sunt rotunda, alia ungu-
 losâ, nempe triangula, alia sulcata quæ & Gonchota
 dicuntur, alia trisulca, atque alia cuspidata, alia
 cuspidibus carent. Ac cuspidatorum, hæc cuspides
 posteriora spectantes habent, ut dum extrahuntur
 contrâ defigantur: illa in anteriora ut propulsata idem
 faciant: quedam obversas cuspides habent, fulminis
 instar, ut dum ipsa trahuntur propellunturque, in ob-
 jecta infigantur. Sunt quæ motâ cardine, cuspides
 habent

habent contractas: quæ dum in trahendo explicantur, telum extrahi prohibent. Magnitudine variant tela, quatenus alia magna sunt, ut trium digitorum longitudinem expleant: alia parva, ut unum digitum æquent, quæ sane & myiata apud Ægyptios vocantur; alia medium inter hæc locum occupant. Numero autem, quatenus nonnulla simplicia sunt, nonnulla composita. tenuia siquidem ferramenta ipsis imponuntur, quæ in teli extractione in imo delitescent. Habitu, quatenus alia ferrum acutum ligno habent insitum, alia concavum; ac quedam firmiter ligno infixæ sunt, quedam negligentius, ut in extractione separata intus remaneant. Viribus differunt, quatenus veneno quedam sunt oblita, quedam non. Atque hæc sunt telorum discrimina.

ἄλλα, ὅτε πρὸς τῇ ὀψεί τῇ ἐωυλῇ ὁ, ἢ αὖτε φαίνονται ἐν τῷ ὀστέῳ, καὶ ἐρωτῶσιν ποιέεσθαι πάντων τούτων. Ἐγὼ μᾶλλον τε καὶ ἥσυχον τρωθέντα ταῦτ' ἐσισημεία. καὶ ἡ δὲ τρωθεὶς καρῶθῃ. καὶ σκοτῶσθαι χυθῇ. καὶ δύνῃ. ἢ καὶ πέση.

Quidquid porro in osse se offert, præter ea quæ visu deprehenderis, id omne ex agro querendum; est enim aut gravioris leviorisve vulneris indicium. Præter hæc, num ictus velut soporosus fuerit; num

T

obcacati

*obcæcati oculi; num vertigo eum comprehenderit;
num conciderit.*

Tradidit signa quorum ope verisimiliter
cranium fissum fractumve esse assequitur chi-
rurgus: nimirum, exploratione per specil-
cillum: examine ægri, quoad modum ratio-
nemque qua vulnus illatum: consideratione
teli quo id ipsum inflictum: num perpendi-
cularis, obliquus num fuerit ictus: an in de-
bilem, an verò robustum capitis inciderit
locum. Vulnus siue compositum an sim-
plex. Addit nunc præter hæc alia signa; qui-
bus fretus, certius quam jam dictis conclu-
dere etiam primâ refectione potest num læ-
sum cranium nec ne. Illa ab animali desu-
mit facultate, ut quæ in capite habet domi-
cilium. Hæc præ ictu læsa, certè valida fuerit
cerebri concussio ac perturbatio necesse est.
quod cum fit, etiam si integrum manserit cra-
nium, scire tamen licet, ægrum periculi ex-
pertem non esse. quid naniq̃ue periculosius,
quàm si vulneri cranij, partis principis acce-
dat affectio? Celsus hæc signa ita habet:

Ita om-
nino le-
gendum.

„ Igitur ubi ea * percussa, protinus requirendum
„ est, num bilem is homo vomuerit; num oculi ejus
„ obcæcati sint; num obmutuerit; num per nares aures-

ve san-

*ve sanguis eï effluxerit; num conciderit; num sine
 sensu quasi dormiens jacuerit. Hæc enim non nisi os
 se fracto eveniant. Non, hoc est rarò. Eveniunt nam-
 que interdum osse integro, si ab obtuso in caput in-
 cidente telo valde fuerit concussum perturbatumq;
 cerebrum. Atque ubi inciderunt, scire licet necessa-
 riam, sed difficilem curationem esse. significatur nam-
 que cerebrum, partem principem, laborare, metum-
 q; esse ne excussus è suis vasis sanguis ac putrescens,
 phrenitidem aliave adferat incommoda. Si verò
 etiam torpor accessit, si mens non constat; si nervo-
 rum vel resolutio vel distentio secuta est, verifi-
 mile est, etiam cerebri membranam esse violatam,
 eoque in angusto magis spes est. At si nihil horum se-
 cutum est, potest etiam dubitari, an os fractum sit.*

Notanda postrema hæc Celsi verba. Eodem
 modo Aegineta in Capitis fracturis, Verti-
 ginem, Vocis Interceptionem, repentinam
 collapsionem, ponit. Bilis verò vomitiones,
 convulsionem, mentis percussione, acu-
 tamque febrem, ubi membrana tacta fue-
 rit.

*Εὐὸ ὁ νεφθαλὶς καρὰ τῆς. Num percussus velut soporo-
 sus fuerit. Significat namque adeo præ ictus
 vehementiâ concussum turbatumq; esse ce-
 rebrum, ut ad peragendam respirationem,*

debitè moreque solito sese movere nequeat. Non enim est naturalis hic somnus, verum stertor (Carum vocat Hipp.) ei similis quo phrenitici ac lethargici corripuntur. Illis namque affectibus, tumefcente cerebro, impletoque spatio quod ipsum membranamq; intercedit, locum in quo se attollat etiam si velit non habet; hic, spatium istud integrè licet se habeat, præ imbecillitate tamen ac perturbatione attollere se princeps illud viscus nequit. Inde namque provenire soporem, quotidiana decrepitorum senum ostendunt exempla, quos apoplexia cum maximo stertore subito invadit, non aliâ de causâ, quàm resoluta calloso corpore in ventriculos irruente. Similis hic cari causa.

Text. *ὅτι οὐκ ὁρατοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ. Num obtenebrati oculi.* Quod perturbatum commune sensorium, visorios spiritus, debitè ad particularia sensus organa, (ut oculos) non transmittat. Triplici namque ratione deficit sensuum actio. Ipsum particulare organum si vitium in temperie, conformatione, aut partium unione accipiat. Sicuti oculus in ophthalmia, cataractâ, ulcere pupillæ. Nervus organo inferiens si lædatur; velut si densentur, vulneren-
tur, aut

tur, aut obstruantur optici nervi. Aut denique ipsum commune si laboret sensorium. Sicuti phrenitici floccos carpunt, existimantes ea se, quæ non vident, videre: apoplectici nihil vident. Ita hic, perturbato cerebro, quum viscus illud commotum præ ictu ac perturbatum, munere suo, in conficiendis mittendisque per opticos spiritibus visorijis, non fungatur, oritur hoc symptoma.

καὶ δὲ. Si Vertigo vulnerato oborta. *δὲ* vorticem, gurgitem Græcis significat, inde *δρέω*, instar vorticis circumago, gyro. Inde affectus cerebri, quo omnia circumagi videntur, licet ita non sit. Fit namque commotis, nec firmo manentibus loco animalibus, quos ventriculi cerebri continent, spiritibus. indicio certo laborare cerebrum.

καὶ πάλιν. Aut si considerit. Vocula à *πίπτω* deducta; cado, labor, corruo significans. indicium propter cerebri animaliumque spirituum perturbationem, apoplexiâ aut paralyfi vulneratum corripi. uti quotidie in ijs quæ mactantur videmus animalibus, quæ robustissima licet; tamen unico ictu concidunt. Fieri tamen potest ut vulneratus corruat protinus ab accepto ictu, idque præ percussio-

cusfusionis robore ictusque vehementiâ, licet non perturbetur cerebrum;

Hæc itaque symptomata ut plurimum indicant validam cerebri concusfusionem. Concusfusionem dico; cuius hoc loco mentio licet non fiat, alibi tamen fit. Sicuti Coac. Sect. 12. aph. 2. ubi σείσιν hoc malum vocat. *ὅσοισιν ἀνὸς ἐγκέφαλος σφάθῃ &c. quibus cōcussum* (proprie conquassatum) *est cerebrum, continue neque vident, neque audiunt, ac fere moriuntur. σείσις & σείσμις* voces græcæ, à σείω derivantur, quod est concutio, quasso, agito. Vtitur illâ vocali lib. de Artic. ubi inter dislocationis species, σείσιν ponit. haud aliter enim se habere spinam dicit, ac si vimen seu virgam flexilem quatiat. Ita σείσμις Aristoteli pro terræ motu sumitur. Exemplum concusfusionis cerebri est in sternutatione, quam licet natura peragat, quoniam tamen eo momento non parum cerebrum laborat, hinc origo antiquæ consuetudini (quæ etiamnum hodie obtinet) precandi nempe sternutantibus salutem: nimirum ut illis Deus tum adsit, ne concusfusio illa cerebri aliquid adferat incommodi. omnia namque cerebri latera convelluntur. Vide ad antiquum hunc morem Arist.

rist. 1. Hist. Anim. Cap. II. & Plin. lib. 28.
 Cap. 2. Ejusdem cerebri concussione exem-
 plum exhibet Epilepsia; cui apoplexia, aut
 paralytis si non succedit, non parum tamen
 cerebri robur enervatur. Nihil itaque peri-
 culosius quàm adeo valide cerebrum concu-
 ti. Frangitur namque tali quassatione vehe-
 menter ejus robur; unde fit ut munia ordina-
 ria peragere nequeat. Sed anne hæc certo, si-
 cuti cerebri læsionem, ita cranij indicant fis-
 suram aut fracturam? *ἐκποτα* esse fateor, *αὐχίως*
 minimè. exempla quotidiana id testantur;
 nempe non adesse hæc signa cranio licet fisso
 imo (exempla mihi nota) insigniter fracto;
 eo verò soluto, horum nullum se ostendere.
 Adeo nihil in naturâ certi. Fatetur ipse Hipp.
 in Coac. sect. de Capit. vulnerib. aph. 3. di-
 cens. *οἷον ὁ ἐγκέφαλος ἡτρώσκει, πυρετός, ὡς ἔστι τὸ πολὺ καὶ*
χολῆς ἐμεῖ *ἔστι γίνεσθαι, καὶ δόποσιν ζῆν.* Quibus cerebrum
 vulneratur, *ijs ut plurimum febris; & bilis vom-*
itio, & apoplexia incidit. Notandum quod ait,
ἔστι τὸ πολὺ, ergo non semper.

ὅτ' αὖν ὃ τύχη ψιλάσθην τὸ ὅσέον τῆς σαρκὸς ὑπὸ τῆς
βέλεος, & τύχη καὶ αὐτὸς τὰς ραφὰς χρόνιον
τ' ἔλκε *καλεπὸν γίνεσθαι τὴν ἑσθλὴν & βέλεος*
φλά-

φράσαθς τιω̃ ἐν τῷ ἄλλῳ ὀσέῳ φανερω̃ γι-
νομένην. εἴτ' ἐνεστὶ ἐν τῷ ὀσέῳ, εἴτε μὴ ἐνεστὶν. ἦν τε
τύχη γινομένη ἢ ἔδρη ἐν αὐτῇσι τῇσι ραφῇσι.

*συγκλέ-
πτῃ non-
nulli, ne
que dis-
plicet.

*συμβλεπεί γὰρ αὐτῇ ἡ ραφὴ τῇ χειρὶ ἐξοῖσα τοῦ
ἄλλου ὀσέος. καὶ εἰς διαδῆλον ὅτι τε αὐτὰ ραφῇ ἐστὶν,
καὶ ὅτι τοῦ βέλεος ἔδρη, ἢ μὴ κάρτα μεγάλη γή-
ται ἢ ἔδρη. παροργίνε') ὅς ἐστις τῇ ἔδρῃ ὡς εἴπῃ
εἰ πολὺ αὐτῇ ἐν τῇσι ραφῇσι γινομένη, καὶ γίνε'
καὶ αὐτῇ ἢ ἐστὶς χαλεπωτέρῃ φράσαθς ἐρρω-
γότερος τῶ ὀσέος, διὰ τῆς, ὅτι καὶ αὐτὴν τὴν ρα-
φὴν ἢ ἐστὶς γίνε'. ἢ γήγνη') ὡς εἴπῃ τοῦ πολυέτοι-
μον γὰρ αὐτῇ γήγνησθαι τὸ ὀσέον, εἰ διαχαλαῖν διὰ
τὴν ἀδυνειαν τῆ φύσεως τῶ ὀσέος ταύτης καὶ ἀραιότη-
τα, εἰ δὴ τε τῇ ραφῇ ἐπιμενὲς ἐξοῖς γήγνησθαι, καὶ
διαχαλαῖν. † ἄλλα τὰ ὀσέα τὰ περιέχοντα τὴν
ραφὴν μὲν εἰ ἀρραγέα, ὅτι ἰσχυρότερα ἐστὶ τῇ ραφῇ

τάλλα π
εἶτα ex-
empla-
ria ha-
bent a-
lia. dif-
ferentia
exigua.

*Quum vero osse à telo nudato vulnus in ipsam
inciderit suturam, arduum est asserere num teli sedes
num vero fissura fuerit. Sutura namque asperior re-
liquo osse hac in parte tibi imponet, ut iudicare ne-
queas sitne teli vestigium an vero sutura; nisi am-
plum valde sit teli vestigium. Accedit etiam sedi-
rima plerumque quoties sedes in ipsas incidit sutu-
ras, tumque osse fissio difficile est de suturâ iudicare,
quia*

quia rima si ad sit suturam ut plurimum occupat. Os namque hisce locis facile frangitur, ob eam quæ ipsi à naturâ inest imbecillitatem, aut etiam quia ipsa sutura facile frangitur ac laxatur. Ossâ verò vicina suture minus facile franguntur, quia firmitiora naturâ sunt.

Illud vult hoc paragrapho, infelices illos esse ægros, quibus cranium finditur, ipsis locis ubi suturæ sunt. nam ejuscemodi fissurarum difficilis est tum cognitio, tum curatio. Cognitio, nam suturæ ipsæ fissuras sive rimas referunt. suturarum enim locis cranium ex suâ naturâ fissum est. Si itaque hisce locis levior potissimum inciderit fissura, existimabis esse ipsam naturalem suturæ fissuram. Curatio difficilis, nam fissuræ scalpri deleri aut saltem purgari debent; at ipsis suturarum locis, propter membranorum filamentorum trajectionem, radere licitum non est. doloris namque immanitas, febrem inflammationemq; excitaret.

Quam profectò sit arduum deprehendere fissuram, quæ in ipsum suturæ alicujus incidit locum, vel exemplo ipsius apparet Hippocratis, qui hoc nomine se deceptum fuisse ingenuè fatetur, idque cum vulnerati perniciæ Epid. 5.

Text. *Sutura namque reliquo osse asperior, hac in parte tibi imponet. uti si specillo obtusiore explores num os fissum sit, si ipso futura id feceris loco, hæsitante ac subsistente specillo arbitaberis aut ipsam futuram esse fissuram, sicque frustra fatigabis ægrum: aut fissuram esse futuram, negligesq; curationem. Etenim tam futura quàm fissura asperum quid ac renitens offert specillo. Imò tantæ difficultatis hæc res est, ut ne quidem atramento si os tangas certior fieri queas (quæ tamen ratio satis certa est in capillaribus extrà futuras evenientibus rimis) cum ejus vestigium non minus futura quàm fissura sit exhibiturum.*

Text. *Nisi amplum valde sit teli vestigium. Vidimus obtusa pugionis parte inflectam cranio sedem satis capacem. id ipsum ipso futura si eveniat loco, facilis cognitio erit, at qualis curatio: nam exposcunt limbi sedis præictu exasperati scalpturam; quam futura non patitur.*

Text. *Accedit etiam fedi rima plerumque quoties sedes in ipsas incidit suturas. Non necessario semper, quia ipsa futurarum loca infirma sunt, si validus ictus insignè faciat vestigium, vix poterit fieri ut non simul findatur os.*

ἢ δὲ εἴς τις ἢ κατὰ τὴν εἰσφύων γραμμὴν καὶ δια-
 χαλασίς ἐστιν τῇ εἰσφύῃ, καὶ φράσσαδ' οὐκ ὀμα-
 ρῆς ἢ, ἔτε' ὑπὸ ἐσφύης τῇ βέλεσθ' ὑπομνήσας ἐν τῇ
 εἰσφύῃ, ἐπιδαν εἰσφύῃ καὶ διαχαλασθῇ.

Rima vero ad suturam, ipsius futurae est solutio.
non enim facile est dicere, ubinam à teli sede in sutu-
ra proficiascatur, quum finditur ac resolvitur su-
tura.

Idem ferme dicit quod præcedentibus.
 Quod tamen de suturarum ait laxatione, a-
 deo verum est, ut notandum sit præ nimio
 madore in ipsas se præcipitante futuras, adeo
 eas subinde hiare, meningis uti pulsatio
 conspici possit. argumento, filamenta mem-
 branosa per suturas se fundentia non solum
 periosteon uti pariant id facere, verum & li-
 gamentorum manus ossibus præstare cranij,
 impediencia ne locis suturarum dissolvantur,
 Non enim voluit nimis arctas esse futuras
 natura, ut exhalationibus pateret transitus.
 Exemplo sit is apud Gal. lib. de Fasc. cui præ
 nimis arctâ capitis constrictione, arctatis su-
 turis, superfluisque cohibitis, tanta fuit ob-
 orta inflammatio, oculi uti eruperint extrâ
 orbitas.

ἄλλες χαλεπώτερον φεύσας τὴν ἀπὸ τῆς
φλάσιθ' ῥωγμῆν. συγκλέπτεισι γὰρ τὴν γνάμιν
καὶ τὴν ὄψιν ἔμπροσθεν αὐτὰι αἱ εἰσφαῖς ῥωγμοῖ-
δες φαινόμεναι, καὶ τῆς χύτερας ἐξσαι τῶν ἄλλων
ὁσέων. ὅπῃ μὴ ἰσχυρῶς διεκόπη καὶ διεχάλασε.

*Verum adhuc difficilins est asserere osse colliso-
rum rimam egerit, idq; quoniam futura rimas refe-
rentes (utpote reliquo osse asperiores) iudicium aspe-
ctumque medici fallunt, nisi tamen os vehementer
dissectum ac solutum sit.*

Ὡς οὖν ὁσσεύεται, hoc est, insigni fra-
cturâ solutum est, tum sane difficile non est,
solutionem continui percipere; nam fractu-
râ solutæ partes intermediae fluctuant, neque
fieri potest chirurgi aspectum uti fugiant;
cujus contrarium fit in nudâ rimâ, præsertim
capillaris si sit.

ἀλλὰ χεῖρ κατὰ τὰς εἰσφὰς τὸ τραύμα γε-
νοῖτο καὶ πρὸς γὰρ ὁσέων σπείρειται βέλθ', πρὸ-
σέχοντα τὸν νοσὸν ἀνδρὶ σκεῖν ὃ, ἡ πέποιθεν τὸ ὁ-
σέων. ἀπὸ γὰρ ἰσχυρῶν βελῶν τὸ μέγεθος καὶ ὁμοίαν
καὶ πολλὸν τε ἑλαστονὴν καὶ ὁμοίως τραυθεὶς καὶ
πολύ ἥσπον, πολλὰ μείζον ἐκπύεται πρὸ κακὸν ὄν
τῶ ὁσέω ἐς τὰς εἰσφὰς δεξιὰ καὶ τὸ βέλθ', ἢ ὁ

μη ἐς τὰς ἐπιφὰς δεξιὰς καὶ τέτων τὰ
πολλὰ πρίεως δέ.

*Quum in ipsis futuris fuerit vulnus, ossique te-
lum insederit, diligenter tum attendere necesse est,
ut quam offensam os habeat, cognoscamus; nam ab
aqualibus ejusdemque magnitudinis telis, uti etiam
à leviori gravioreve ictu, si in ipsas incidat futuras
magis ledetur vulneratus, quam si in alia loca. Ho-
rum magna pars sectionem exigit.*

Repetitio præcedentium, nimirum effi-
caciùs afficere ictus in ipsas incidentes futu-
ras, quàm in alia capitis loca, Causa data,
quia ossa naturâ suâ futurarum locis soluta,
longè facilius solventur si plagam accipiant,
quàm loca capitis integra.

Horum magna pars sectionem exigit. Nimirum, Texti.
magna pars eorum vulnerum, quæ in loca
futuras non habentia incidunt. nam illis scal-
prorum usus, nihil incommodi adferre po-
test.

ἀλλ' ἔχον αὐτὰς τὰς ἐπιφὰς πρίν, ἀλλ'
ἀποχωρῶντα ἐν τῷ πλησίον ὅσῳ τὴν πρίν
ποιέω, ἢ πρίν. αὖτε δὲ ἵστος πρῶτος τῷ ἐντῇ
κεφαλῇ, καὶ ὡς ἔχον ἔξελέγχον τὰς παθὰς τὰς

ἐν τῷ ὅσῳ γινώσκας τὰς μὴ φανεράς, ὧδέ μοι
δοκέει.

*Secare autem ipsis futurarum locis non expedit:
sed si sectio necessaria, seca partem ossis vicinam
maximè. Et quidem de Vulnerum capitis curatione,
deque ratione qua deprehendi debeant ossium lisiones
non apparentes, ita censeo.*

Pluribus de causis prohibetur prorsus locis
ipsis futurarum. imbecilliora namque sunt
ipsa futurarum loca, quàm ut eam quam scal-
ptura aut modiolus adfert compressionem,
perferre possint. Accedit, filamentorum
membranarum laceratio, nec illa periculi
expers. ut non dicam, metum esse à callo
gignendo sectionis loco, ne is (luxurians
potissimum) obturans futurarum hiaturas,
fuliginum exitum prohibeat.

Text Si sectio necessaria, seca partem ossis vicinam
maximè. Idipsum monebit in sequentibus
plenius, nimirum quoties ipse locus divisi
ossis chirurgica non patitur instrumenta, ea
vicinis locis applicanda. puta fissam fra-
ctamve esse ipso futuræ loco calvam, quem
casum hic proponit: illam instrumentis tan-
gere, ob jam dictas causas non expedit, &
tamen

tamen casus requirit encheiresin. Statue os fractum ubi nullæ futuræ, verùm in tot divi-
sum vacillantia & fluctuantia fragmenta, uti non conducat ipso loco læso scalpria aut tre-
panum admoveere. Hisce casibus, loca quæ maxumè læsioni vicina eligenda, ibiq; pars ossis excindenda; ut exitus pateat intus la-
tentibus partim, partim vinctes similiaque instrumenta necessaria immitti uti queant.
Quam ad rem semper eligendus (nisi quid impedi-
at) locus declivis, ut qui expurgan-
dis superfluis magis conveniens. Ita Hipp. v. Epidem. secuit Autonomum in ipsas ictum
futuras die decimo quinto: non secuit autem ipso plagæ loco, sed vicino procul dubio.

ἔλκος ἐν τῇ κεφαλῇ & χεῖρ τέλειν & δευτ., & δε
οἶνω, * ἄλλως ἤκιστα.

Capitis ulcus nullâ re madefaciendum, imo ne
quidem vino, aut certe quam parcissimè.

Vulnerati cranij ea si fuerit conditio, so-
lutionem continui uti non deprehendat
chirurgus: veluti si in ipsas inciderit futuras;
si capillaris sit visumq; effugiat; aut si negli-
gentior in investigandâ fuerit rimâ; si serius
(quod hisce locis frequens) advocetur, fit
non

* alij

ἀλλ' ὡς
ἤκιστα.

non raro ut collecta fissuræ loco sanies, eoq;
non educta, illa acrimoniam putredine con-
trahens, os in cariem præcipitet. Eam hic
ulcus vocat, & bene; quum nihil aliud sit ca-
ries quam exesio ossis, sive ejus continui so-
lutio facta paulatim ac ut plurimum à causâ
intrinseca. Hoc vitium ossa capitis frequen-
ter quum infestet, priusquam docere pergat
quo pacto os recenti vulnere laborans tra-
ctari debeat, quædam de curatione ejusce-
modi præmittit ulceris.

Text. ἐλκεῖν τὴν κεφαλὴν. *Capitis ulcus.* Per ulcus, quod
dixi, intelligit cranij, non pericranij, ulcus.
hoc propriè *τερήδων* & per crasin *τερήδων* dicitur
Græcis: estque continui solutio in osse, quam
erosio genuit. posset simpliciter dici, ossis
exulceratio. Est autem axioma chirurgicum
universale; ulcus nisi siccetur, curari non
posse. nam in omni ulcere novella caro pro-
ducatur, necesse est. ad carnis productionem
requiruntur sarcotica. talia sunt, quæ tem-
peratè calent, quæque citrà adstrictionem
siccant. temperatè calida, ut innatum ulcera-
tæ partis calorem (ejus essentia in temperie
consistit) recreent. Siccantia ut ichorem il-
lum, quo ob languentem calorem innatum
labo-

laborant partes ulcerosæ, absumant. Hæc si in omni ulcere, in capitis ulcere multo magis locum habeant, necesse est. Etenim caries, ad gangrænâ viâ est. Eò magis, quòd ossis sit affectus: requirunt autem partes remedia naturæ temperamentoq; suo analogâ, hoc est siccantia. Itaque locus cariosus scalpri primum radi, & quantum fieri potest, mundari debet. Si non sufficiat scalpura, carie nimis profunda existente, cauterijs aut actualibus aut potentialibus tangendus locus. tum topica convenientia applicanda; pulvis iridis, aristolochiæ, gentianæ, sal, nitrum. aut ex his composita, qualia apud Gal. videre est 3. Method. Cap. 2. idque ut fragmenta vitio tacta ejici à naturâ possint. Elegantissimam curandi cariæ rationem tradit Celsus. Locus dignus qui hic inferatur. est cap. 2. lib. 8. *Omne autem os, ubi injuria accessit, aut vitiatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco movetur. Id quod vitiatur; primò fere pingue fit, deinde vel nigrum; vel cariosum. Que super natis gravibus ulceribus aut fistulis, hisq; vel longâ vetustate, vel etiam cancro occupatis eveniunt. Oportet ante omnia os nudare ulcere exciso: & si latius ejus vitium est, quàm ulcus fuit, carnem subsecare, donec integrum*

os undique pateat : tum id quod pingue est, semel ite-
 rumve satis est, admoto ferramento adurere, ut ex
 eo statu secedat : aut eradere, donec jam aliquid cruo-
 ris ostendatur, quæ integrioris nota est. Nam necesse
 est, aridum sit id quod vitiatum est. Idem in carti-
 lagine quoque lasâ faciendum est. Siquidem ea quo-
 que scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod
 relinquatur. Deinde si vel os, si ve cartilago rasa est,
 nitro bene trito respergendum est. Neque alia facien-
 da sunt, ubi caries nigritiesve in summo osse est. Si
 quidem id vel paulo diutius eodem ferramento adu-
 rendum, vel radendum est. Qui radit hæc, audacter
 imprimere ferramentum debet, ut & agat aliquid &
 maturius desinat. Finis est, cum vel ad album os,
 vel ad solidum ventum est. Albo finiri ex nigritie
 vitium, soliditate quadam ex carie manifestum est.
 Accedere etiam cruoris aliquid integro, supra dictum
 est. Si quando autem altius descenderit, utrumlibet
 dubium est. In carie quidem expedita cognitio est.
 Specillum tenue in foramen dimittitur, quod magis
 minusve intrando, vel in summo cariem esse, vel al-
 tius descendisse testatur. Nigrities colligi quidem po-
 test etiam ex dolore & ex febre. Quæ ubi mediocria
 sunt, illa altè descendisse non potest. Manifestior ta-
 men adactâ terebrâ fit. Nam finis vitij est, ubi seor-
 bis nigra esse desijt. Igitur si caries altè descendit,

per terebram urgenda crebris foraminibus est, quæ
 altitudine vitium æquent. Tum in ea foramina, de-
 mittenda candentia ferramenta sunt, donec inde sic-
 cum os ex toto fiat. Si mul enim post hæc & resolve-
 tur ab inferiore osse quodcumque vitiatum est, & is
 finis carne replebitur, & humor aut nullus postea
 feretur aut mediocris. Sin autem nigrities est, aut si
 caries ad alteram quoque partem ossis transit, opor-
 tet excidi. Atque idem in carie quoque ad alteram
 partem ossis penetrante fieri potest. Sed quod totum
 vitiatum, totum eximendum est. Si inferior pars
 integra est, eatenus quod corruptum est, excidi debet.
 Item si ve capitis, si ve pectoris os, si ve costa cari-
 osa est, inutilis vitio est, & excidendi necessitas est. Ne-
 que audiendi sunt qui osse nudato, diem tertium ex-
 pectant, ut tunc excidant. Ante inflammationem
 enim tutius omnia tractantur. Itaque quantum fieri
 potest, eodem momento & cutis incidenda est, & os
 detegendum, & omni vitio liberandum est, longeque
 perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia
 rix etiam si rectè cessit, curatio veram sanitatem
 reddit.

Ex hoc Celsi loco satis patet, cariẽm fisti
 neque tolli posse, nisi os siccetur. Idcirco sub-
 jungit Hipp. non tantum ab humidis actua-
 libus, sed & potentialibus abstinendum in

„ carioso cranij ulcere. dicit namque & ὁ αὐτὸς με
 „ *quidem vino.* quod potentiâ licet sive effectū
 „ siccet, actu tamen humet. Ipse Author lib.
 „ de Ulcer. inculcat. ulcera nullis madentibus
 „ tangi debere nisi vino; hic tamen in capitis
 „ ulcere vinum interdicit. In aliarum partium
 „ ulceribus conceditur usus vini nigri ac auste-
 „ ri, idque ad repellendum & siccandum: tum
 „ & quia partes illæ non ita siccæ sunt uti os.
 „ Nisi dicere velimus, recentibus cranij ulce-
 „ ribus vinum minimè convenire, nî medica-
 „ tum sumas; quale est, cui absinthium, rosæ,
 „ myrthus, betonica, nuces cupressi, similiaq;
 „ incoxerint. Etenim ulcus nullo pacto gluti-
 „ nandum, nisi prius mundetur, ossisque tacti
 „ fragmenta ejecta sint. At vinum austerrum
 „ repellendi suâ vi has actiones impedit. me-
 „ lius itaque est insistere usui topicorum à no-
 „ bis iam traditorum similiumque. Veteres
 „ emplastrum Isis valde commendant. etiam
 „ alia, quæ apud Celsum videre est cap. 19.
 „ lib. 5.

ἢ δὲ καὶ ἀπλάσσειν, ἢ δὲ μοῖαν τινὲν ἴσιν ποιεῖν.

- Nec etiam cataplasmate, uti nec linamentis ut-
 tendum.

Prohibuit humectantia in capitis vulne-

- οὐκ

ii X

ribus

ribus; tria alia vetat. 1. usum catáplasmatum. 2. linamentorum. 3. fortis ligaturæ. hæc namque omnia fuliginum, à quibus liberari satagit os cariosum, impediunt exhalationem. Fieri enim nequit solatium uti carioso adferatur ossi, nisi ventiletur: etenim præ nonnaturali ei inhærente materiâ obruitur extinguiturque innatus ossis calor, unde ad gangrænâ trahitur. at verò jam dicta tria poros ac spiracula ossis obstruunt, impediuntque ne superfluis detur exitus.

κατάπλαστρον. duplici nomine obsunt cata-
plasmata; præterquam enim quod crassitie suâ os claudant; etiam facultate constant sup-
puratoriâ. ast talia, calida & humida. Vidi non semel incipiente partis alicujus carnosæ gangrænâ, redditam confirmatam præ cata-
plasmatum, plagularum, fasciarum nimîâ crassitie ac mole. quanto magis in cranio?

Text.

ἐδεµοτῶν. nec linamentis. Sunt linamenta ex
linteo aut lino crudo parata; quæ vulneribus
immittuntur; aut ut ichorem superfluum in
se trahant; aut ut medicamentis quibus tingi
solent locum vulneris imbuant. Horum usus
in recentibus est pericranij vulneribus, quo-
rum labijs sicca applicantur ad hæmorrhagiam

Text.

giam sistendam: at pinguedine tincta, cōsi
minimè admovenda.

ἔδ' ἐπιέζειν χρὴ ἕλκος ἐν κεφαλῇ. *Neque admodum
comprimendum capitis ulcus.* Quod fit plagula-
rum fasciarumque fortiter nimis stringen-
tium ac comprimantium usu, nam illa & po-
ros & futuras cranij claudunt, eaque ratione
fuliginum effluvium impediunt. Vidi hac in
parte peccasse chirurgos non semel. Notum
est exemplum Mantix ex Galeno paulo ante
citatum. Potissimum verò incommoda hinc
enata vidi, in membris fractis. illa enim re-
linquere applicatis ferulis plagulisque cir-
cumpositisque fascijs post primam resectio-
nem diebus aliquot solent plerumque chi-
rurgi, reversique membrum incipiente ta-
ctum gangræna vident. Dicunt nonnulli,
fascias quasdam dari reprimentes. Respon-
deo, earum usum hic non esse necessarium,
quum caput in fastigio collocatum corporis,
repercussione non indigeat.

ὡς μὴ ἐν τῷ μετώπῳ ἢ τῷ ἕλκει ἢ ἐν τῷ ψιφί-
των πείχων, ἢ περὶ τὸν ὀφρυῶ καὶ τὸν ὀφθαλμον.
ἐν ταῦτα δὲ γινόμενα τὰ ἕλκεα, καταπλάσιθ' ἢ
ἐπιδέσιος μᾶλλον κέχρηται ἢ πᾶς ἄλλοι τῆς κε-
φαλῆς

φαλῆς τ' ἄλλης. θεωρεῖται γὰρ ἡ κεφαλὴ ἢ ἄλλη τὸ
μέτωπον πᾶν. ἐκ δὲ τῶν θεωρηχόντων τὰ ἔλκεα,
καὶ ἐν ὧ αὐτῇ τὰ ἔλκεα φλεγμαίνουσι ἔτι πανοί-
σκειται δι' αἵματος ὑπερβολῆς. καὶ δὲ ἐν τῷ
μέτωπῳ διὰ παντὸς τοῦ χρόνου καταπλάσσεται καὶ
ὑπερβαίνει, ἀλλ' ἐπειδὴ παύσεται φλεγμαίνοντα,
καὶ τὸ οἶδημα κατασῇ, παύσεται καὶ καταπλάσσοντα
ἔτι ὑπερβαίνει.

*Nisi in fronte (nimirum comprimere licet) fue-
rit, aut loco depili seu glabro, aut circa supercilium
& oculum. nam horum locorum ulcera magis pa-
tiuntur cataplasmata, ac deligationes, quàm que alijs
capitis accidunt locis; quum reliquum caput frontem
contineat. at verò ulcera ubicunque accidunt, pro-
pter sanguinis fluxum ab ijs quibus continentur in
inflammationem ac tumorem precipitantur. Atta-
men neque in frontis affectibus semper & quocunq;
tempore cataplasmatibus deligationiq; locus est, nisi
postquam inflammatio desijt, tumorq; evanuit, tum
enim ab his abstinendum.*

Nisi in fronte. Vincula fasciasque compri- Text.
mentes quas in reliquo capite damnavit, ad-
mittit in frontis vulneribus. causamq; addit.

quoniam reliquum caput frontem contineat: qui- Text.
bus hoc vult, quibuscunque locis fiunt ul-
cera.

cera, tumores, aut inflammationes, illis, affectibus ab influxu noxiæ materiæ maxumè metuendum. Hac de causâ videndum semper quænam sint loca mittentia materiam ad partes laborantes, admovendaque reprimentia ac reperiuntia, quæ affluentem materiam eo adigant, unde fluere incipit. Iam verò frons obnoxia influxui est materiæ noxiæ; nam in frontem desinunt seseq; exonerant sinus membranæ duræ, is potissimum falci qui comparari solet. Est præterea frons declivis admodum. In fronte collocatum infundibulum cum pituitariâ glandulâ; nares, palatum, ad frontem sunt omnia, ita ut excrementa se soleant frontem versus efferre. Adde, in fronte esse bregma, locum corpori perpendicularem, & versus quem natura solita est corporis superflua, halituo-
sa potissimum mittere. Hæ causæ sunt, quæ frequentius multò fronte quàm aliâ capitis parte doleamus. quæ etiam facile inflammationem incurrat frons. Frons contracta phrenitidem minatur, inquit in Coac. Hippocrates. Hisce de causis constringentia ac reprimentia vincula fronti magis quàm reliquis capitis locis conveniunt, ut eorum
ope

ope reprimatur affluens inflammationis, tumoris, aliorumque symptomatum materia.

Addit tamen, non omnibus vulnorum frontis temporibus ei convenire vincula comprimantia, sed quamdiu tumor & inflammatio durant tam diu ipsis utendum, illis cessantibus porro abstinendum, idque ne nimium claudantur ossis frontis pori ac spiracula.

ὅτι δὲ τῇ ἄλλῃ κεφαλῇ ἕλκος ἔτε μοι εἶναι χρὴ, οὐτε κατὰ πλάσσειν, οὐτ' ἐπιθεῖν, εἰ μὴ καὶ τομῆς δεῖται.

In ceteris capitis ulceribus, nec linamento, nec cataplasmate utendum, uti neque deligatione, nisi sectione opus sit.

Non sum hic cum ceteris Interpretibus in eadem sententiâ, Hippocratem nimirum per sectionem (quâ cum opus est, concedit linamenta & cataplasmata) hic intelligere περίαν seu sectionem aut exsectionem ossis; verum dissectionem pericranij. Non enim dicit necessariam esse περίαν, sed εἰ μὴ καὶ τομῆς δεῖται. quum etenim disseccatur pericranium, dissectis quæ habet vasis non rarò molesta oritur hæmorrhagia; cui coercendæ, linamentis siccis aut

adstringentibus topicis, tum & firmis opus est vinculis. Confirmant meam sententiam ea quæ subsequuntur.

Τάμινειν ὅχρη τῶν ἐλκεῶν τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ γινόμενων, καὶ ἐν μετώπῳ, ὅπη ἂν τὸ μὲν ὀστέον ψιλὸν ἢ τὸ σαρκὸς, καὶ δοκέη τι σῖνος ἔχειν ὑπὸ τῷ βέλεσθι. Τὰ ὅτι ἐλκεα μὴ ἱκανὰ τὸ μέγεθος τῷ μήκει καὶ τῷ εὐρύτητι, ἐς τιμὴν σκέψιν τῷ ὀστέῳ εἴ τι πέπονθεν ὑπὸ τοῦ βέλεσθι κακὸν, καὶ ὁποῖόν τι πέπονθεν, καὶ ὅσον ἢ μὲν σὰρξ πέφλασαι. καὶ τὸ ὀστέον ἔχει τὸ σῖνος. καὶ δὲ αὖτε εἰ αἰσινὲς τέ ἐστιν τὸ ὀστέον ὑπὸ τοῦ βέλεος, καὶ μηδὲν πέπονθε κακόν. Ἐς τιμὴν ἴησιν, οἷς δέιται μινὸς τό τε ἔλκος, ἢ τε ἰσχύς. Ἐν ἡπάθῃ τὸ ὀστέον. Ταῦτα δὲ τριῶν τῶν ἐλκεῶν τριῶν δέιται.

Exigunt autem sectionem capitis frontisque ulcera postquam os nudatum est, & verisimile fuerit à telo esse violatum; ipsa verò ulcera neque lata neque longa satis sint ut conspici possint an quid offenseos à telo incurrerit, cuiusmodi illa sit & quam magna: quantum item carnis collisum sit. aut, num è contra os sub telo inviolatum remanserit, nihilque mali senserit; quidque tam in carnis quàm ossis curatione observari debeat. Quod si nudato osse ulcera intus cava sunt, abundè incidere id cavum transversum oportet. Hæc itaque talia ulcera, sectionem expostulant.

Nihil apertius, quàm Hippocratem hic de divisione seu dissectione pericranij, seu cutis capitis loqui. nam tum oportet *Cap. 4. lib. 8.* inquit: hoc est novaculâ incidere pericranium, quum a telo non fuerit satis divisum, ita ut num subjectum os læsum sit, & quo læsionis genere teneatur conspiciere possimus. hanc rem antea pag: 113. adducto in medium Celsi loco prolixè explicuimus, quo pacto nimirum talis sectio institui debeat, & quænam in ea observare conveniat. Tres itaque sunt huius paragraphi cautiones chirurgus in dissectione pericranij observandæ. 1. non esse eâ utendum, ubi a telo satis diductum est: idque ne dolore frustrâ excarnificemus ægrum. id illa docent verba: *Exigunt autem sectionem capitis frontisq; ulcera postquam os nudatum est, ipsa verò ulcera neque lata neque longa satis sunt ut conspici possit.* Si tum tantum, itaque ubi præ telo satis denudatum os, non est ulterius dissecandum pericranium. Idem Celsi: *Cap. 4. lib. 8. Quacunque autem de causâ curatio hæc necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est latius aperienda est, donec quidquid læsum est, in conspectu sit.* Et paulo post: *plagam si ex vulnere est, talem necesse est habeamus qualem acceperimus.* Si

manu facienda est &c. Itaque non indiscriminatim, quod à nonnullis fit, in omnibus vulneribus pericranium dissecandum, sed si res exigat. 2. Majorem requiri pericranij dissectionem, ubi os subjectum cariosum est; potissimum quum locus cariosus rotundus existit. illis verbis: *quod si nudato osse ulcera intus cava sunt, abundè incidere id cavum transversum oportet.* 3. Non esse absque judicio ac diligenti consideratione, quemcunque pericranij locum incidendum, quum nonnullis id absque summo discrimine fieri nequeat; sed requiritur, ut chirurgus sit bonus Anatomicus, quò norit quibusnam locis subjectæ sint pericranio partes quas intactas relinquere, aut summo cum judicio secare oporteat. Vti in fronte quum sint palpebrarum muscoli, nunquam per transversum frontis cutis dissecanda, ne hominem excæces. Ita in occipite sunt muscoli capitis motui addicti, cavetis illos viroles. Potissimum verò cavendum à temporibus, uti sequente paragrapho monebit.

αὐτὸ καὶ μὲν ὅς ἐστιν ψιλῶς τῆς Σαρκὸς, ὑπόκειται
δὲ ἢ ἐς πλάγιον ἢ πρὸς πολὺ ἐπαναλέμεναι τὸ κοῖλον,
ὅκα μὴ δι' ἡμέρας τὰ φαρμάκῳ ἀφικέσθαι, ὅκοίῳ αὖ


ἡνιχρή. καὶ τὰ κυκλότερα τῷ ἑλκείῳ. καὶ ὑπό-
 κοιλα Ἰπὶ πολὺ, καὶ τὰ τριαῦτα ἐπαναλέμενων τὸν
 κύκλον διχῇ κατὰ μῆκος, ὡς πέφυκεν, ἀνθρω-
 πῳ, μακρὸν ποιεῖν τὸ ἑλκος. Τάμνοντι δὲ
 κεφαλῇ, τὰ μὲν ἄλλα πρὸς κεφαλῇ, ασ-
 φαλείῳ ἔχει τεμνόμενα. ὁ δὲ κροτάφος,
 καὶ ἄνωθεν ἐπὶ τοῦ κροτάφου, κατὰ τὴν φλέβα,
 τὴν διὰ τὸν κροτάφον φερούμεν, τὰ τὸ ὅτι χεῖρον
 μὴ τάμνειν. σπασμὸς γὰρ Ἰπὶ λαμβάνει τὴν τμη-
 θέα. καὶ ἡ μὲν ἐπὶ δεξιερὰ τμηθῇ κροτάφος,
 τὰ Ἰπὶ δεξιά ὁ σπασμὸς Ἰπὶ λαμβάνει. ἡ δὲ
 Ἰπὶ δεξιά τμηθῇ κροτάφος, τὰ ἐπὶ δεξιερὰ ὁ
 σπασμὸς Ἰπὶ λαμβάνει.

Atque etiam ubi os quidem nudatum carne fue-
 rit, fuerit verò obliqua quædam in ulceribus cavi-
 tas, oportet tum cavitatem illam sufficienter incidere,
 ubi medicamentum facile eò pertingere nequit. O-
 portet etiam incidere ulcera rotunda valdeque cava,
 ut orbe in longitudinem bifariam diviso, pro ho-
 minis natura ulcus longum reddatur. Quum inci-
 dendum caput est, cætera quidem loca tuto inci-
 duntur, at tempus, regioque superior prope venam
 quæ per tempora fertur, hic inquam locus secari non
 debet. Convulsione namque corripitur ita incisus. Et
 quidem

quidem sinistrum tempus incisum si fuerit convelluntur dextra; sin dextrum, sinistra.

Hæc jam est cautio tertia, observanda religiose chirurgo in pericranij apertione; ut norit non esse temere & sine magnâ causâ aperiendam cutem in temporibus. Nam eo fine secatur cutis, subjectum uti os denudetur; at hoc loco inter cutem ac os interjecti sunt temporales muscoli; quos discindere summè periculosum, ne dicam lethale est. Anne semper? Minimè. Vidi namque ala molæ puero ita collisum tempus dextrum, aliquot uti ossis pertusi fragmenta per vulnus eximerentur, nihil tamen incommodi toto curationis tempore patiente puero. Ita tempora aperiri manu chirurgi non semel vidi, absque ullo symptomate. verum ducebatur semper novacula secundum ductum fibrarum temporalis muscoli. ij namque omnes excurrunt tendinem versus. Itaque, si novaculam ducas ab occipite faciem sive os jugale versus (nam illud à naturâ temporalis & masseteris impositum tendinibus) minus erit periculi. Minus dico; nemini namque author fuerim, leviter & nisi summâ exposcente necessitate uti tempora dividat; verum eorum causâ hoc moneo, qui adeo meticu-

175.



A. Musculus Temporalis.

B. Disti muscoli tendo, ex fibris in eum deficientibus enatus, acutoque maxillæ processui sub osse iugali, hinc diffracto, insertus.

C. Vasa temporalia concessa.

D. Quod si novaculam ducas ab E versus F fieri non potest quin per transversum tam fibras quam vasa diffices.

lofi in

loſi in diſiſione cutis laborantibus temporibus, potius uti omni ope deſtitutum ægrum deferant, quam ad encheireſin uti deveniant. reverà, tam poteſt hic peccari in defectu quàm exceſſu. Hęc niſi nota ſint ac obſerventur, revera res periculo non vacat. Quod ſi namque per tranſverſum ducas novaculam non poteris evitare venæ, arteriæ, nervique, (vaſorum temporali muſculo conſeſſorum,) diſſectionem. Venam, potiſſimum verò arteriam ſi lædas, non niſi ſummo cum labore cohibebis effluentis aut potius cuni impetu exilientis ſanguinis impetum. Nam comedente, loquente vulnerrato propter maxillæ, læſo temporali nexæ motum, novam incurret hæmorrhagiam; quam ut ſiſtas, pluribus opus erit plagulis, arctiſſimâq; inſuper conſtrictione, quæ eripiendò arteriæ liberam pulſationem, in certam perniciem ægrum trahi videbis. Si nervum, convuſſionis oritur metus, & quidem convuſſionis caninæ, quâ durante æger nihil cibi ſumere poterit. Vniverſum muſculum ſi diſſeces (quod ut os petroſum denudetur fiat neceſſe eſt) omnes neceſſe eſt ejus fibras tendinem verſus excurrentes diſſecare.

seces unde maxillæ aut resolutio, aut certa sequetur convulsio. Exempla hanc ad rem fide digna adducere in medium possem ex Iacotio, Columbo, Paræo, Fallopio, Langio, Hildano plurima; sed sufficit magni Hippocratis autoritas, ex naturâ & conditione loci desumpta. qui quod addit notatu dignum, imo necessarium est, nimirum, *sinistrum tempus incisum si fuerit, convelli dextrum; sin dextrum, sinistrum*. Idem iisdem pene verbis repetit Coac. Præn. Cap. de Traumat. aph. i. ὁ κύριος καὶ τὸ πρὸς τὴν μεσότητα ἐκ τῶν ἐκείνων τῆς τομῆς διακρίνεται. *Quibuscumque tempora præciduntur convulsio incidit è diverso partis præcise*. Quænam hujus rei causa? eam dare non est difficile. Maxillæ enim inferioris motui inserviunt temporales muscoli. eam uti superiori adducant, necesse est simul agant seu se contrahant: uti cum simul se laxant, diductâ maxillâ aperitur os. Quod si horum alteruter dissectis per transversum ejus fibris resolvatur, is amplius se firmare non poterit; opposito contrâ munus suum exercente (non quidem invitus nimium agit oppositus musculus, sed iniussus) universa maxilla cò retrahatur necesse est. Itaque is tum con-

velli-

vellitur. Dissectus namque paralyti, convulsione laborat oppositus. Exemplum est in spasmo cynico, ubi similis est causarum ratio. Quærat quis. quid non itaque omnem paralytin sequatur aut comitetur oppositi lateris convulsio? quia partes habent musculos separatim agentes; secus ac hic, ubi ambo temporales muscoli quum uni eidemque inserviant parti, maxillæ dico, sunt robore æquales, fitque inde quædam velut *ἀντίστασις* seu æquilibrium, aut uti eleganter Hipp. lib. de Art. *ἀδελφία*, fraternitatem, mutuum consensum dixeris; ut necesse sit, alterutro à suo cessante officio, oppositum spasmo contrahi; nam pars maxillæ quam antea tendebat læsus, nunc universa versus oppositum fertur. In aliarum partium musculis secus fit, ut qui separatim agunt. Quænam namque dari possit pars cuius extensioni plures, ijque oppositi inserviant muscoli? si detur, in illo membro, idem quod in temporibus fiat, necesse est. Non possum autem satis mirari Cassij medici in dissolvendo hoc nodo audaciam, qui rationem redditurus problema-
te. 41. quid opposita resolvantur temporibus læsis, causam dicit: quòd omnes nervi à basi
cerebri.

cerebri oriantur, & ab exortu dextri ad sinistra, sinistri ad dextra abeant. quis hæc inquam aut vidit aut scribere cogitavit. Sensus docet, nervos ab exitu ad sua singulos abire latera. Ridenda itaque non refellenda hæc Cassij sententia.

Fisso itaque fractove temporum osse ægrum deferet Chirurgus? minimè verò, sed secabit pericranium sincipitis loco vicino; denudatoque ossi, si res ita exigat, modiolum admovebit. Exemplum ejus est apud Galen. 6. Meth. Cap. ultim: *Quod sincipitis ossi proximum est, Temporis os vocatur. in eo luculenta fractura longissimè pertinebat: quam quidem minimè attingens, sed tantum sincipitis os exscindens hominem sanavi. adeo ut nunc quoque multos annos vivat. Etiam Paræum lib. 9. cap. 9. Ne quis (inquit) chirurgus eo temeritatis veniat, ut musculi illius sectionem aggredi ausit ad subiectum os terebrandum: supra potius aut ad latus, ac quàm proximè partem affectam fieri poterit sibi terebrandum putet. Quod ego feci in nobili Petrechio. Is in triumphali Regis Henrici secundi in urbem ingressu, lapide ita sauciatus est, ut impetu os petrosum fractum, & vehementer contusus temporalis musculus, sine vulnere tamen extiterit. Sequenti die advocatus, perspe-*

Et à l'ëssonis specie, & l'ësa partis conditione, Medi-
corum & aliorum mecum Chirurgorum consilium
cogendum sensui; ex quibus cum quidam censerent di-
videndum quamprimum temporalem musculum, ut
renudato ossë terebrare liceret, sicque fracta ossa exi-
mere; Ego contrà acriter resistere cœpi, citatâ Hip-
pocratis sententiâ, ex lib. de Vuln. Capitis, quâ in-
terdicitur Chirurgis ejusmodi musculorum sectione,
metu commemoratorum symptomatum; citata etiam
experientiâ, quâ crebro animadverteram, quibus is
sectus fuisset musculus, convulsos interÿsse, satius
multo futurum, si proximè supra fracturam, os te-
rebrâ aperiretur, intacto quam minimum temporali
musculo. In eam sententiam cum tandem omnes des-
cendissent, ipse ex tempore sectione trigona cutem
musculosam, quæ supernæ fracturæ immineret, di-
visi. Postero die, qui tertius erat morbi, terebravi,
ac terebratione peractâ diebus aliquot post, quatuor
aculeata fracti ossis fragmenta exemi, tubulumque
plumbeum planum immisi, per quem, jussu agro quo-
ties curaretur caput deprimere, & ore naribusque
obturatis contentius expirare, multa manabat sanies
inter cranium & crassam meningem collecta. Reli-
quæ sordes, si quæ contumacius adhererent, rerum
detergentium decocto elui; tantumque Deo comatus
meos fortunante, perfeci, ut tandem convalesceret.

Par casus & similis fortuna in Metarum obsi-
 dione contigit Pienarum domino. Is enim cum ad di-
 rutam muri partem propugnaret, fracto temporum
 osse laesus est lapidis ictu, ex adstante muro elisi, aneo
 tormento ab Imperatoris castris disploso: ab ictu sta-
 tim concidit, sanguinem ore, naribus & auribus
 cum multo vomitu reddidit, ac totos fere quatuor-
 decim dies mutus & attonitus sic extitit, ut neminem
 adstantium agnosceret: Crebra palpitationes ac sub-
 sultus convulsorij illum exercebant, facies tumida
 erat. Terebratum autem fuit illi os frontis ad latus
 temporalis muscoli, manu Petri Auberti Chirurgi
 Regij: ac quamvis die quinto ac vicesimo caro mol-
 lis & exquisito sensu prædita, per foramen terebra
 factum emerisset, cujus ortum cathæretici pulveres
 prohibere non potuerunt, tandem tamen conva-
 luit.

ὅτι αὐτὸ ἐν τῷ μνησὶ ἔλκετο ἐν κεφαλῇ ὀστέων εἰ-
 νεκατὴ σαρκοῦ ἐψιλωμένον, θέλων εἰδέναι εἰ τι
 ἔχει τὸ ὄστέον κακὸν ὑπὸ τοῦ βέλετος, ἢ καὶ ὅσα ἔχου-
 τὰ μνησὶ καὶ τὸ μέγεθος τῷ ὠτὶ πλην, ὅση αὐτὸ δα-
 κην αἰνῶ καὶ ἡσυχίαν. Τάμνοντα δὲ καὶ ἀναστειλάν τῷ
 σαρκα δὲ τὸ ὄστέον, ἢ πρὸς τῇ μηνύγῃ καὶ πρὸς
 τῷ ὀστέῳ πέφυκεν. ἔπειτα διαμόλυσαν τὸ ἔλκος

πάν μοίω. ὅσας αὖ δὲ ῥυτὰς τὸ ἔλκεθ παρῆξ
 ἐς τὴν ὑπερώϊον ξυνέλαχίσω πόνω. μοίωσαντα
 δὲ κατὰ πλάσμαν χεῖρας ὅθι αὖ χρόνον καὶ τὰ
 μοτὰ, μάλιστ' ἐκ λεπιδῶν ἀλφίτων, ἐν ὅξϊ δια-
 μάσθην ἢ ἔψιν καὶ γλίχρην ποιεῖν ὡς μά-
 λιςα.

*Quum itaque ob os carne nudatum ulcus in capite
 secatur ut deprehendas num os loco ictus labem ali-
 quam acceperit nec ne, diffecare eâ amplitudine par-
 te superiore vulnus necesse est. Quod dum facis, car-
 nem quæ ossi & membrana adheret ab osse remove-
 bis. Quo facto, linamentis vulnus implendum, quæ
 in sequentem diem vulnus apertissimum exhibeant.
 Linamentis inditis & cataplasmate quamdiu lina-
 menta adhibentur, utendum maza ex tenuissimâ po-
 lentâ aceto subactâ, sicque cocta, donec glutinosa
 evadat.*

Hic paragraphus etiam ad pericranij per-
 tinet divisionem. nam dissectio illa quum
 hæmorrhagiam non excitare non possit,
 quæritur quâ ratione sanguinis effluvium
 coerceri possit (nam ejus nimium effluvium
 ægri vires valde dejiciet.) Author hoc loco
 duobus remedijs occurrit, jubens ut simul
 ac dissectum pericranium fuerit, linamentis
 replea-

repleatur locus sectus. nam siccitas lini è quo carpto volve ejuſcemodi parantur linamenta, imbibet fluentem ſanguinem. Si nimius fuerit ſanguinis impetus, tingantur linamenta medicamentis ſanguinem ſupprimentibus; quale ovi albumen, bolus, pulvis roſarum ſiccarum, pulvis myrtillorum, ſimiliaque. Neque ſolum hoc nomine linamenta immitti ſecto vult pericranio; verum inſuper jubet, ut quam copioſa illa ſubmittantur, diductis inciſi pericranij labijs. Ea namque ratione cutis tota ab oſſe recedit, proximaque reſectione os liberè conſpici poterit num aliquo teneatur vitio, ac inſtrumentis ſi opus tangi. Alterum remedium, ut præter linamenta applicentur loco ſecto, uno aut altero die (quum enim ſanguis cohibitus fuerit, non eſt opus hoc remedio) cataplaſma, quod ſuâ partim ſiccitate, partim emplaſticâ vi ora diſſectarum venarum claudendo, eâ ratione ſanguinem ſiſtat. Illud præſcribit ex mazâ, coctâ ex aceto; ἀλφίτον vocat. Eſtque nil niſi hordei toſti frictique farina. Illa ſi liquore aliquo ſubligatur, μάζη dicitur. Maza latinum nomen non habet, niſi Oſſam ex Plinio dicamus. Erat olim ci-
bus

bus vilior & plebeorum. Nam ubique veteres τὸν ἄρτον, & μάζαν, panem & mazam, sibi invicem opponunt. Ita Hipp. lib. de Salub. Diæt. panem prohibet, mazam ut molliorem cibum concedit. Et lib. περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς, panem & mazam, ut sicciorem & humidior cibum inter se conjungit. Porro Erotianus μάζαν ita describit: φύραμα ἐξ ἀλφίτων γινόμενον, ποτὲ μὲν μὲν ὀξύμελιτι, ποτὲ δὲ μὲν ὀξυκεράτῃ, ἢ ὑδρομέλιτι, ἢ μὲν ὕδατι. *Farinam hordei tosti humore aliquo subtractam sive oxymelite, poscā, mulsā, aut aquā.* Hoc medicamentum omnibus satisfaciet hoc casu concurrentibus indicationibus. opus namque est suppressione, doloris lenitione, inflammationis inhibitione. quæ cuncta potest farina hordei tosta, acetoque permista. Galenus hoc casu topicum laudat ex melle, cerā, medullā cervinā, myrrhā, & resinā terbinthinā, addito aceto.

Verum enimvero ad sanguinem, qui dissecto profunditur pericranio quod attinet, illud notandum; ut cum iudicio hac in parte agat chirurgus. Reperiuntur enim nonnulli vulnerati, sanguine abundantes, potissimum quum vulnerarentur, repleti potum & irā valde excandescentes: his talibus expedit

expedit ut sanguis liberalius feratur priusquam supprimitur, ita enim de superveniente inflammatione minus erit periculi; Contra, qui emaciati, qui dejecto animo, pueri, his talibus quam citissime supprimendus.

Τῇ δ' εὐσεργίᾳ ἡμέρῃ ἐπειδὰν ὀξέλης τὴν μοτὸν, καλιδὼν τὸ ὀσέον ὅ, ἡ πέπονθεν, εἰ μὴ σοι καταφανὴς ἢ ἡ τρώσις, ὁποῖα πῶς ἐστὶν ἐν τῷ ὀσέῳ, μὴ δὲ διαγνώσκῃς εἰ τὲ ἡ ἔχει τὸ ὀσέον κακὸν ἐν ἐσώῳ, ἢ καὶ ὅκ' ἔχει. Τὸ ὅ βέλθ' ὁκὲν ἀφικέσθ' ἐς τὸ ὀσέον καὶ σινᾶσθ'. ἐπιξύνειν χρὴ τῷ ξυστῆρι καὶ βάθος, καὶ κατὰ μήκος ὅ ἀνθρώπου ὡς πέφυκεν. καὶ αὐτοῖς εἰ ἢ κάρσιον τὸ ὀσέον τῷ ῥήξέῳ ἐνεκα τῷ ἀφανέων ἰδεῖν, καὶ τῆς φλάσις, ἐνεκα τ' ἀφανέος τ' ὅκ' ἐσφλωμῆς εἰσω ἐκ τ' φύσις τ' κεφαλῆς ὅ ἄλλ' ὀσέα. ὀξελέγχει γὰρ ἡ ξύσις μάλλον, καὶ μὴ καὶ ἄλλως καταφανέες ἐώσιν αὐτῇ αἱ πάσαι οὐσαι ἐν τῷ ὀσέῳ τοῦ βέλεος. καὶ κατὰ ἑδρῶν ἰδῆς ἐν τῷ ὀσέῳ ὅ βέλεος ὅπ' ἐξύνειν χρὴ αὐτῷ τε τῷ ἑδρῶν τοῦ βέλεος, καὶ τὰ ἀειέχοντα αὐτῷ ὀσέα, μὴ πολλάκις τῇ ἑδρῇ πρὸς ἡνίκα ῥήξις, καὶ φλάσις, ἢ μένη φλάσις. ἐπεὶ λαμβάνῃ καὶ καταφανέα εἶναι.

Postridie, ablati linamentis, inspicere quo malo os teneatur. Quod si qualis sit noxa consequi nequeas,

neque num os laesum sit, telum licet os attigisse, ipsaque laesisse tibi videatur, scalpro radere oportet in altitudinem ac longitudinem prout vulnerati fuerit natura: imò & transversim, ob rimas quæ visui se non subjiciunt, tum & propter non apparentem collisionem, quum os desinens ab alio non recesserit osse. Nam sculpturæ ossis vitia, alioqui non apparentia, deprehendi solent. Etiam si teli vestigium in osse apparuerit, scalpenda sedes tum & quæ circum sunt ossa, ne cum ad teli vestigium sæpe fissum collisumque, aut tantum collisum accedat, ea postmodum lateant neque in conspectum se dent.

Traditis ijs quæ chirurgus observanda in dissectione pericranij, nunc progreditur, expositurus quid porro fieri debeat. Iubet itaque, ut quamprimum (postridie inquit) ad ^{negotium} accedat, hoc est, uti os scalpris tractet. Sculptura, quatuor de causis necessaria. 1. ut latentes obscuræq; rimæ denudentur. 2. ut apparentes fissuræ deleantur. 3. Superficies calvæ ab aëre alterata (nam statim nigredinem contrahit) auferatur. 4. Si quæ in osse asperitas inæqualitasve, illa ut lævigetur. Ossi etenim exasperato novellam carunculam agere inducit natura. Hæ primariæ sculpturæ causæ. In quâ utinam frequentiores forent chirurgi,

nam

nam commodi adferre potest plurimum. incommodi nihil. Eâ autem neglectâ, noxis multis præbetur occasio.

τῇ δὲ ὕστερον. Notandum, quod iubeat pro-
tinus secundo ab illato vulnere die os radi. Text.
In magnis quidem vulneribus interdum
non ante diem tertium os ablatis linamentis
detegimus, metu hæmorrhagiæ: quæ si de-
ferit, quò citius eò melius. Nihil etenim in
capitis vulneribus calamitosius, quam rem-
trahere aut differre, nam sicubi, hic locum
habet, Occasio præcept. Vt nullo pacto ij
audiendi sint qui freti Celsi auctoritate, satis
esse putant si æstate ante septimum, ante
decimumquartum diem hyemæ prisus in-
stituatur. Explodenda opinio, & quibuscun-
que modis averruncanda è chirurgorum ani-
mis, quum quotidiana id testentur exempla,
si eousque rem differas, nihilominus tum
mori ægros. Revocentur huc à nobis tradita
pag. 47. Audiatur Celsus ipse sui, uti vide-
tur, immemor Cap. 2. lib. 8. Neque audiendi
sunt, qui osse nudato diem tertium expectant, ut tunc
excident. Ante inflammationem enim tutius omnia
tractantur. Itaque quantum fieri potest, eodem mo-
mento & cutis incidenda est, & os detegendum, &

* Quid si
detergendum.

omni vitio liberandum est. Salutariter Celse mones. quur autem ejusdem libri Cap. 4. iubes rem differri in diem 7. imò ulterius? nimium pernicioſa multis hæc tua παθούια.

Text. *Radendum prout vulnerati fuerit natura. Hoc est, prout craſſiore tenuioreve fuerit cranio vulneratus. Neque enim tātum ſcobis à tenui uti à craſſo auferre licet capite. Hoc monuit in prolegomenis Author, quum diceret, humana capita parum inter ſe convenire. Perſarum lapilli ictum, ſecus ac Ægyptiorum vix ſuſtinebant. Æthiopum, ipſa tela diſſilire faciunt. At, dicat quis, quo pacto certus ſiam quouſque ſcalpendum ſit? donec aliquid ſanguinolentæ ſe oſtendat medullæ; qua apparente, certus eſto, ad meditullium, ablatâ primâ te perveniſſe tabulâ. Celſum du-
 „ cem ſequere, qui ſic Cap. 2. lib. 8. *Tum id quod*
 „ *pingue eſt, ſemel iterumve ſatis eſt admoto ferra-*
 „ *mento adurere, ut ex eo ſtatu ſecedat aut eradere, do-*
 „ *nec jam aliquid cruoris oſtendatur, quæ integrioris*
 „ *nota eſt. nam neceſſe eſt aridum ſit id quod vitia-*
 „ *tum eſt.**

Text. *Imò & tranſverſim, ob rimas quæ viſui ſe non ſubjiciunt. Ingenioſum monitum. Si inquit adeo exiles rimæ fuerint, ipſus uti dubites*
 num

num fissum os sit, utere scalpris, ijsque os omnibus modis radito. Si rasurâ rectâ nil inuenias, transversam institue. Illâ namque simul ac ad rimæ locum venerit ferramentum, hæsitabit, secus ac in sculpturâ rectâ.

*Nam sculpturâ ossis vitia, alloqui non apperentia, Textu
deprehendi solent. Nisi in cranijs adeo duris, nihil uti scobis auferre queant scalpria radentia, Quid tum? tingendum os atramento, uti jamjam monebit Author.*

*Etiam si teli vestigium in osse apparuerit, scalpen- Textu
da sedes. Etenim teli vestigium necessario os exasperat; ast loco exasperato nunquam commodè carnem inducet natura; sculptura itaque lævigandus. Celsus audiatur Cap. 3. lib. 8. Circumradendæ lævandæque sunt ora, ut sine noxâ
postea cutis increfcat: quæ aspero ossi innascens, pro-
tinus non sanitatem, sed novos dolores movet. Ad-
dit hic etiam causam Author, ut nempe de-
prehendi exiles possint rimulæ, quas non raro ossis asperitas, quam teli sedes parit, ob-
umbrat.*

ἐπειδὴ δὲ εὐθὺς τὸ ὀστέον πρὸς ζυγῆν, καὶ μὴ δα-
κύνῃ ἐς πρὶσιν ἀφίκειν ἢ τρώσκειν τοῦ ὀστέου, πρὶσιν
καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας μὴ ὑπερβάλλοντα ἀπρίωντον,

ἀλλ' ἐν ταύταισι πείν, ἄλλως τε καὶ τῇ θερμῇ ὥ-
ρης, ὡς ἔξ ἀρχῆς λαμβάνης τὸ ἴημα.

*Vbi scalpro os rasum fuerit, quod si vulneris con-
ditio exsectionem requirere videatur, eam intra tri-
duum instituito, neque patere id temporis spatium ef-
fluere; tum potissimum, quum constitutione aeris ca-
lida curationem suscepisti.*

Existimo translata hæc esse, neque genui-
no occurrere loco. nam de exsectione ossis
hic agit, iubens ante tertium diem uti illa
instituat, præsertim æstate; & tamen multa
subiungit de modo investigandi rimas, quæ
rasura facile, citrà ossis exsectionem, deleri
queunt. Arbitror itaque hæc post sequentem
collocanda paragraphum.

ὡς δὲ ἀποπίδους μὲν τὸ ὀστέον ἐρρωγῆναι, ἢ
πεφλαῖν, ἢ ἀμφοτέρω ταῦτα, τεκμαιρομένη
ὅτι ἰχυρῶς τέτρωται ἐκ τῶν λογῶν ἔτρωματιον.
καὶ ὅτι ἀπὸ ἰχυρῆς ἔτρωσεν ὁ ἄνθρωπος, ἢ ἕτερος ὑφ' ἑτέ-
ρου τρώθῃ. καὶ τὸ βέλθῃ ὅτῳ ἐτρώθῃ, ὅτι τῶν κα-
κῶν βελέων ὡς, ἐπέτα τὸν ἄνθρωπον ὅτι δύνῃ
τέ ἐλαβεν, καὶ σκότος, καὶ ἐκαρῶθη καὶ κατέπε-
σεν.

*Et si quidem suspiceris fissum, collisum, aut utro-
que*

que modo os affectum esse, de vulneris magnitudine colliges ex agri relatu; num nimirum à valido infligitum sit adversario; num conserta manu inter se confixerint; num ejusmodi telum, quo efficaciter infligiqueat vulnus. Adde, si ager vertigine correptus sit, si offuscati oculi, si profundo oppressus somno.

Si inquit ita se habuerint post illatum ictum circumstantiæ, ut verisimile sit os rimam e- gisse, quam tamen reperire nequeas, diligen- ter in omnia inquirendum. Examinetur æ- ger, qui si afferat, robustum fuisse qui ictum intulit adversarium, verisimile fiet cranium divisum esse; si dicat se conserta manu cum adversario con- gressum, spem facit vulneris minus gravis, quam si a sicario non cogitanti inflictum sit, nam tela pravisa minus nocent. Si referat, telum fuisse aut valde scindens, aut obtusum & tamen admodum ponderosum, suspicio- nem dabit fissi cranij. Hisce si accedant signa cerebri perturbati, uti vertigo, caligatio, carus; hæc inquit concurrentia, admodum firma- bunt chirurgum, de fisso cranio suspicantem. Et tamen, dicat quis, hæc cuncta fallacia esse, ante dictum; nihilne itaque certi; respondet Author.

*Videtur hic
desiderati vo-
cula aliqua,
uti ex-
aut similis,
plenior uti
sic mens.

Τέτων ὃ ἔτω γινομένων, ὡς μὴ διαγνωστικῆς
ἐκέρρωγε τὸ ὄσέον, ἢ πέφλασαι, ἢ καὶ ἀμφοτέρω
ταῦτα, μήτε ἄλλως ὁρῶν, * ὁ εἶ δὲ ὅτι τὸ ὄσέον
τήκειν τὸ μαλανύον δούσαντα τὰ μέλανι φαρ-
μάκω τὰ πικρομύω. τότε ἔλκετο ὑποτείνας ὁ-
δόνιον ἐλαίῳ τέγξαι, εἶτα καταπλάσας τῇ μά-
ζῃ ὑπιδῆσαι. τῇ δὲ ὑσεραίῃ, διπολύσας καὶ ἐκ-
καθήρας τὸ ἔλκετο ὑπιδύσαι. καὶ ὡς μὴ ἡ ὑγίης,
ἀλλ' ἐρρώγη καὶ πεφλασμένον ἢ, τὸ μὲν ἄλλο
ἔσαι ὄσέον λευκὸν ξυόμενον. ἢ ὃ ῥωγμὴ καὶ ἡ φλά-
σις κατακέντετο τοῦ φαρμάκου δεξαμένη τὸ φάρ-
μακον ἐς ἐσωτὶ μὲλαν ἐόν, ἔσαι μέλαινα, ἐν
λευκῷ τῷ ὄσέῳ τὰ ἄλλα. ἀλλὰ χρητὴ αὖτις τὴν
ῥωγμὴν † ταύτῃ φανείσαν, ὑπιδύειν καὶ βά-
πτειν. καὶ ὡς μὲν ὑπιδύων τὴν ῥωγμὴν ταύ-
τῃ φανείσαν μέλαιναν ὑξέλης καὶ ἀφανέα πο-
ίησης, φλάσις μὲν γεγνήσθαι τοῦ ὄσους ἢ μᾶλλον
ἢ ἦσαν, ἢ περ ἐρρήξε καὶ τὴν ῥωγμὴν τὴν
ἀφανισθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ξυστῆσθαι. ἦσαν δὲ φοβε-
ρὸν καὶ ἦσαν αὐτὴν πρὸς γμα ἀπ' αὐτῆς γήραιο ἀφα-
νεθείσης τ' ῥωγμῆς.

† Nonnulla
exemplaria
habent
φανείσαν
μέλαινα.

*Hisce apparentibus, si nondum patet fissum, col-
lisum, aut utroque modo os laesum sit; neque aliā ulla
id col-*

id colligere ratione liceat, tingendum tum os nigro aliquo medicamento, maceratum quod sit, ulcusque dedeligandum linteo oleoso substrato, tumque imposito ex maza cataplasmate. Postridie detecto loco absterfoque, radito. Integrum namque si os non fuerit, verum fissum collisumve, reliquum quidem os sculptum albedinem ostendet, fissum vero collisumve quia nigredinem medicamenti imbibit, reliquo osse albo apparente, nigredinis ostendet vestigium. Quocirca denuò quæ nigredinem habet rima profundius radenda. Sic nigricantem namque si radendo ita ut evanescat delere possis, os plus minusve collisum fuisse, ex eoque rimam accepisse, quam scalper delerit, scito. minus autem terret, minusque faciesit negotij deleta rima.

Hæc ultima inveniendi rimam spes est. rimam inquam, quæ neque visu cognosci, nec specillo aut scalpro deprehendi potest. Inducatur itaque ossi, quod nihilominus in suspicionem venit, atramentum scriptorium; quo facto cataplasma ex mazâ imposito, sicque per noctem relinquito. postridie fascijs, ac cataplasmate ablato, osseque bene absterfo, denuò ad sculpturam accedito. Si integrum fuerit os, undiquaque scobem albam dabit, sin vitium habeat, deprehendes

rimæ vestigium atramenti liturâ. Nam atramentum penetrandi vi, ratione aceti pol-
lens, insinuabit se in ipsam ossis divisuram.
Hac itaque ratione de rimâ certus fies. Quæ
num profunda admodum sit, nec ne, ut cog-
noscas, radito denuo os scalpris ipso nigre-
dinis loco; quod si namque facile vestigium
nigredinis deleveris, securus esto; non enim
profundè se ossi insinuat rima. Sin verò atra-
menti vestigium, ne quidem erumpente san-
guineâ medullâ, auferre queas, scito primam
cranij tabulam in totum fissam; forte & pro-
fundius penetrare fissuram. Hæc Authoris
hoc paragrapho mens. Quæ cum in sensu
consistant, explicatione laboriosâ non e-
gent.

Ceterum mirari satis nequeo, nonnullo-
rum hujus loci interpretum nimiam curiosi-
tatem; monent etenim, ne in hoc casu atra-
mento scriptorio chirurgus utatur, ne si for-
te utraque tabula fissa, à chalcanti ac gallæ a-
crimonia dura menynx offendatur. Ne-
sciunt hi, ejuscemodi medicamenta exigere
membranam nudatam læsamve. Nam quum
siccam admodum acceperit consistentiam,
siccantia remedia, utpote naturæ suæ analo-
ga, ei

ga, ei grata. Celsum audiant Cap. 4. lib. 8.
*His factis, ea membrana acri aceto respergenda; ut, sive aliquid sanguinis ex eâ profluit, cohibeatur; si-
 ve intus concretus cruor remanet, discutiatur.*

Etiam Interpretes nonnullos ambigere video, quale medicamentum nigrum hic Hippocratis præscribat. Verba ejus sunt *ἡ δὲ δὴ πὶ τὸ ὀστέον τήκειν τὸ μελάνιστον δόσαντα τῷ μέλανι φάρμακῳ τῷ τηκομένῳ. Et super os medicamentum aliquod nigrum liquatum & humore subactum inducendum.* Quidnam hic *μελαίνιστον* vocet, subtilius quam utilius nonnulli disputant. Sunt qui medicamentum nigrum; alij atramentum scriptorium; sunt qui utrumque existimantes nihil hæc duo differre. Errant posteriores. aliud namque græcis *μέλαν φάρμακον*, & *μέλαν γραφικόν*. *μέλαν φάρμακον*, sic à nigredine vocatum, certum erat compositum medicamentum, quod etiam *καρκινόν* vocabant. Hoc ab ipso describitur Hippocrate lib. de Ulcerib. Constabat elleboro nigro, sandarachâ, æris squammâ, plumbo loto, sulphure, auripigmento & cantharidibus. Hæc in pollinem redacta, cedrino excipiebant oleo, sicque medicamentum parabant catharticum, ad detergenda ulcera sordida, carnesque exedendas. Cui

Bb ij subinde

subinde arum coctum tulum, aut aridum lavigatum & melle exceptum, adjiciebant. Hoc à nucibus accepisse nomen qui arbitrantur, falluntur non parum; nulla cum fiat in describendo carico, nucum mentio. At uerò μέλαν γραφικόν seu scriptorium atramentum, erat illud quò Veteres scribebant, (non enim stylo semper utebantur) cujus parandi modum, Dioscorides tradit Cap. ultimo lib. 6. nimirum, sumebant fuliginis à tedis coactæ minam; gummi sesquilibram; taurini glutinis, atramenti sutorij, singulorum sesquiunciam. Hac descriptione etiam sutorij atramenti fit mentio. Erat namque illis atramentum triplex: Scriptorium, Tectorium, Sutorium. Scriptorium, quo in transcribendo utebantur, à Dioscoride jam descriptum. Tectorium, à tectorijs sic vocatum. quod pictoribus in usu, tectis & parietibus depingendis. Sutorium, quod in pellibus inficiendis, coriarijs & depfatoribus olim, uti & hodie, in usu; quod sæpe χαλκαίον Græci, à vitri similitudine Vitriolum latini. Quocunque horum quatuor (pharmaci dico nigri, atramenti scriptorij, sutorij, tinctorij) ad investigandam rimam uti chirurgus volet, menti

ti Hipp.

ti Hipp. satisfaciet. Qui hoc solum vult, rimam etiam capillarem uti si habeat os, eam atramenti aut pharmaci nigredine investigandam. Nec est, uti jam dixi, quod atramenti acrimonia quem deterreat, quum licet ambas calvæ tabulas pervadat, nihil tamen noxæ inferre membranæ queat, ut quæ ab acribus minimè abhorret. Ita Gal. 6. Method. ex sententiâ Eudemi & Megetis Sidonij, emplastrum quod Isis vocatur concedit in membranâ denudatâ, ex admodum acribus constans.

Hoc itaque postremum est signum, cujus ope rimam dubiam investigari vult Hippocrates. Reliqua hic conjunctim referre operæ pretium, duco. 1. inquit in symptomata quibus ab ictu correptus vulneratus: num oculi obcæcati sint; num obmutuerit; num per nares auresve sanguis effluerit; num sine sensu ac motu fuerit; num vertigine correptus; num in vomitum eruperit. Quæ tamen cuncta, concussionem cerebri, quam cranij rupturam indicant potius. 2. Examinat circumstantias vulneris illati. num nimirum ictus admodum fuerit validus; num incerto illatus ægro; num robustus qui inflixit.

3. Ipsum telum. quod si obtusum, admodumque fuerit ponderosum; si ex loco sublimi in declivem æger ceciderit, suspicio violati venit cranij. 4. Hipp. in Coac. vulnerato ferulæ caulem masticandum præbet, ut eâ ratione strepitus fractorum exaudiri possit ossum. Cujus imitatione nonnulli hodie chirurgi, vulnerato nucem dentibus frangendam offerunt. Aut filum cuius alterum extremum ore tenet æger concutiunt, observantes num tremulum illum motum ferre possit. 5. Os specillo feriri jubet, ut sono obtuso aut claro, integritatem, rupturamve ossis consequantur. 6. Specillo nec acuto nec obtuso nimis explorat, num fissum sit. 7. Num arrecti loco vulneris sint capilli, considerat. 8. Addunt hoc ævo chirurgi, ut vulneratus ore naribusque clausis magno nisu conetur expirare. Si namque bullulæ, aut humor aliquis ex osse erumpat, ibi fissuram esse verisimile fit. 9. Alij ossi cataplasma ex mastiche, bolo, oviq; applicant albumine; quòd si ablatum emplastrum hac quàm illâ sui parte magis exsiccatum sit, de rimâ suspicio oritur. Simili modo quo 3. de Morb. Hipp. applicatione cataplasmatidis ex terrâ

Erythroide rubrâ, thoracis explorat empyema. 10. Tincturam ossis atramento addit Hipp. de quo jam satis dictum.

ὡς ὅτι βάθος ἢ καὶ μὴ ἐθέλη ὀξείναι ἐπιζυομένη, ἀφίκε ἐς πρίσιν ἢ τριαύτῃ συμφορῇ. ἀλλὰ καὶ πρίσαντα τὰ λοιπὰ ἰητρούειν τὸ ἐλκεῖν. φυλάσσει δὲ καὶ ὅπως μή τι κακὸν ἀπολαύσῃ τὸ ὅσέον ἀπὸ τῆς σαρκὸς, ἢν κακῶς ἰητρούηται. ὅσέον γὰρ πεπρισμένον, ἔσθ' ἄλλως ἐψιλωμένον, ὑγιεῖ δὲ ἐόντι, καὶ ἔχοντι ἢ σὺν ὅσῳ βέλεσθαι, δοκέοντι δὲ ὑγιεῖ εἶναι, κίνδυνός ἐστι μᾶλλον ὑπόπυον γένεσθαι ἢν καὶ ἄλλως μὴ μέλλῃ, ἢν καὶ ἡ σὰρξ ἢ περιεχυσὰ τὸ ὅσέον κακῶς θέραιπυῖν, καὶ φλεγμῶν, καὶ πνεύματι. πυρετῶδες γὰρ γίνεται, καὶ πολλὰ φλογμὸς πλέον. καὶ δὴ τὸ ὅσέον ἐκ τῶν περιεχυσῶν σαρκέων ἐς ἐωυτὴν θέρμηνται καὶ φλογμὸν, * ἔσθ' ἄρα δὴν ἐμποιεῖ καὶ σφοδρὸν καὶ σάπερ ἢ σὰρξ ἔχει κακὰ ἐν ἐωυτῇ, ἔσθ' ἐκ τούτων ὥστε ὑπόπυον γίνεσθαι.

* Hæc nonnulla exemplaria omitunt.

Profundiore existente rimâ quàm radendo deleri uti possit, ad sectionem veniendum. Sectione autem utentem, in reliquo ad ulcers curationem intentum esse oportet, cavendumque ne os a carne minus recte tractatâ detrimentum accipiat. Os enim sectum & al. loqui

alioqui nudatum, tamen integrum, aut quod labem à telo accepit, licet integrum videatur, majore in periculo est ne purulentum fiat, cum alioqui purulentum non fieret. tum si caro os ambiens malè curetur, tum inflammationem concipiat, & constricta sit. Etenim os igneum redditur atque inflammatur, ut quod a subjectâ carne madescit, inflammatur, perturbatur, pulsatur, iisque corripitur malis, quibus laborat caro, eaque ratione purulentum efficitur.

Si conanti atramenti delere vestigium, scalpendo deleri non posse videat, iudicabit rimam pervadere primam tabulam. Quum itaque scalpendo talis fissura auferri nequeat, de excidendo osse fisso cogitandum, idque aut cyclisco excisorio, aut modiolo. De quo dum cogitas, inquit, cavere debes, ne secandum os labem aliquam à pericranio non rite tractato incurrat, quod facile fieret. Nam os modioli circumactione valde incalescit, eoque calore retrahit si quid noxij fuerit in pericranio. Si itaque chirurgus reficiens quotidie vulnus, labia pericranij non debite mundet, omnemque ichorem sordesque curiose auferat, illa partim suo pondere, partim attracta à nonnaturalis calore qui ossi inest, stillabunt in subjectam membranam (nam

(nam illa exsectione ossis detecta jam est) quod ipsum periculo non vacat. Præterquam quod eadem sordes, in ipsum os sectum se infundent. Non poterit enim os laborans, superflua affluentia à se commodè repellere, quia fissurâ partim, partim prisi, non parum debile redditum fuit. Qui namque existimant os ob summam siccitatem putredine corripì non posse, errant. Habet nativam in se succulentiam, haud aliter ac cæteræ corporis partes. habet medullam calidam & humidam, quæ accedente aliquâ causâ haud aliter corrumpitur ac carnosæ partes. Testatur caries, ossis gangræna. Testatur nimia modiolì circumductio, quæ os efficaciter inflammare solet. Hic itaque ea inculcat quæ prævidere debet chirurgus priusquam prisi instituat; alias sectioni supervenientia, ossis glutinationem impediunt non parum. Non paucos enim reperias imperitos chirurgos, qui nihilominus perniciosâ quadam temeritate vulnera capitis, quorum nullam habent notitiam, tamen curanda sumunt. Hi ignorantes, mutanda esse remedia pro diversis morbi temporibus, (nam alia debentur dum in primo tempore sive in principio

est vulnus; aliâ cum in augmento, quam in statu) ijsdem remedijs ab initio ad finem usque infistunt; ut plurimum pericranio dissecto applicantes sua vocata elixiria, medicamenta summè calida & sicca, qualis aqua stillatitia, pulveres calidissimi. non distinguentes interim inter ætates, corporum constitutiones, similiaque ad curandum observatur necessaria; unâ fideiâ omnes dealbare dum conantur parietes, pericranium ipsumque os in inflammationem conjiciunt, affectusque per se curabiles non rarò insanabiles efficiunt. Alij, omni ulceri quocunque morbi tempore solum unguentum de betonica admovent: alij hæresin esse putant, si dicas pinguibus os tangi non debere. cum tamen ita id verum sit, non semel uti viderim os nigredinem contraxisse, imò cariem incurrisse admotis pulveribus, qui cephalici ipsis vocantur, qualis myrrha, thus, styrax, similiaque resinosa. Hæc enim actu licet sicca applicentur, gummositas tamen ab ossis humiditate dissoluta, ipsi ossi se insinuat, illudque offendit. Si caput nimîâ tegminum copiâ offendi dicas, impediri fuliginum evaporationem, inde inflammationis, doloris capitis, aliorumque

numque symptomatum metum, delirare te putant; nescientes, ita à frigore cavendum, ne calorem nimis accendas. Eâ namque ratione innato calore offuscato, alienus calor incrementa sumit; indeque omnium malorum origo. Quam multi hac amethoda curandi ratione, dum charybdin vitant, in scyllam incidunt, dum vitant vitia, in contraria currunt. Sunt qui solius aquæ usum omnibus vulneris temporibus convenire contendunt. Sed paradoxologi illi nullo pacto audiendi. Frigus nimium capiti inimicum, scio; sed & illud scio, initio vulnerum partes læsas præter solitum calere; nam sanguis & spiritus ad debiles, utpote læsas, partes affluendo, eas calidiores efficiunt. Hisce itaque motus hipp. hoc monitum priusquam priseos rationem tradat, necessarium esse existimavit. Quod ipsum etiam sequentibus inculcat.

Κακὸν ὃ καὶ ὑπερῷ τε εἶναι τὴν σάρκα ἐν τῷ
 ἔλκει, καὶ μὲν ὧσαν. καὶ ὅτι πολλὸν χρόνον κα-
 θάρεαι. ἀλλὰ χρὴ διάπυσιν μὲν ποιῆσαι τὸ ἔλκος
 ὡς τάχιστα. ἔτω γὰρ αὐτὴν ἥκιστα φλεγμαίνουσαν, ἀφαι-
 ρέουσαν τὸ ἔλκος, καὶ τάχιστα καθαρόν ἐστι. ἀνάγκη

ἢ ἐχέ τὰς ῥαγάς τὰς κοπίδας καὶ φλαδί-
 ρας ὑπὸ ῥ' ἑλέως ὑποπύας ἡγομένης ἐκλακῆναι.
 ἐπειδὴν ὃ καθαρῇ, ξηρότεραν χεὶρ γίγνεται ῥ' ἐλ-
 κῶ. ἔτω ἢ αὐτὰ χεῖρα ὑγιὲς ἦροίτο ξηρῆς ῥα-
 γῆς βλαστῆς ἢ μὴ ὑγρῆς. ἢ ἔτως ἔκ αὐτῶ ἐρ-
 ρακίση ῥ' ἐλκῶ. ὁ δ' αὐτὸς λόγῳ καὶ ὑπὲρ ῥ'
 μιλίγῳ ῥ' πρὸς τὸν ἐγκέφαλον. ἢ γὰρ αὐτὴ κα-
 ἐκπίσας ῥ' ὀστέον καὶ ἀφελὼν ἀπὸ τῆς μηνίγῆος
 * ψιλῶσας, αὐτῷ καθαρεύῃ χρὴ ποιῆσαι ὡς
 τὰ χεῖρα καὶ ξηρῶν ὡς μὴ ἴπῃ περὶ χρόνον
 οὕτω μυδῆν τε καὶ ἰσχυρῆναι. τέτων γὰρ ἔτω
 ἡγομένην, σαπῆναι αὐτῷ κίνδυνος.

* ψιλῶσας
 legit docu-
 simus Scali-
 ger.

† Nihil hic
 in textu mu-
 tandum. ar-
 bitror.

*Malum autem ulceris carnem humidam esse ac
 hebetem tardiusque repurgari. Adnitendum tamen,
 ut quam citissime ad suppurationem ulcus perduca-
 tur. Nam hac ratione quæ ulcus ambiunt partes in-
 flammationem non incurrunt, ipsumque ulcus quam
 celerrime purum reddetur. Lacerata namque collisa-
 que à telo caro, in pus verti ac tabescere debet. Vbi
 vero purgatum ulcus fuerit, siccus fiat necesse est;
 eadem namque ratione maturè ad sanitatem tendet, ca-
 roque sicca non humida non flaccida producet; ne-
 que quoque supra vulneris labia excresecendo se at-
 tollet. Eadem etiam membranae cerebri est ratio, ut*

que

*que osse secto exemptoque omni conatu purgari sicca-
rique debet, ne madida diutius hebes reddatur, tum
& intumescat seseque attollat. Nam hæc si fiant, ne
ipsa putredine corripiatur metus est.*

Signum minimè bonum dicit, si novella
caro, quam in parte ulcerosâ producere inci-
pit natura, mollis sit, spongiæ instar albi-
cans, ac hebes, hoc est, stupidâ, parumque
fentiens. Significat namque, eam *tardius re-
purgari*: id est, naturam debilem non satis ef-
ficaciter propellere superfluam, quæ carnem
flaccidam reddit humiditatem. Bene notari
hic debet: Monitum istud non solum in pe-
ricranij carne, sed eâ quoque, in ipso quæ
producitur cranio, locum habere. Postquam
enim bene nudatum os, fissuræ deletæ, frag-
menta omniaque impedimenta ablata, jam
tum natura in exteriori cranij superficie
punctula carnea producere incipiet, quæ
paulatim juncta universim os ac si perio-
stion foret, tegent: Vidi, nec semel, cum pu-
taret in vado omnia esse chirurgus, nihilque
ad curationem restare, tum naturam aut ni-
hil produxisse carnis, aut eam albicantem,
mollem, spongiosam, ac insensilem. quod
animadvertens suspicio mihi fiebat latitare

etiamnum quid: nec me suspicio fefellit;
tandem etenim prodiens lamina quædam
osseæ, etiamsi exilis admodum, impedisse se
actiones naturæ ostendebat. Rectè itaque
ait, *von il s'ist mund ob os am d*

Text. *Malum ulceris carnem humidam esse ac hebetem.*
Significat namque naturam habere impedi-
mentum, quò minus debite operationes suas
peragere queat; siue sit, quia os nondum de-
bite mundatum; siue aliqua ei adhuc inha-
reat intemperies; siue quod latens lamella,
exigua quamvis, quominus natura debite of-
ficio suo fungatur, impediat. *os d'ist mund ob os am d*

Text. *Adnitendum tamen ut quàm citissime ad suppu-
rationem ulcus perducatur.* Quibus medijs sup-
puratio naturæ opus est, quo illa adnititur
materiam, quam universam sibi assimilare
nequit, saltem sibi quantum fieri potest simi-
lem efficere. Quod ut fiat, debet bene tem-
perata esse pars, ejusque innatus calor alacri-
ter beneque se habere. Nam à calore innato,
probaque temperie pendet puris laudabilis
confectio. Quidnam recreat partis laboran-
tis calorem ejusque temperamentum? ea quæ
ipsi amica ac analoga. In temperie consistit
caloris essentia, nam omnia intemperata ei
inimi-

inimica. Etiam in oleoso ac pingui illo, quod humidum primigenium vocant, suum habet calor fundamentum. Inde sequitur, quod quæcunque calent ac hument moderate, illa aptam reddunt partem, ut probum producere valeat. Talia passim recenset Galenus; ceram, scœnugræcum, melilotum, altheam, resinam terebinthinam, lentiscinam, myrrham, thus, balsamum. Verum an ne hac in parte errari potest, quærat quis? potest vel maxumè. Si quis namque initio statim parti ulcerosæ calida & humida adhibeat, suppurationem impediet. Efficiet namque, tantus uti versus laborantem locum fiat affluxus, nativus calor uti obruatur. Similiter ubi jam tempus quo suppurantibus utendum, venerit, si loco temperatè calfacientium, ijs quæ intensè calent, utaris; parte in inflammationem coniectâ, suppurationem impedies. Sic &, si sine iudicio, temperatè calidis validè siccantia permisceas aut adstringentia, suppurationem impedies; claudentur namque partis laborantis pori, impedieturque sanguinis, ad novæ carnis productionem, affluxus.

Dicat quis, Si ulcus sanari nequeat nisi suppuratio

puratio promoveatur, sint autem calida & humida suppurantia, quo pacto, intelligendum, quod dicitur, ulcus nisi siccantibus sanari non posse. Resp: Puris productionem curationem esse ulceris, non ejusdem sanationem. Est namque via ad sanationem. Purificatione enim, ab omnibus ipsi inhærentibus superfluis, liberatur pars; ijs inquam quæ actiones naturæ impedire possent. Ijs ablati, postquam sui juris facta fuerit natura, tunc sanandi tempus est. Nam sanatio, in novæ carnis productione sita est, quâ ulceris cavitas repleatur; at sarcotica siccandi vi prædita sint necesse est, uti diapuitica humectandi. Quod dico, ipse hoc dicit paragrapho Hipp: *ubi purgatum ulcus fuerit; suppurantium nempe usu, manuque chirurgi, siccius fiat necesse est*; hoc est, tum ad sarcotica accedendum; nam ab illis ulceris sanatio, uti à suppurantibus pendet curatio. *Ea namque ratione, natura ad siccitatem tendet, caroque sicca & humida producetur.* Quid posset dici elegantius.

Text. *Vbi verò purgatum ulcus erit, siccius fiat necesse est.* Est hæc præcedentium confirmatio. Quum enim dixisset, ulcus curari non posse, nisi prius nonnaturalis materia in pus versa fuerit

fuerit; jam subjicit, nihil superesse, nisi ut finis curationi imponatur, idque ulceris sanatione. quæ in eo consistit, ut nova eaque probâ carne repleatur locus ulcerosus cavus. Medicamenta hac in parte naturæ inservientia, ea sunt quæ *συνεχτικά* ab effectu Græcis, Incarnantia & Carnem producentia Latinis; in quibus hæ requiruntur conditiones. 1. nihil uti in se habeant adstrictorij. Si enim adstringant, partis sanandæ poros claudent, materiæque carnem producturæ affluxum impedient. 2. caleant uti, verum moderatè. Etenim carnis productio naturæ est actio. Naturæ in omnibus actionibus inservit calor. calor similia sibi requirit, temperata dico. 3. siccandi facultate polleant. quamdiu enim in parte vel minimum residuæ fuerit humiditatis, adeo illa flaccida manet, organum uti idoneum agenti naturæ esse nequeat. Itaque residuus ille mador absumi omninò debet, idque siccantium usu.

Eadem etiam membrana cerebri est ratio, ut quæ Tentis
osse secto exemptoque, omni conatu purgari, siccariq;
debet. Simulac os prisi ablatum fuerit, in con-
spectum protinus se dat cerebri membrana,
utpote calvæ immediate subjecta. Hæc nobis

lissimas quum peragat actiones, insignemque cum cerebro consensum obtineat, debite tractari debet, habeatque hujus curiosam rationem chirurgus, necesse est. Illud hic inculcat Hipp. iubens, convenientibus uti medicamentis detectam tractet membranam chirurgus; que vult esse siccantia, ut analogæ sint naturæ partis. Humidis si tractetur, adeo illa madida flaccidaque reddetur, ut præ respirationis vehementia se sit sublatura ac effusura per foramen in cranio factum, ac in tantum se attollet tumorem, restitui uti suo nequeat loco, unde ne ab aëre alterata inflammacionem, imò gangranam contrahat, mortemque vulnerato adferat metus oritur. Verum anne semper & quomodocumque se membrana habeat, siccantibus tractanda? Distinguo. Aut enim post ademtum os, in nativâ suâ integritate est membrana, aut alterata. Si namque per rimam quam habuit priusquam eximeretur os, stillavit in membranam sanies, eamque inflammata tumidaque fecerit. si divisa sit, continuique solutione laboret; hic certe convenientibus opus medicamentis, de quibus suo tempore. Nunc illud queritur, quasnam membranâ simpliciter denu-

data,

datâ, medicamenta conditiones habere debeant, nondum autem alteratâ, sed quibus medicamentis ejus alterationem avertere chirurgus possit. Dico Hipp. ad illud respu- cientem axioma; topica partibus applicanda analogâ esse debere, temperiei, substantiæ, naturæque laborantium partium; in hisce medicamentis vim siccandi, calfaciendi, a- crimoniam, & fragrantiam requirere. Sic- candi; nam sicca densaque membranæ est consistentia: adeò quidem, à nonnullis in- ter tunicas non membranas uti referatur. Certe adeò menyngi inimicus mador, ut non desint docti, existimantes paralyfin fieri non posse, nisi membranosa nervorum substantiâ humida nimis flaccidaque reddita, eoque ad motum inidonea facta fuerit. Membrano- sam autem quòd accipiant nervi substantiam ab hac membranâ, per eam dum transeunt, probatione non opus. Id ipsum Aph. 5. lib. 3. innuit, australes ventos *αυλότηκας* dicens; qua- tenus nempe humidus is per nares tractus aër, flaccidas efficit cerebri membranas. E- juscemodi itaque medicamentis tractanda membrana integra existens, in sua integrita- te uti maneat. Sin dolor aut inflammationis

se ostendât principia, ad lenientia paregorica deflectendum; cui fini Gal. 6. Meth. alijque rosaceum tepidum; aut oenæleum adhibent; ijsque antequam ad siccantia veniant; symptomata placant. Hoc in Galeno videntes nonnulli, ideo in medicamentis membrana applicandis incerti sunt. Male inquam distinguunt, alia requiri in membranâ integrâ, quàm alteratâ.

ὁσέον ὃ οἱ πρὸς δὴ ληποσηναὶ δεῖ ὅτι ἄλλα ὁσέου
ἐλκεῖ ἐν κεφαλῇ γυρομήν, ἐδρῆς τε ἐξουσιῶ
βέλεῖ ἐν τῷ ὁσέῳ, ἢ ἄλλως ἐπὶ περὶ ψιλῶ
θέντος τοῦ ὁσέου, ἀφίσταται ἐπὶ περὶ ἐξαίμον γυ-
ρομήν. ἀναξηραίνει γὰρ τὸ αἷμα ἐν τοῦ ὁσέου ὑπὸ
τε τοῦ χρόνου καὶ ὑπὸ φαρμάκων τῶν πλείων.
Τάχιστα δ' αὖ ληποσηναί, εἰ πρὸς ἐλκεῖ ὡς τάχι-
στα καθήκει ξηραίνειτο λοιπὸν τότε ἐλκεῖ καὶ τὸ
ὁσέον, καὶ τὸ μείζον καὶ τὸ ἥσσον. τὸ γὰρ τάχιστα
ληποξηραίνεν καὶ ληποσερακὸς, ἐν τῷ τῷ μάλιστα
ἀφίσταται ἀπὸ τῶν ἄλλων ὁσέων τῶν ἐν αἵματι τε καὶ ζῶ-
ντος αὐτῶν, ἐξαίμον τε γυρομήν καὶ ξηρὸν, πρὸς
ἐν αἵματι καὶ ζῶντι μάλιστα ἀφίσταται.

*Os autem quod capite vulnerato ab alio abscedit
asse, siue in ea teli vestigium relictum sit, siue alio-
quin*

quā plurimum nudatum, ubi exsangue redditum fuerit tunc abscedet. Absumitur autem in osse sanguis paulatim, usque medicamentorum. Festinanter vero abscedet, si quis citissime ulcere purgato, tum os siccet, idque magis minusve; quod enim cito arefcit, attenuaturque, eā de causā ab alio osse sanguinem adhuc in se habente ac vivente abscedit, quia redditum exsangue ac siccum, ab eo quod sanguinem habet vivitque, valde abscedit.

Monuit proposuitque observanda in pericranio ac menynge detectā, dabit jam non nulla ipsum concernentia cranium. Fieri quotidie videmus, naturam exiles ossis squammulas solutas ejicere: quo pacto hanc rem accelerare chirurgus queat, suppetiasque naturæ ferre, idipsum nunc tradit. Vbi notandum chirurgus, ne fissa fractave, aut semisoluta ossis fragmenta violenter separet, ac à reliquo auferat osse. Ejus namque conditionis cranium est, quamminimum lædi uti velit. Esto itaque os fissum, laminaque aliqua soluta, non quidem omni ex parte, sed semifluctuans; satis erit, portionem ejus si eximat, sicque spatium superflua ejiciendi naturæ concedat. quod reliquum est fissuræ, scalpri bene radat, ne collecta in subjectam

membranam stillet sanies. Quo facto, medicamenta quæ residuum sponte secedere faciant, admoveat. Qualia illa? siccantia, hæc namque succulentiam ossis absumendo, id efficiunt, ut exarescens os, à sano ac integro non magno secedat negotio.

Ubi ex sanguine redditum fuerit tum abscedet. Tum etenim quum nutrimento suo destituatur, necesse est à sano ac integro separetur, ut cum ejusmodi exsucca ac arescente parte nihil commune. Illud quotidie in gangræna observamus, ubi natura separat quod corruptum est, ne pars sincera trahatur. Idem in rebus externis, arborum dico, plantarumq; ramis vitio aliquo tactis, qui simulac omnimodè siccati fuerint, à reliquo quod in stirpe est succulentum secedunt. Hisce itaque id probatur, ossi siccantia deberi medicamenta.

ὅσα δὲ τῶν ὀστέων ἐσφλαται ἔσω, ἐκ τῆ φύ-
σιος τῶ ἐν αὐτῷ κατάρρα γέντα ἢ καὶ διακοπέντα
πάνυ δὴρέα, ἀκινδυνότερα τὰ τριαῦτα γίνετ'.
ἐπὶ δὲ ἡ μὲνιγξ ὑγίης ἢ. καὶ τὰ πλείοσι ῥωγμῇσιν
ἐσκατάρρα γέντα καὶ ἀρυιέρησιν, ἐπὶ ἀκινδυνότερα
(ὁ ἀμαρέσει εἰς τὴν ἀφαίρεσιν γίνετ'). (ὁ δὲ ἔχον
πύκνυν

πρίν τῷ τριτάτῳ εἰδέν. ὃ δὲ κινδυνεύει τὰ ὀστέα
 πρὸς ὁμιλίαν ἀφαιρέειν, πρὶν ἢ αὐτομάτῃ ἐπανήν.
 * εἰκὸς πρῶτον χαλάσαντες. ἐπανερχεται δὲ τῆς
 σαρκὸς ὑποφυομένης. ὑποφύεται δὲ ἐκ τῆς δι-
 πλότης ὅσας καὶ ἐκ τῆς ὑγείας, ὡς ἡ ἀνώθεν μοῖρα
 τοῦ ὀστέος μὲν σφακελίση. ἔτω δ' αὖ τάχιστα
 ἢ τε ἄρξ ὑποφύοιτο καὶ βλασάνοι, καὶ τὰ ὀστέα
 ἐπανήν, εἴ τις τὸ ἔλκεθ' ὡς τάχιστα διάπυον ποιή-
 (ας καθαρὸν ποιήσῃ). καὶ ὡς διαπαντὸς ὅσας
 ἀμφω αἱ μοῖραι ἐσφλαδῶσιν ἕως ἑτέρῳ μὴ-
 νίῃ, ἢ τε ἀνω μοίρῃ τοῦ ὀστέος ἐν ἡκάτῳ, ἢ τρυ-
 ονί ὡσαύτως τὸ ἔλκεθ' ὑγίης τάχιστα ἔσαι. καὶ
 τὰ ὀστέα τάχιστα ἐπανήν τὰ ἐσφλαδέντα
 ἔσω...

* Non dis-
 plicet quod
 nonnulli le-
 gunt εἰκο-
 ὃ πρῶτον
 χαλάσαντες
 ἐπανερχο-
 σθαι, καὶ τῇ
 σαρκὶ ὑπο-
 φυομένης.
 Quavis nec
 Mercurialis
 animadver-
 sio omnino
 rejicienda
 qui loco
 εἰκοῖς ἰκνᾶς
 legit.

Quaecunque etiā ossa à naturali suo recedentia
 statu, desidunt, vel quod perrupta aut latè præcisa
 sunt, hoc periculi minus habent ubi membrana fuerit
 inviolata: tum et quæ plurimis usque hiantibus ri-
 mis fracta sunt, minus adhuc periculi secum adse-
 runt, faciliusque eximuntur. neque horum quicquam
 secare oportet, aut conari ut cum periculo avellan-
 tur priusquam soluta sponte sint. Tum autem sponte
 sequentur, quum prius subeunte carne laxantur, quæ
 ex ossis mediotullio, ubi ossa inter se connectuntur, &
 ab eo

ab eo quod sanum est succrescit, si superior tantum ossis pars corrupta sit. Hac ratione etiam cito luxuriabit succrescetque caro, ossaque solvantur, si quam festinanter fieri poterit puris productioni incumbas. Quod si totum os desidat, ita ut utraque tam inferiore quam superiore parte membrane inhaereat, eadem ratione & citissime sanabitur ulcus, & desidentia ossa ejicientur.

Monitum alterum, cujus hic sensus: Vbi cranium læsum, fissuras fracturasve ampliores quam angustiores esse præstat. Cujus rei causæ. 1. quia fragmenta educenda, commodius manu chirurgi prehendi queunt. 2. quod sectione sive prisi non sit opus. quorum namque os exsecare, ubi spatium satis capax per quod superflua expelli possint? 3. neque violentam instituere fragmentorum avulsionem necesse est, quum sponte fluctuent: Amplæ itaque fissuræ non est, quod chirurgum terreant, sed angustæ suspectæ semper esse debent. Idem in aliarum partium vulneribus quotidie observamus: quum periculosius sit, ac difficultatis plus secum trahat, si nervus aciculâ aut tenui ligneo pungatur fragmento, quam paulo ampliore si vulneretur plagâ. nam ibi inflammationis aut convulsio-

nis oritur metus. ibi ut plurimum sectio sive major apertio manu chirurgi fiat necesse est, quæ in latiore vulnere non requiritur. Exceptionem tamen addit, siue cautionem quoad hoc monitum.

Vbi inviolata fuerit membrana. Hoc est minus periculi est, si cui machæta, majuscula cranij portio præcidatur, quam si obtuso ictu exilem tantum angustamque rimam agat, dummodo præcisione illâ, subiecta meninx læsa non sit. Cui adde, dummodo præictus vehementiâ cerebrum valide concussus commotusve non fuerit, ita ut perturbata sit animalis facultas, lacerata va cerebri vascula. Nam hæc talia quotidie, angustiore quamvis existente fissurâ, evenire solent.

Aut conari ut cum periculo avellantur, priusquam soluta sponte sint. Hoc jam illud est, quod paulo ante dictum, periculosum nimirum esse, ossis fracti fragmenta laminae sive non fluctuantes, neque in totum separatas, manu chirurgi violentiâ quadam ab integro avellere offe. Nam illa avulsio species novæ est fracturæ.

Tum autem sponte sequentur, quum prius subeunte carne. Sensus horum verborum est, tunc

temporis sponte suâ nullaque molestiâ separari secedereq; fragmenta, quum nova in ossis denudati superficie apparere incipit caro. Etenim illud semper in quocunque læsionis cranij genere fieri solet, ut postquam nihil amplius vitiosi fuerit quod abjicere natura nititur, ut inquam tum incipiat producere in superficie cranij carunculam recentem. Cujus materia est sanguis medullio contentus, is namque scalpuratione exteriori durâ cranij superficie ablatâ, exsudans, in carnem convertitur; quo natura inducit cranium, ablati perioestij loco. Hoc itaque vult, naturam tum separare ejicereq; fragmenta fissi fractive cranij, quum novam incipit producere carnem. Quum non antea? quia occupata fuit ac impedita ossis separatione, ita ut de aliâ aliquâ actione non cogitarit.

Τῶν δὲ παιδίων τὰ ὀστέα καὶ λεπτότερα ἐστὶ καὶ μαλθακώτερα διὰ τὸτο, ὅτι ὀναιμότερα ἐστὶ καὶ κοίλα. καὶ ὅτε σπινθώδεα. Ἐπεὶ πυκνὰ, ὅτε σπινθώδεα. καὶ ὑπὸ τῶν βελόνων ἴσων τῶν ὀνίων καὶ ἀδενέσεων, καὶ τρωθέντων ὁμοίως τῶν ὀστέων, καὶ τῶν νεοτέρου παιδίου καὶ μᾶλλον καὶ θάσσον ὑποπίσκειαι, ἢ τῶν πρεσβυτέρου, καὶ ἐκ ἐλάσσονος χρό-

καὶ ὅσα αὐτῷ ἄλλως μέλλῃ ἀποθανεῖσθαι ἐκ τοῦ
πρώτου, ὁ νεώτερος ἔστι πρεσβύτερος θάνατον
ἀπομύλαι.

*Puerorum vero ossa & tenuiora sunt & mollio- Text.
ra, quia sanguinis plus continent. Sunt & cavernosa,
non dura, nec densa, aut solida. Hinc fit ut cum à
pari telo aut etiam imbecilliore æquale aut etiam le-
vius vulnus acceperit tenuioris pueri os, id magis
celeriusque purulentum fiat quàm robustioris. Et si
alioquin tethale fuerit vulnus, iunior quàm etatem
habens citius perit.*

Tertium hoc monitum est. Dixit jam,
quò cranij os fuerit siccus eò citius facilius-
que sanitatem consequi, ac à reliquo osse se-
parari. Id ipsum jam exemplo puerorum pro-
bat: quorum ossa ætatis constitutionisque
corporis ratione mollia sunt, succulenta ac
sanguine plena. Hac namque de causâ eve-
nire cernimus, puer capite si vulneretur, fre-
quentius ut moriatur quàm adultus. Etenim
succulentia, qua cranium scatet ratione, fa-
cillimè putredine corripitur. Hinc itaque est,
difficiliter quòd fissa fractavé fragmenta in
illis separentur, quæ ipsis mortis causa.

Puerorum ossa molliora sunt. Cujus dicitur causæ. Text.

I. nondum enim innatus eorum calor eam acquisivit acrimoniam, copiosam uti humiditatem absumere valeat. II. quòd humido primigenio (reddente omnes corporis partes molles & flaccidas) pueri abundant. Quam facile videmus præ indecenti positu, infasciatione, aut etiam malâ assuetudine, puerorum membra indecoram induere figuram? Mollia, cerea eorum sunt ossa, quamcunque figuram facile induentia. Vnde tot gibbi? illa res macrocephalos facit, si Hipp. fides.

Text.

Sunt & cavernosa. σπηγγώδεια. (ita legendum, non uti nonnulli σκληρώδεια.) Caloris omnia penetrantis ratione. Senum ossa contrà quòd densa sint, fit, quia pervadens calor in illis deficit.

Text.

Non solida. Fragilia quidem non sunt, sed flexilia, quæque facile cedunt. Videmus puerorum capita præ valido ictu, desiderare sæpius quàm finiri aut frangi.

Text.

Iunior quàm ætatem habens, citius perit. imbecillior namque. Accedit, quod infantile cranium ob summum madorem, levi de causâ putredinem incurrat, secus ac juvenile.

Text.

Citius purulentum fiet pueri os. Nam calor
omnia


omnia regens, inque suâ conservans integritate in imbecillioribus magis deficit. Hinc ejuscemodi crania putredine, omnia corrumpente, citius corripuntur. Putredini autem nonnaturalis calor comes quum semper sit, etiam hac de causâ facile accedit inflammatio, periculosum vulneris capitis symptoma. Cui ut occurratur, suadet sequente paragrapho, terebrâ uti urgeatur. Quod ipsum tamen non leviter in pueris faciendum.

ἀλλὰ χεὶρ ἢ ψιλῶς ἢ τῇ σαρκὸς τὸ ὀστέον, προσέχοντα τὴν νόον πειρῆσθαι διαγινώσκειν ὅτι μή ἐστι τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν καὶ γινῶναι εἰ ἔρρωγε τὸ ὀστέον καὶ εἰ πφλασθῇ, ἢ μῆνιαι πέφλασθῇ. καὶ εἰ ἐδοῖς γυρομένης τοῦ βέλους πρὸς τὰς φλάσις ἢ ῥωγμὴν, ἢ ἀμφω ταῦτα. καὶ ἢ πῶς τῶν πεπόνθη τὸ ὀστέον, ἀφαιρεῖν τοῦ αἵματος τρυπάντα τὸ ὀστέον σμικρῶ περιπάνω φυλασόμενον ἐπ' ὀλίγον. λεπτότερον γὰρ τὸ ὀστέον, καὶ ὑποπολαιότερον τῶν νέων ἢ τῶν πρεσβυτέρων.


Verum oportet ubi nudatum fuerit os, id operam Tercet
dare ut cognoscas quod cerni nequit, intelligasque
num fissum sit os ac collisum, an verò non nisi colli-
sum, vel non ita incisum ut ostendat qua telum in-
federit,


ſederit, & præter id, collifum, fiſſum, aut tam hoc quam illo modo læſum ſit. Et ſi quid horum deprehendes parvo terebello os urgere oportet, ſicque ſanguinem exhaurire. adhibitâ tamen cautione, quod tenuius ſit ætate tenerâ quàm firmâ os.

Author hic iubet quod præcedente paragrapho tacite vetuiſſe videtur, ſi enim puerilia crania ratione ſucculentiaæ facillimè inflammatione putredineque infeſtentur; tum & ſi in genere citius puer quàm adultus capite ictus moriatur, reverà non facile ſecandum pueri caput. Ob id Author neque ſcalpro-
rum, multo minus exſectionis per modiolum facit mentionem, jubens ut anguſto ac ſubtili terebello foretur ſemel atque iterum locus læſus, idque eo fine, ut effuſo ebulliente ſanguine, inflammationis putrediniſque auferatur metus. Qui huc Celi locum adducunt, jubentis ut inter forandum terebellum ſæpe eximatur foraminis que altitudo conſideretur, non vident Celi illum locum puerorum capitibus convenire nequaquam poſſe, ut quæ tantum craſſitie non habent. Lamella adeo tenuis eſt, vix uti conſpici poſſit medulloſitas.



τρυπάνι καὶ ὁ ὅτι ἐστὶν στρογγύλον τρυπάνιον. Per trepanum TEST.
 hic minimè intelligit modiolum veterum,
 nam eo excindi solet cranij portio, quod
 in pueris fieri non debet; verùm terebellum
 forans non perforans. Cui rei inservire
 commodè poterit à Celso descriptum hisce
 verbis: Cap: 3. lib: 8. *Terebrarum autem duo ge-
 nera sunt: Alterum simile ei quo fabri utuntur. Al-
 terum capituli longioris, quod ab acuto mucrone inci-
 pit, deinde subito latius fit, atque iterum ab alio prin-
 cipio paulo minus quàm equaliter sursum procedit.*





Sequitur modioli tum & Trepani abaptisti
Figura.

- A *Modioli vera effigies.*
 B *Clavus, ne modiulus vacillet impediens.*
 C *Prominens limbus, prohibens ne modiulus altius mergatur.*

Nam prominens limbus notatus B. ne altius mergi queat terebra, impedit.

ὅστις δὲ μέλλει ἐκ τρωμάτων ἐν κεφαλῇ ἀπο-
 θνήσκειν, καὶ μὴ διωγὰν αὐτὸν ὑγιαίνειν, μὴ δὲ
 σωθῆναι, ἐκ τῶν τῶν σημείων χρὴ τὴν διάγνωσιν
 ποιέειν, ὅτι μέλλοντος ἀποθνήσκειν, καὶ περὶ λέγειν
 τὸ μέλλον ἔσεσθαι. πάχυν γὰρ τὰ δέ. ὁκόταν τις ὀστέον
 κατεηγός, ἢ ἐρρωγός, ἢ πεφλασμένον, ἢ ὅτῳ γὰρ
 τρώπῳ κατεηγός ἐννοήσας αἰμάρτη, καὶ μήτε ξύ-

ση, μήτε πρίση, μήτε δεόμυρον, μήτε ὅς ὡς ὑγέ-
 ᾶνται ὅς ἐς, πρὸ τῷ τεσσαρεσκαίδεκα, ἡμε-
 ρέων πρὸς ἑπλήψει ὡς ἑπτολὸν ἐν χερσὶν
 ἐν δὲ τῷ θέρει μὲν τὰς ἐπτα, ἡμέρας ὁ πύρεται
 ἑπταλαμβάνει. καὶ ἐπειδ' αὐτὸ γῆν, τ' ἔλκεται
 ἄχρουν γίνε, καὶ ἔξ αὐτῶν ἰχωρρεοὶ σμικρὸς. καὶ
 φλεγμαῖνον ἐκτέθνηκεν ἔξ αὐτῶν, καὶ γλιχράδες
 γίνε, καὶ φαίνε, ὡς πρὸς τὰς ἐπτα, χροῖον πυρ-
 ρόν, ὑποπέλιον, καὶ τὸ ὅς ἐόν σφακελίζειν τηνι-
 καῦτα ἄρχεται. καὶ γίνετα περκνόν, λεῖον δὲ, τε-
 λουταῖον, ἐπωχρον γυόμυρον ἢ ἐκλυκον. ὅτ' αὖ
 δ' ἡδὴ ὑπόπυον, ἢ ἐπὶ τῇ γλώσση φλυκταῖναι γί-
 νωνται, ἐπὶ τῶν φρονέων τελευτᾷ. ἐπὶ τῶν σπασμῶν ἑπ-
 τλαμβάνει τὰς πλείους τὰς ἐπὶ θάτερα ὅς σώμα-
 τος. καὶ μὲν ἐν τῷ ἐπὶ δεξιερὰ τὴν κεφαλῆς ἔχει
 ἔλκος, τὰ ἐπὶ δεξιά ὅς σώματος ὁ σπασμὸς
 λαμβάνει. καὶ δ' ἐν τῷ ἐπὶ δεξιά τὴν κεφαλῆς ἔχει
 τ' ἔλκος, τὰ ἐπὶ δεξιερὰ τὴν σώματος ὁ σπασμὸς
 ἐπιλαμβάνει.

Text. Cum quis ex capitis vulnere moriturus, nec ullo
 pacto sanus reddi ac evadere potest, talem moritu-
 rum hisce cognosces signis, quaeque ei eventura indi-
 cabis. Quae ubi fractum, fissum, collisum aut quocunq;
 modo solutum esse intellexeris, neque per errorem ra-
 seris

feris, secuerisque, existimans sectionem non exigere; hoc casu febris plerumque hyeme ante diem decimum-quartum, post septimum estate apparebit. Qua superveniente, vulnus colorem suum mutat, parumque saniei eructat, quodque in eo inflammatum est emoritur, fit glutinosum & salsamentum refert, colore fulvum, sublividum; tumque os corrumpi incipit, fitque nigrum, leve existens, tandemque suppalidum albicansque redditur. At verò purulentum jam cum est, oriuntur in lingua pustule, delirioque correptus moritur. Plerisque etiam alterum corporis latus convellitur. Et siquidem in sinistris capitis vulnus fuerit, dextra infestat convulsio; Sin dextra vulnerata, convelluntur sinistri lateris nervi.

Priusquam ex instituto ad pristinam quæ modio fit, deveniat, præmittit prognosin; tradens signa quibus certior redditur medicus pericliteturne vehementer vulneratus, nec ne. Vti namque egregie Celsus lib:5. Cap.26. Prudentis est, eum qui servari non potest, non attingere, nec subire speciem ejus ut occisi, quem sors ipsius peremit. Deinde ubi gravis metus sine certâ tamen desperatione est, indicare necessarijs periclitantis in difficili rem esse, ne si viستا ars malo fuerit vel ignorasse vel fefellisse videaris. Tradidit paulo ante prognostica quædam signa, etiam huc

pertinentia, verum quæ in principio vulne-
 ris locum habebant tantum, antequam ma-
 num vulnerato admoveret chirurgus: hæc
 verò locum habent etiam tum, in curatione
 quum versatur chirurgus. Sciendum namq;
 duplici de causâ ex capitis vulnere ægrum
 mori; aut quod per se vulnus lethale sit; aut
 quod lethale reddatur per accidens. Per se,
 uti cerebrum validè concussum si fuerit; si
 non tantum cranium, sed & meninges di-
 scissæ, inque ipsum penetraverit cerebrum
 telum; si basis cerebri læsa sit. His talibus ut
 plurimum statim initio lethalia adsunt sym-
 ptomata, quæ ægrum quarto aut septimo die
 abripiunt. Celsus, quænam lethalia sint in
 genere vulnera recenset, loco jam citato: ser-
 vari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stoma-
 chus, cui iocinoris portæ, cui in spinâ medulla per-
 cussa est; cuique aut pulmo medius, aut jeju-
 num, aut tenuius intestinum, aut ventriculus
 aut renes vulnerati sunt, cuive circa fauces gran-
 des venæ vel arteriæ præcisæ sunt. Vix autem ad
 sanitatem perveniunt, quibus ullâ parte pulmo, aut
 iocinoris crassum, aut membrana quæ continet cere-
 brum, aut lien, aut vulva, aut vesica, aut ul-
 lum intestinum, aut septum transversum vulne-
 ratum est. Hi quoque in ancipiti sunt, in quibus us-

que ad grandes intusque conditas Venas, in alis vel poplitibus mucro desedit. Fit vulnus per accidens lethale non unâ de causâ. Medici ac chirurgi imperitia errorve in causâ esse potest. Vti, pericranij apertionem calvæque nudationem si neglexerit; os scalpris si non purgarit; pingua aut alioquin inimica ossi si applicuerit remedia; in eximendis fragmentis, modiolive usu, membranam si violaverit; ipsis futuris scalpra modiolumve si applicuerit; caput nimis operimentis si obruerit; fragmenta non integrè soluta nimis violenter à reliquo osse abstraxerit; nullam si corporis rationem habuerit, purgationem, venæ sectionem, alterantia medicamēta, convenientem diætam si non præscripserit; ægrum genio indulgere si permiserit; de vitando aëre, potissimum intemperato, eum non monuerit. Hac namque ratione, non raro, quod per se exiguum est malum, majus curantis negligentia fit. Potest & ipse vulneratus huic rei ansam præbere, neque id inefficaciter; si namque spiritus medici monitis gulæ se mancipet (nam in fissuris aut etiam levioribus fracturis, non raro primis diebus nihil mali sentiunt vulnerati) vino se repleat; Veneri se det, aerem

quemcunque hauriat, de vindictâ indefinenter cogitet, eaque ratione animo perturbato somnum aliasque naturæ actiones impediatur, hic talis malum ipse sibi accerseret. Aut contra, animo ita si sit abjecto, omnem salutis spem uti abjiciat, & sibi indefinenter mortem proponat. Illud namque asserere possum, non unum ab hisce causis me abreptum vidisse, per se quum vulnus grave non esset. Non frustra uti moneat Hipp. Aph. i. non sufficere suo uti fungatur officio medicus, requiri etiam, partibus suis uti non desit æger. Qui maligno aliquo, eoque latente si laboraret quum vulnus inferretur affectu, sicuti venerea lue aut simili, neque de eo certiorem faciat medicum; Si corpus habuerit antea confectum multâ cacochymiâ repletum, illa namque tacitè in caput se efferet. Certe hi tales, vulnerati licet, non tamen ex vulnere moriuntur.

Text. *Neque per errorem raseris, secueris.* Vides, hic Hipp. tacitè rem, uti à nobis jam factum, distinguit: nempe, non omnes ex vulneris magnitudine, nonnullos propter negligentiam chirurgi mori. In corvos quàm ejusmodi incidere præstet magistros. Et tamen

men quotidiana se offerunt exempla.

Hyeme plerumque febris ante diem 14. Videtur Ten.
 hic ejus esse Author sententiæ, præstare ut in
 capitis vulneribus citius quam ferius se o-
 stendat febris. Hanc ad rem insignis apud
 eundem est locus 2. Protheticorum. *Præstat,* “
inquit, cum qui capite vulneratus est, neque febr- “
citare, neque sanguinis profluvium, inflammationem, “
aut dolorem aliquem pati; aut si eorum aliquod appa- “
reat, circa initia fieri, neque diu durare tutissimum “
est. Dicuntur hæc respectu causæ è qua excita-
 ri febris solet. Si namque statim initio, pri-
 mo aut secundo appareat die, illa proculdu-
 bio causam agnoscat perturbationem, humo-
 rumque ac animi commotionem quum vul-
 nus incuteretur. Cessante causâ procacitatē
 cā, ac ubi se collegerit æger, desinet illa febric-
 ula. Si verò primis diebus nihil febrile, nec
 ullum symptoma sentiat æger, seque in nullo
 versari discrimine existimet, hunc talem si
 subito, die 7. aut 14. (nihil licet in victu re-
 busve peccarit externis) ac præter expecta-
 tionem febris invadat, significatur latens ali-
 quod in cranio, cerebro, aut corpore vulne-
 rati vitium, cui quamdiu potuit restitit natu-
 ra, sed quæ tandem victa ac causæ vehemen-
 tiâ su-

tiâ superata succumbit. Ita ut causæ respectu, pejus sit, diu post, quàm protinus apparere febrem. Quoties vidimus in fissuris non conspicuis omnium symptomatum expertes primis fuisse diebus ægros, qui, collectâ paulatim loco fissuræ ac in subjectum stillante cerebrum sanie, subito mortui sunt. Ut oporteat suspicacem esse chirurgum, illudque animo firmiter impressum habere, Capitis vulnera quum maxumè arrident, tum sæpe vel maxume insidias struere.

Text. *Quæ superveniente, vulnus colorem suum, &c.* Notandum quod dicit καὶ ἐπὶ δὴν τὸ πρῶτον. nam quæ statim initio apparet, non habet tantum difficultatis respectu minoris causæ; verum superveniens aut post apparens, jam paulatim naturam fregit.

Text. *Vulnus colorem suum mutat.* Quem namque habebat vividum ac carneum colorem, in pallidum primum, tum fuscum, tandem nigricantem mutat. Deficiente nimirum calore, hincque solitâ nutritione carnisque productione unâ cessante.

Text. *Parumque sanies eruat.* Nam vulnus, deficiente expultrice facultate, siccum redditur. deficientibus autem facultatibus, paulatim ipsa

ipsa deficit actionum omnium causa Anima. Ita in Prognosticis, Coacis, alibi que pessimi signi loco semper habet, vulnus aut ulcus siccum reddi. Neque oculati id ignorant chirurgi. Nisi tamen translatio fiat materiæ, idque ex bonâ causâ. uti ei apud Paræum, cui brachij ulceribus laboranti subito siccata ulcera, quum metum iniecisset ea res chirurgis, visum saniem per intestina se effudisse.

Quodque in eo inflammatum est, emoritur. Deficiente naturâ, quæ alias inflammata in pus vertere assolet materiam.

Plurisque etiam alterum corporis latus convellitur. Hic notat quod non semel in capitis vulneribus evenisse vidimus convulsione nimirum, corripipi partes oppositi lateris, non eas in quas incidit vulnus. Cujus rei ut explicari causâ possit, duo ad hunc locum notanda. Primo, Hipp. hic non dicere quod illud semper fiat, sed quod aliquando. τὸς πλείους inquit, sæpe ac multis id accidit. Ergo non omnibus. Non enim semper id evenire, sed etiam sæpe ejusdem lateris nervos convulsione infestari, præter quotidiana exempla, etiam ostendit historia apud Hippocratem Epid: 5. Larissæ, inquit, Palamedis equiso undecim

„ annos natus, ab equo in fronte supra oculum dextrum
 „ vulnus accepit, & ad os vitium pervenisse vide-
 „ batur, ex eoque modicus sanguis profiliebat. Hic ma-
 „ gnâ sectionem ad os duplex usque pertulit, ex eo sta-
 „ tu os curationem accipiebat. Sub vigesimum diem
 „ circa aurem tumor obortus est; febris capit & rigor,
 „ indeq; tumor & dolor augebantur. Sub initia febris
 „ ex rigore cepit, & oculi, frons, ac universa facies in-
 „ tumuit. Hæc autem dextra capitis parte fere contige-
 „ runt, pervasit tamen tumor etiam ad sinistram, sed
 „ hic nullam noxam attulit. Alterum hic dicit; con-
 „ vulsionem vulnere supervenire; καὶ πασμοῦς, in-
 „ quit, Πιλαμοῦν τὴν πλεῖστον τὴν θάλασσαν τὸ σῶμα. Ita & in Coac. sect. 14. σπασμὸς τὴν πλεῖστον, θανά-
 „ σμον.

Quod itaque sæpe fiat ut capite vulneratis
 superveniat convulsio, ejus primariam dixe-
 rim causam, quod tanta fiat in capite mate-
 riæ morbificæ collectio, aut etiam quod tam
 valida oriatur in capite ob retentam ac pu-
 trescentem dictam materiam inflammatio,
 illa uti nervis communicetur, absumta ni-
 mirum præ inflammatione nativâ nervorum
 succulentia. At quam de causâ oppositi
 nervi hoc malo corripiuntur, dicat quis? re-
 sponderim, quod de læso latere adeo sollici-
 ta sit.

ta sit natura ubi malum hærere sentit, de oppositi lateris partibus minus uti cogitet. tota namque est, omnesque suas vires in id confert, læsi uti lateris partes integras servare aut pristino nitore restituere possit; hinc fit, in eas uti partes, de quibus minus cogitat, materia se infundat. Cæca etenim est natura, nullâ utitur ratione, non sollicita nisi de eo præsens quod est, de futuro minus cogitans. Ita videmus naturam morborum initijs percipientem aliquid in corpore sibi dissimile ac inimicum de eo adeo sollicitam esse, non paucas alias uti actiones negligat. Hinc enim ut plurimum fit alvus quod tum temporis officij sui immemor reddatur. Ita, quænam causa, quod in lipothymia, februm initijs exteriora frigeant, æstuantibus valde interioribus? quod natura sentiens cordi creari periculum, calorem cum sanguine universum eo trahat, de alijs partis minus cogitans. Quin & naturam videmus interdum de cerebro valde cogitantem tantâ copiâ sursum trahere calorem, inde uti delirium oriatur. Dicunt, à morbo id fieri. respondeo, non edere sed lædere actiones morbum, verum quas læsit actiones morbus, eas edit natura.

Exemplum porrò oppositi lateris convulsi;
 dextris capitis vulneratis, præbet famula
 quæ in Omilo decumbebat apud Hipp. 5.
 Epid. hæc duodecim ferme annos nata ex capiti
 „ vulnere moritur decimoquarto die, æstate mediâ, ubi
 „ impacta à quodam janua os collisum & fissum fuit.
 „ Ad futuras vero vulnus erat, quod exsectione ege-
 „ re est animadversum, sectum est autem non quan-
 „ tum oportuit, verum quod in ipso relictum fuit, in-
 „ pus versum est. octavo die rigor, febris prehendit.
 „ habebat vero non commodè. nono autem die, quod
 „ reliquum erat, exsectum est, & pus admodum exi-
 „ guum cum sanguine subesse, visum fuit, membranaque
 „ pura erat, ac somnus quidem cepit, febris vero non
 „ dimittebat. Convulsio autem manum sinistram occu-
 „ pabat quòd dextra potius parte ulcus haberet.

εἰσὶ δ' οἱ καὶ ἀπὸ πλῆκτος γίνονται. & ἔτι καὶ ἀπὸ
 λυπτὰ καὶ ἐπὶ τὰ ἡμερῶν ἐν θέρεϊ, ἢ τεσσάρων
 καὶ δέκα, ἐν χειμῶνι.

Text. Sunt & qui apoplexia corripuntur, sicq; æstate
 ante septimum, hyeme ante decimumquartum diem
 pereunt.

Fiunt interdum vulnerati apoplectici, aut
 quod materia paulatim capite collecta ejus-
 que actiones impediens, ventriculis cerebri
 subito

subitò se infundat, aut concussio commoto-
que præ ictu cerebro, turbatisq; ac in unum
confluentibus, ventriculosq;ne eâ ratione re-
plentibus animalibus spiritibus. Ita in Coac.
Sect: 14: Aph: 3. *Quibus, inquit, cerebrum vul-*
neratur, ÿs sæpe febris ac apoplexia accidunt, sicq;ue
moriuntur. De hac cerebri concussione nos in
præcedentibus plenius egimus.

ομοίῳ δὲ καὶ σημεῖα ταῦτα σημαίνει, καὶ ἐν
πρεσβυτέρῳ ἐόντι τῷ τρώματι, ἢ καὶ ἐν νεοτέρῳ.

Hæc signa idem significant, siue senex siue iuvene sit qui laborat. Tat.

Hoc est, siue in sene siue juvene vulnerato
jam dicta se ostendant signa, semper pericu-
lum denuntiant. Et quidem per se semper,
quamvis ratione subjecti differant. etenim
juvenis hisce symptomatis alacrius resistet
quàm decrepitus.

ἀλλὰ καὶ εἰ ἐννοίῃς τὸν πλεον Ἰππαραμυρόν-
τα, καὶ τῶ ἁλλών τε σημεῖον τέτω πρὸς γρόμνον,
μὲ διατρέβειν, ἀλλὰ περὶ αὐτὰ τὸ ὅσον πρὸς τὴν
μηνίγα. ἢ καὶ αὐτὰ τῷ ξυστήρι. ὅπως οὖν δὲ
γίνεσθαι καὶ ὀξέσθαι. ἔπειτα τὰ λοιπὰ ὅπως ἴ-
τε.

τεθεωρεῖν ὅπως αὐτὸ δοκῇ συμφέρον πρὸς τὸ γινώσκον ὁρᾶν.

Text. *Verum cum intelligis febrem invadere, aut aliud aliquod signum vulnerato supervenire, noli ulterius differre; os namque usque ad membranam secandum, aut scalpro radendum. Facile enim secatur ac raditur. In reliquis ea curatio adhibenda, quæ conveniens videbitur: quam ad rem diligenti intuitu opus.*

Tradidit signa evenientia capite vulneratis, & quidem illa quæ in maximo versari ægrum testantur discrimine. Quibus apparentibus jubet jam ad pristin statim deveniendum, idque aut exsectione, aut scalpturâ ad membranam usque. Vbi eam nonnulli movent difficultatem, quod in deploratis casibus à curatione abstinendum dicant, ne qui violentiâ morbi moritur, dicatur medicatione tuâ sublatus. Celsus hi citant cap: 26. lib: 5. Etiam Galenum dicentem. II. Meth. Cap: 9. *In quò insperata omninò salus est, imprudentis consilij fuerit apud vulgus infamare presidia, quæ multis fuere salutis. Ad quæ respondeo; certissimum si fuerit ægrum moriturum, omninò ab ossis sectione abstinendum esse: at verò,*

rò, quoniam quotidianis videmus exemplis
 eos de quibus desperabatur tamen convales-
 cere, institutâ prædictione, monitisque pro-
 pinquis, interdum anceps nullo remedio
 præferendum, quum crudele ac inhumanum
 sit omni spe destitutum ægrum deferere.
 Nam vel hoc mortem accelerare egro possit,
 à medico ac chirugo se deferi si animadver-
 tat. audiatur idem Celsus loco adducto: *Ubi* “
gravis metus si ne certâ tamen desperatione est, in- “
dicandum necessarijs periclitantis in difficili rem es- “
se, ne si victa ars malo fuerit vel ignorasse, vel fe- “
sellisse videatur medicus. Est & alia responsio; “
 nimirum Hipp. hic præcipere ut prisus insti-
 tuatur tum, si periculosa symptomata pri-
 mis appareant diebus, hoc est initio statim
 post inflictum vulnus, non 14 die uti præce-
 dens habebat paragraphus. Ita statuit Cel-
 sus primis verbis Cap: 4. lib: 8. *Ubi calvaria* “
pertusa, protinus requirendum est, num bilem is ho- “
mo vomuerit, num oculi ejus obcecati sint, num ob- “
mutuerit, num per nares auresve sanguis ei effluxe- “
rit, num conciderit, num sine sensu quasi dormiens “
jacuerit; atque ubi hæc apparent, scire licet necessa- “
riam, sed difficilem curationem esse. Si verò sub “
primâ curatione febris intenditur, brevesque somni “
 & ijdem

“ & ijdem per somnia tumultuosi sunt, ulcus madet,
 “ neque alitur, & in cervicibus glandula oriuntur, tum
 “ tum demum ad manum scalprum iue veniendum
 “ est.

Text. Os namque usque ad membranam secandum. Excisâ nimium utraque tabulâ quod ipsum modiololo fiat necesse est; de quo jam plenè ager.

Text. Aut scalpro radendum. Vbi fissura fuerit, caque non nisi primam infestet tabulam, conetur eam delere scalpendo: sin utramque, excindi os debet aut modiololo, aut cyclisco seu scalpro excisorio.

ὅταν δ' ἴπῃ τρώμα ἐν κεφαλῇ ἀνθρώπου ἢ πε-
 πτωμένος ἢ ἀπώπτε, ἐψιλωμένος ὃ ἔστιν, οἰδή-
 μα ἴπῃ γῆν) ἐρυθρὸν καὶ ἐρυσιπελαιώδες ἐν τῷ
 προσώπῳ, καὶ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἀμφοτέρωσιν,
 ἢ τῷ ἑτέρῳ, καὶ εἰς ἀπλοῦς οἰδήματος οδυώρ.
 καὶ πυρετὸς ἴππυ λαμβάνει, καὶ ῥίγος τὸ ἕλκος αὐτὸ
 τὸ ὑπὸ τ' ἑσάρκος καλῶς ἔχει ἰδίως, καὶ τὸ ὑπὸ τῷ
 ὀστέῳ, καὶ τὰ περιέχοντα τὸ ἕλκος ἔχει καλῶς, πλεον
 ὃ οἰδήματι τὰ ἐν τῷ προσώπῳ. καὶ ἄλλω ἀ-
 μαρτὰ δ' αὖ, μενεμίαν ἔχει τὸ οἰδήμα τ' ἀλλης
 διαίτης, τότε χρῆται κατὰ καὶ λίαν ὑποκαθη-
 ραι φαρμάκῳ, ὃ, π. χολιὴν ἄγει. καὶ ἔτω καθαρ-
 θέντῳ,

θέντ' & ὁ, τε πυρετὸς ἀφίησιν. Ἐ τὸ οἶδημα κα-
θίσταται, Ἐ ὑγὴς γίνε'. τὸ δὲ φάρμακον χεὶρ δι-
δόναι πρὸς τὴν δυνάμιν τοῦ ἀνθρώπου ὁρῶν, ὡς
ἀνέχῃ χύ' &.

*Ubi autem in capitis vulnere, siue sectio adhibita
sit siue non, osse tamen detecto, tumor rubicundus ac
ad erysipelatis naturam accedens in facie, oculis siue
alterutro siue utroque oritur, dolens ad tactum; fe-
bris item superveniat & rigor; ulcus verò quod ad
carnem attinet bono esse loco videatur; os & quæ
iuxta sunt rectè procedant, faciei tumore excepto,
neque ullus in victu error commissus sit; alvus ho-
mini solvenda medicamento quod bilem detrabit. Si
sic purgatus febris desinit, tum & tumor evanescit,
sanitati æger restituitur. In medicamento autem ex-
hibitione considerandum quomodo se vires vulnerati
habeant.*

Dixit, febre in principio apparente abs-
que morâ sectionem ossis instituendam esse;
quærat quis, annon habenda sit febris alio-
rumque symptomatum ratio. Respondet
Hipp: habendam omnino esse. Perseverante
namque, multo magis ingravescente febre,
& vires deficient, ita ut exsectionem perfer-
re æger nequiret; & quoque os ipsum phlo-

gofin à calore febrili conciperet, eoque modiolì circumactionem absque inflammatione sustinere non posset.

Text. *ἔρισμα ἐρυσιπυλατῶδες.* Est Erysipelas genus mali capitis affectibus frequenter superveniens; rubore vivido ac splendente, doloreque urente partem affligens. Tumor est non admodum se attollens; pendet namque à bilioso sanguine, qui ratione tenuitatis se in latum diffundit potius.

Text. *Ἐν facie, oculis.* Familiaris faciei est erysipelas, nam biliosus humor excitans affectum ratione levitatis sursum fertur. Quod si admodum valida fuerit natura, depellit affluentem materiam ad loca maxumè dissita, tumque in tibiâ aut pede (quæ etiam valde frequens) ostendere se solet. Hic verò, laborante capite, ideoque nequeunte procul pellere erysipelatis causam materialem, in facie se prodit.

Text. *Δολὴν ἀδὲ τὰς τὰς.* Dolet etiam non tactum neque pressum erysipelas; nam acris fervidaque a qua pendet, materia pungitivos excitare solet dolores.

Text. *Ἐν πυρετῇ.* Febris item superveniat. Absque febre raro aut nunquam est Erysipelas, utpote quam excitare

citare solet orgasmo mota bilis, aut expressa à partibus internis ad exteriores. Motus is materiæ per se fervidæ, tam ipsam, quam per quas fertur partes accendendo febrem excitat.

Et rigor. Febris quæ erysipelas comitatur Text. continua ut plurimum est. quæ tamen accessione primâ cum frigore aut rigore invadere solet, propter bilis sese moventis acrimoniam. Movent nonnulli dubium, num essenziale intermittentium signum sit rigor, ideoque unquam in continuis apparere possit. Dico posse; quamvis me non lateat in continuis subinde rigorem se ostendere, intermittentes contra rigoris esse expertes; illas dico, quarum materiâ non acri, verum miti ac humidâ putredine tacta, cum magno non movetur impetu. Continuæ contra subinde rigorem, quum incipiunt, conjunctum habent. ita causum frequenter cum rigore invadere animadvertimus. Quod verò instante crisi in continuis sæpe adsit rigor præter quotidiana exempla nobilis is Hippocratis notat Aph. 46. 4. *Si rigor frequens & iteratus, febre non desinente* (hoc est in continua) *agrum jam debilem invadat, lethale.* Ast de hoc rigore non

agimus, sed de eo qui singulis paroxysmis in febribus intermittentibus ostendere se solet.

Text. *Ulcus verò quod ad carnem attinet bono loco esse videatur.* Hisce id vult; bonum esse si erysipelas in morbis foris appareat, modo per metaptosin seu materiæ à nobilioribus ad ignobiles fiat translatione. Si namque per propagationem, propter nimiam bilis in corpore universo partevè aliquâ copiam id fiat, bonum esse vix potest. Quomodo sciam? Ex ijs quæ hic traduntur signis: si namque epigenesi fiat, non aderunt bona signa, quorum hoc loco fit mentio. talem notat aph.
 „ 20. 7. *ab erysipelate, putredo aut suppuratio, malum.* & aph præcedente, *Ab ossis denudatione erysipelas, malum.* dic tu, quoniam mala comitantur signa.

Text. *Os & quæ juxta sunt, rectè procedat.* Hæc ostendunt eum de erysipelate à bonâ causâ loqui, hoc est, robore naturæ expellentis.

Text. *Alvus homini solvenda est.* Vt naturæ conatum promovendo ei suppetias feramus. Illa namque ab erysipelatis materiâ se quantum potest, liberare satagit. Quod natura abjicere nequit, id faciat cholagogo exhibito medicus.

In medicamento exhibitione vires, &c. Est hæc Textus
 cautela universalis, locum in omni præscri-
 bendâ pharmaciâ habere debens: hoc ævo
 tamen minus necessaria, quo benigna le-
 niaq; habemus pharmaca, quæ vires non fa-
 cile prosterunt. Hippocratis verò tempore,
 scammoniata, helleborata, similiaque valida
 quum in usu essent purgantia, imo turbantia,
 hæc causâ, quod hoc monitum hic ponat.
 Nam capitis vulnera valida pharmaca non
 ferunt. Vide Hipp: 2. De Morb: ubi biliosos
 affectus (qualis erysipelas) scammonio &
 colocynthide curari jubet. Reverâ in ejusce-
 modi quæ tantâ agunt violentiâ medicamen-
 torum usu, vires diligenter ponderandæ ve-
 niunt.

Περὶ δὲ πρίσι, ὅταν καταλάβῃ ἀνάγκη
 πρίσαι ἄνθρωπον, ὥστε γινώσκεν. καὶ εἰ δὲ δὲχῃ
 λαβὼν τὸ ἵμα πρίης, ἔχῃ ἐκπείειν τὸ ὅσέον
 πρὸς τὴν μηνίγχα αὐτίκα. ἔγρ' συμφέρεται
 μηνίγχα ψιλῶ εἶναι τοῦ ὅσέου πρὸς πολὺ χρόνον
 κακοπαθεῖσαν, ἀλλὰ τελευταῖον σάπη καὶ διεμύ-
 δησεν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερος κίνδυνος καὶ αὐτίκα
 ἀφαιρέσει πρὸς τὴν μηνίγχα ἐκπείσας τὸ ὅσέον,
 πρὸς τὴν ἐργῶ πρὸς πρίονι τὴν μηνίγχα. ἀλλὰ

χεὴ πρίοντα, ἐπειδὴ οὐλίγα πάνυ δὲ διαπερσί-
 ας, καὶ ἡδὴ κινέσθαι τὸ ὅσέον, πάλαι δὲ πρίοντα,
 καὶ εἰς τὴν αὐτῆς ἀποσῆναι τὸ ὅσέον. ἐν
 γὰρ τῷ διαπερσίῳ ὅσέῳ καὶ ἐπιλελεμμένῳ τὸ πρί-
 ον, οὐκ αὖ ἐπιγροῖτο κακὸν εἶναι. λεπτιὸν γὰρ τὸ
 ληρόμενον ἡδὴ γίνεσθαι. τὰ δὲ λοιπὰ ἡδὲ χεὴ ὡς αὖ
 δοκέη συμφέρειν τῷ ἔλκει.

Quum verò prisis incunda, de eâ sic statuendum.
Quod si statim initio vulneris inflicti curationi ad-
hibearis, os ad membranam usque simul ac semel ex-
scindere non oportet. Quum non expediat ablato offe
hanc diu indetectam relinqui, graviter namque lede-
retur imò putresceret ac hebes redderetur. Præter-
quam quòd aliud subsit periculum, si statim os ad
membranam usque auferas, ne inter operandum
membranam ladas. Sed inter secandum id observato,
ut postquam eò res perducta ut parum absit, quin u-
niversum os pertusum sit, jamque os vacillare inci-
pit, ab ulteriore sectione abstineas; ossique ut sponte
porro secedat, permittas. Nam ossi quod sectum est, &
sine exsectione relictum, nihil detrimenti accidere po-
test, nam quod relinquitur id tenuatur. Ad reliqua
quod attinet, ea instituenda curatio quæ ulceri con-
ferat.

Iam Prisin adgreditur, cujus causa præce-
 dentia

dentia præmifit. *πίστις* à secando & excavando nomen habet. Nam *πίων* ferram significat: inde *πίων*, *πίων* ferro, ferra seco vel findo; *πίσμα* scobs eorum quæ ferrâ secantur. *πίστης* qui ferrâ quid secat. Est namque ferra instrumentum dentatum, quo ligna lapifve secantur, cujus primam inventionem Dædalo veteres acceptam referunt. Sunt autem ferrarum varix tam apud architectos, fabros, quàm ipfos chirurgos ideæ; quas ad tria genera retulerim, ut alia sit recta, incurva alia, alia denique orbicularis: rectarum alia major, minor alia. Major, quæ Palladio lupus, est ferrula manubriata Galeno *πίων μαχαίρης* cujus ad amputandum membrum, ad auferendum, dum anatome exercetur, cranium est usus. Minor quâ interdum in cranio ad dividendam primam tabulam utuntur chirurgi. uti etiam eundem usum illis præstat ferrula incurva. Harum hæ sunt picturæ.


Orbi-



Orbicularis solis chirurgis in usu. hæc illa est, quam Modiolum Celsus ac latini vocant scriptores, idque à similitudine quæ ei cum modio (est modius mensuræ aridæ genus) modius $\chi\omicron\iota\upsilon\zeta$ græcis. inde modiolum voce diminutivâ, * $\chi\omicron\iota\upsilon\iota\omicron\iota\omicron\nu$ iidem. Quem hoc pacto describit Celsus Cap: 3. lib: 8. *Modiolus fer-amentum concavum teres est, imis oris † ferratum per quod medium clavus, ipso quoque interiore orbe cinctus demittitur.* Ejus en Iconem.

* non $\chi\omicron\iota\upsilon\iota\omicron\iota\omicron\nu$ uti in-
ceptè non-
nulli.

† legendum
omnino fer-
ratum.



Modiolus hic fuit duplex Veteribus, estq;
etiamnum hodie, vulgaris, hic depictus: tum
& * qui duplicē habet orbem, alterum suprà
alterum exstantem. Hic πρίων ἀβάπτιστος græcis.
facit namque orbis sive limbus exstans, ne
profundius mergi queat.

Hunc ita describit Galenus 6. Meth. Cap. 6.

- πινες δὲ ὑπὲρ τῆς μηδέποτε ἀμαρτεῖν, ἀβάπτιστοι στυπῶνα κατε-
σκυάσαντο. Καλῶσι ὅ οὕτως αὐτὰ, διὰ τὸ μὴ βαπτίζεσθαι ποτε.
θεῖ γὰρ ἐν κύκλῳ περιφερὲς τις ἴστος, πρὸς ἡλικίαν μικροῦ καὶ μεγάλου
τῆς κατὰ τὸ στυπῶνον ὀξείας περιέχου. εἰν δὲ δὴ παρὰ τὴν πολλὰ καὶ
ταῦτα πρὸς ἅπαν πάχους κρανία παρὰ σκευασμένα. τῶς μὲν γὰρ
παχυτέροις, τὸ μακρότερον δὲ μόνον στυπῶνον. ὀνομάζω δὲ οὕτως
ὡς μείζον ἐστὶ, τὸ μεταξὺ τῆς τοῦ ἀκροῦ πέρατος τε καὶ τῆς κυκλωτέ-
ρης ἴστος. τοῖς δὲ λεπτομερέσι, τὸ μικρότερον. *Quidam an-*
tem quominus aberrarent, tales terebellas excogita-
runt quæ mergi nequeant, quas inde ἀβάπτιστος vocant.
Circumcurrit enim parum suprà terebellæ supercilium
circulus alius parum exstans. Sane expedit complures
id genus ad manum habere, ad quamcunque cranij
crassitudinem. nam crassiori longior convenit terebra
(ita autem voco, cujus spatium quod inter summam
est cuspidem, & circulum qui exstans circumcurrit,
maius est) tenuiori brevior.

Vocat hac descriptione Galenus terebel-
lum longius aut brevius, cujus circulus fer-
reus

reus præ secundo circuitu longius breviusque
prominet. Tales terebellos Ægineta Abaptis-
mos vocat; quos hoc pacto describit lib. 6.

cap. 89. εἰ δὲ ἰσχυρὸν εἴη τὸ ὄστέον, πρῶτον τῆ το περιτρηπύσαν-
τες τοῖς ἀβαπτισμοῖς λεγομένοις. τοιαῦτα δὲ εἰσι τὰ ἔχοντα μικρὸν
ἑσώτερον τῆς ἀκμῆς ἐξοχὰς κωλύσας αὐτὰ πρὸς τὴν μὲν ἰγνα
βαπτίζεσθαι. Si autem validum fuerit os, prius illud te-
rebellis abaptismis vocatis perforato. Ejusmodi vero
sunt, quæ paulo supra acumen cuspidis eminentias ha-
bent, impediētes ne ad cerebri usque membranam de-
mergi possint.

Modiolus porrò Hipp. πρίων χαρακτός dicitur,
idque hoc loco, cum inquit. ὡς δὲ μὴ ἐξ ἀρχῆς λαμ-
βάνῃς τὸ ἵημα, ἀλλὰ παρ' ἄλλου πρῶτα δεχὴν ὑπερὶ τὴν ἰήσιν,
πρίονι χρὴ χαρακτὶ ἐμπερίν μὲν αὐτίκα τὸ ὄστέον πρὸς τὴν μὲν
ἰγνα. At si statim initio ad curandum vocatus non
fueris, sed eam ab alio tibi traditam tardius susceperis,
terebrā excavatā & serratā protinus os usque ad mem-
branam exsecabis. Per πρίονα χαρακτὸν intelligit ca-
vum Celsi modiolum; voce derivatā a χαράσσω,
χαράττω quod significat excavo, sculpo.

hæ porrò orbiculares ferræ sive modioli,
quoniam excavant, ideo terebræ latinis,
πύπανα græcis vocari solent, uti jam ex Ga-
leno & Paulo audivimus. Ne quis putet nos
terebram cum ferrā malè confundere, si in

sequentibus indifferenter vocem nunc terebræ nunc ferræ audiat. Certum namque est quod *πρίων* Hipp: latinis significet quodcunque instrumentum quo os tangitur, sive sint ferræ, modioli, terebræ, sive etiam scalptra. Audivimus namque in præcedentibus eum scalpriorum usum non semel vocasse *πρίων*. Hoc autem loco per illam voeulam, ossis excisionem quæ modiolo fit, intelligit. Ad cuius usum quod attinet, sciendum non convenire veteres in modo quo chirurgus modiolo uti debeat: Eorum namque alij naturæ negotium committendum arbitrantur, ut nimirum illa fracturas callo jungat, nulla instituta prisi. ab horum partibus Celsus est lib: 8: Cap: 4. his verbis. *In omni verò fisso fracto-
ve osse protinus antiquiores medici ad ferramenta veniebant, quibus id exciderent. Sed multò melius est ante empl. stra experiri quæ calvariae causâ componuntur. Eorumque aliquid oportet ex aceto molitum, per se super fissum fractumve os imponere, deinde super id aliquanto latius quam vulnus est, eodem medicamento illitum linteolum, & præterea succidam lanam aceto tinctam, Tunc vulnus deligare, & quotidie resolvere, similiterq; curare usque ad diem quintum. A sexto die etiam vapore aquæ calidæ per spon-*

giam

giam fovere, cetera eadem facere. Quod si caruncula
 increscere cœperit, & febricula aut soluta erit, aut le-
 nior, & cupiditas cibi reverterit, satisque somni ac-
 cedet, in eodem medicamento erit perseverandum.
 Procedente deinde tempore, emollicendum id empla-
 strum adjecto cerato ex rosâ facto, quo facilius car-
 nem producat. nam per se reprimendi vim habet.
 Hac ratione sæpè rimæ callo quodam implentur, estq;
 ea ossis velut cicatrix, & latius fracta ossa, si qua
 inter se non cohærebant, eodem callo glutinantur, est-
 que aliquanto melius velamentum cerebro, quàm
 caro quæ exciso osse increscit. Si verò sub primâ cu-
 ratione febris intenditur, brevesque somni & ijdem
 tumultuosi sunt, ulcus madet, neque alitur, & in cer-
 vicibus glandulæ oriuntur, magni dolores sunt, cibi-
 que super hæc fastidium increscit, tum demum ad manum
 scalprumque veniendum est. Ex hoc loco patet
 Celsum non oscitanter hæc scribere, quasi
 ignoraret veteres in contrariâ fuisse senten-
 tiâ, nam eos reprehendit, dicens; sed multo
 melius est. Distinguit autem rem, ut si initio
 vulneris inflicti res ægri bene succedant, ne-
 que febris, neque magna se ostendant sym-
 ptomata, ut inquam tali casu à chirurgicâ en-
 cheiresi abstineat, tantum cephalicis utatur
 emplastris quorum ope callus promoveatur:

contrà, si initio febris, aliaque se ostendant incommoda, vult tum absque morâ ad manum veniri. Cum hipp. conceptis verbis jubeat statim exsectionem ossis institui; cum hac tamen distinctione, ut si statim initio vulneris illati ineatur, utraque tabula non disseccetur; sin serius ad hoc opus accedat, os ad membranam usque excidat. Expedit sane hipp. sequi sententiam; quum sicuti in præcedentibus non semel dictum, nihil in capitîs fracturis procrastinatione calamitosius sit. Si namque differas donec febris aliaque se ostendant symptomata, experieris tunc temporis naturam paulatim fractam succumbere, neque vulneratum ullo modo sectionem perferre posse. Festinanter itaque hac in re agendum, cunctando enim hanc rem non restitues; sed in causâ crîs ut collecta fissuræ aut fracturæ loco sanies, osse corrupto se in menyngem sit præcipitatura, & eam quoque inquinatura. ita autem afflicto ægro majorem addere, quam modioli operatio adfert afflictionem, consultum minimè est.

Implorata itaque summi Dei ope, (est namque periculosa plenum alex opus) observataque quam hic adfert hipp. cautione
& rei

& rei distinctione, adgrediendum opus. Distinguit autem hanc hoc modo.

Quodsi statim initio Vulneris infligti curationi Text.
adhiberis. Non raro enim verum sapissimè,
 ne dicam ut plurimum (mos detestandus) his-
 ce locis fit, ut capite vulnerati prioribus die-
 bus nihil aut parum sentientes incommodi,
 rem parvi faciant, neque medicum aut chirur-
 gum advocent. Fit &, ut advocatus chirur-
 gus videns quoad exteriora ægrum bene va-
 lere, nihil mali suspicans pericranium non
 dividat, neque exploret, num os fissuram ha-
 beat nec ne, immemor moniti Hippocratici
 procemio hujus libri, dicens: *nullum capitis*
vulnus parvi faciendum. ut plurimum namque
 quum hæc vulnera maxumè arrident insi-
 dias struunt maxumè. morte autem præter
 omnem expectationem ægrum obruente,
 aut fefellisse aut ignorasse chirurgus clama-
 tur, redundatque in ipsam Artem medicam
 calumnia.

Os ad membranam usque simul ac semel excindere. Text.
non oportet. Hæc est distinctio quam Hipp. ad-
 fert; ut si protinus illato vulnere adhibeatur
 chirurgus, modiolique usum necessarium ju-
 dicet, ne inquam tali casu eousque modio-
 lum

lum circumagat, utraque uti cranij tabula pertusa excisaque sit. Quid itaque? pertunde inquit primam tabulam in totum, modiolum subinde auferendo; tum ut quàm altè instrumentum penetraverit animadvertas, tum ut incalescens præ circumactione ferramentum ventiles. Ad secundam ubi perveris, imprime ei vestigium modiolo, cumque pene vacillare eam videris, pertunde tantum uno loco. Quorsum? ut locus sit apertus per quem si quid sub cranio hæreat noxij expelli possit: tum & ut habeas aditum immittendo instrumento sufficientem ut aut quod reliquum est, ipsa natura porro separet; aut ut per locum pertusum immittere possis instrumentum medium inter menynghem ipsamque tabulam excindendam, quo separet membranam ab osse, ne perruptione internæ tabulæ dentato ferramento membranam vulneres. Quale hoc instrumentum dicat quis? quod ab affectu *μυρρὸφύλακα* græci vocant. Ejus mentionem facit, imò illud exactè describit Celsus Cap: 3. lib.

8. *Factis foraminibus eodem modo media sepe, sed multo circumspèctius excidenda sunt, ne forte angulus scalpri membranam violet, donec aditus fiat,*

per

per quem membrana custos immittatur, *μηρυγοφόλακα* “
græci vocant. Lamina aenea est, firma, paulum resima, “
ab exteriori parte levis, quæ demissa est, ut exterior “
pars ejus cerebro proprior sit. Subinde eī subjicitur “
quod scalpro discutiendum est, ac si excipit ejus angu- “
lum, ultra transire non patitur, eoquæ & audacius & “
tutius scalprum malleolo subindē medicus ferit, donec “
excisum undique os eadem laminā levetur tollique sine “
ullā noxa cerebri potest. “

Ejus hæc est icon




Ejusdem instrumenti mentionem facit Æ-
gineta lib: 6. Cap. 89. Galenus verò Cap: ul-
timo lib: 6. Postquam cycliscis os usque ad
membranam excusserit, ne cyclisco (qui mal-
leo adigitur) membrana violetur, lenticula-
to utitur scalpro. illud ita describens: *ἡ μὲν δὲ* “
ἐγκύκλιος πρὸς ὅσον ἐκκοπῆναι καὶ τοῖς κυκλίσκοις γυρωπῶν, “

22 ἀλλ' καὶ ἐκείνο μάλιστα πὶ μέρϑ, ἔνθα τὸ κατὰ γμα βιαίον
 23 αὐτὰ γίγνεται. πρὸς μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις, καὶ ἡ μήνιγξ ἀφίσταται
 24 ἡσα ἱσχυρῶς παθόντων ὁσῶν. ὥστε ἔδει ἐστὶ κίνδυνος ἀφίστα
 25 τῆς ἀφειώσεως ἤδη. καὶ ἡ ἀπαξ ἐν τῇ γυμνώσει μέρϑ, ὑπολαβὼν
 26 ἐκκοπεία, τὸ μὲν φακοδῆς, ὅπῃ τὸ πέρασι περὶ ἔχον ἀμβλύ καὶ
 27 λείον ἔχονται. τὸ δὲ ὀξύ, κατὰ τὸ μῆκος ὀρθιον, ὅταν σπρίξυ κατὰ
 28 τῆς μήνιγγος τὸ πλατὺ τῆς φακοδῆς ὀμιλεῖται. καὶ κατὰ πρὸς ἐκ
 29 δίσχυ τῷ κρανίῳ, καὶ τῷ τῆς πλῆν πρὸς ἀντησιν αἰλύτως ἐκποπῶ
 30 τὸ περιφερὲς πέρας τῆς φακοδῆς. ἐπὶ δὲ ἐξ ὀπίσθεν αὐτῶν πο
 31 δηγῶντι, διακόπῃων τὸ κρανίον ὁ ἐκκοπῶς αὐτός.

22 *Ceterum quod excidi oportet, id totum circulo cy-*
 23 *cliscis nudandum non est, sed eā maxumē parte qua*
 24 *fractura est gravissima. Nam præter alia, etiam mem-*
 25 *brana ipsa ab ossibus quæ valde sunt læsa, celerrimē*
 26 *recedit. adeo ut nullus sit metus eam, quæ jam sejun-*
 27 *cta est, attigisse. Si verò unam semel nudaveris par-*
 28 *tem, ac scalprium qui in cuspide præfixam habet ob-*
 29 *tusum levemque lenticulæ speciem, aciem verò per lon-*
 30 *gitudinem erectam, submiseris: ubi latam partem len-*
 31 *ticulæ super membranam statueris, series malleolo, ac*
 32 *sic calvariam divides. Evenient enim ita agentibus quæ*
 33 *requirimus omnia. nam membrana, ne si dormitans*
 34 *quidem quis agat, lata tantum lenticulæ parte occur-*
 35 *rens vulnerari potest. Lenticulati scalpri hic a*
 36 *Galeno descripti (sic dicti, quod in summitate*
 37 *ferramentum habeat rotundum & pla-*
 38 *num*

num similitudine lentem referens) hæc est p*i*-
ctura.



Hæc itaque Hippocratis sententia non esse simul ac semel modiolò pertundendam utramque cranij tabulam, verum internam una solummodo parte; ut per locum apertum immitti possit aut *μωιγγόφουλαξ* Celsi, aut scalprum lenticulatum Galeni; idque ne dum quod reliquum est internæ tabulæ exscindere voles, duram matrem lædas. Anne hæc intentio Hippocratis? ille immittendorum instrumentorum nullam facit mentionem, verum vult naturæ relinquamus tabulæ internæ separationem. patet ex ijs verbis.

Nam ossi quod sectum est & sine exsectione reli- Text.
ctum nihil accedere potest detrimenti. Quum in-
quit vestigium modiolò in secundâ feceris

K k ij

tabulâ

tabulâ, eique tantum impresseris modiolum, ut jam vacillare incipiat; insuper eandem ^{us} no loco pertuderis, tum inquam facile erit naturæ reliquam segregationem perficere. Ratio est, quia os modiololo læsum, haud aliter se habet ac fractum si esset: at verò læsum os siccatur & contabescit sponte, sicque sanum ac integrum ab eo liberari volens, illud abjicere satagit, quod ipsum exemplo ramorum in stirpibus arescentium probavimus. Sed quur non vult initio universam internam tabulam excindi? ne membranam cerebri lædas inquit. Nonne idem imminet periculum in prisi quæ aliquot diebus post inflictum vulnus instituitur? minime; Etenim tum os præ telo læsum paulatim marcescit ac siccatur, sicque membrana quæ ossi integro arctè adhæret ab osse paulatim secedit, ita ut tum periculum læsionis à modiololo non sit tantum.

Hippocrates de durâ menynge admodum est sollicitus, & merito sane, quum nobilissima sit ejus actio. progugnaculo cerebro existit, quod viscus hac de causâ facile in consensum rapit. Habet sibi insculptos nobiles illos sinus, in quibus permistio præparatioq;

fit

fit sanguinis venosi cum arterioso, affunden-
di cerebro. Profundè ipsi cerebro & sub sa-
gittali & lambdoide futurâ se immittit. Ac-
cedit, quòd universa spinalis medulla ha-
beat tegminis loco propaginem membrano-
sam ab hac menynge. Tum & omnes quot-
quot habet corpus nervi accipiunt exterius
suum velamen ab hac menynge: quæ quum
sint officia nobilissima, quam periculosum
sit hanc lædi, quis non videt? Hac de causâ u-
traque quam hic adfert Hipp. causâ mem-
branam respicit; dicit enim.

Graviter namque laderetur, imo putresceret ac Text.
bebes redderetur. Nimirum si eximas univer-
sum os. unde? nam tum exponitur aëri. at ve-
rò dissimillimus membranæ aër est. Hic
namque humidus, quum sit, illa vero siccis-
sima, magna est naturarum dissimilitudo.
Hinc dixerunt præcedentia, membranam ex-
poscere quàm siccissima medicamenta; ut-
pote naturæ suæ analogæ. Pinguibus si tra-
ctes, utpote humidis, non poterit non offen-
di. Quo sicciior, eò circum cerebrum se ten-
dit magis, firmumque ei præbet propugna-
culum: ab aëre humectata redditaque flacci-
da, concidat necesse est, cerebrique motum

impediat. Haud aliter ac tympano indutum corium, quo siccius ac tensum magis, eo clariorem edit sonum.

Text. καὶ διεμύθησεν inquit; præ madore hebes fit, marcescit, uvida redditur, μυδαῖω est nimio humore & uligine vitior, imo madore corrumpor. Ita μυδρίασις, oculi vitium, quo flaccescente ejus acies hebescit.

Text. Aliud subest periculum, ne inter operandum membranam ladas. acumine dentati acutiq̃ue modioli nimirum. Huic periculo occurri aliquo modo potest immissione menyngophylacis, aut lenticulati scalpri: at verò humectantem aërem arcere nequis.

Text. Postquam eò res perducta, ut parum absit quin universum os pertusum sit. Hoc est, postquam vestigium modiololo feceris in externam interioris tabulæ superficiem, ita ut ejus dimidia pars, imo amplius si fieri possit, pertusa sit. Nam & hæc tenuior quamvis externa, suam tamen habet crassitiem.

Text. Jamque os vacillare incipit. Pulsatum nimirum à subjectâ membranâ. Quod ut capias, ligna vide quæ ferrâ secantur; quum pene pertusa sunt, vacillare videbis. glaciem intueri quum mutatione aëris dissolvi incipit, exorto

exorto vento aquam quæ subtus movente, vacillare videbis licet dissolutam nondum.

Offi quod sectum est, & sine exsectione relictum, Text.
nihil detrimenti accidere potest. Qua de causa? nam quod relinquitur id tenuatur siccatur, nutrimento destituitur, contabescit, sicque in se corrugatum à membranâ secedit. Videmus itaque veteres triplici ratione consuluisse menyngis integritati. 1. non pertundebant universam internam tabulam. 2. utebantur meningophylaca vocato instrumento. 3. habebant terebella abaptista, quæ ita à Celso describuntur, *Alterum capituli longioris, quod ab a-* “
cuto mucrone incipit, deinde subito latius fit, atque “
iterum ab alio principio paulo minus quam equaliter “
sursum procedit. Trepanum abaptistum paulo “
ante ex Galeno descripsimus, ejusque dedimus delineationem.

Πείοντα ὃ χεῖν πυκινὰ θάλασσαν τὸν πείονα τῆς
 θερμασίης εἶνεκα τῶ ὀσέος, καὶ ὕδατι ψυχρῷ ἐνα-
 ποβάπειν. θερμαινόμενον γὰρ ὑπὸ τῆς θερμότη-
 τος, καὶ τὸ ὀστέον ἐκθερμαίνων καὶ ἀναξηρεῖ-
 νων, κατακάει. καὶ μᾶλλον ποιεῖ ἀφίστασθαι τὸ ὀστέον
 τὸ περιέχον τὴν πείον, ἢ ὅταν μέλλῃ ἀφίστασθαι,
 καὶ ὡς αὐτὴν βέλῃ ἐκπέισσαι τὸ πρὸς τὴν μη-
 νίγγα

νίγη, ἔπειτα ἀφελέειν τὸ ὅσέον, ὡς αὐτὸς χεὶρ πυ-
κινὰ τε ἔξαιρέειν τὸν πρίονα καὶ ἐναποβάπτειν τῷ
ὕδατι τῷ ψυχρῷ. καὶ οὐ μὴ ἔξ ἀρχῆς λαμβάνῃς
τὸ ἵημα, ἀλλὰ παρ' ἄλλης ἀφ' ἧς δέχῃ ὑσερίζειν
τῷ ἵσι, πρίονι χεὶρ χαλαρῶ ἐμπρίειν μὲν αὖ-
τίκα, τὸ ὅσέον αὖτε τῷ μιλίγῃ. θαμινὰ δὲ
ἔξαιρῶν τὸν πρίονα σκοπεῖσθαι καὶ ἄλλως καὶ τῇ
μήλῃ πέριξ καὶ τῷ ὁδῶν ἑὸ πρίον. καὶ γὰρ πο-
λὺ θάσσον διαπερίειναι τὸ ὅσέον, καὶ ὑπόπυόν τε ἐὼν
ἡδὴ καὶ διάπυον πείνῃ. καὶ πολλάκις τυγχάνει
ἐπιπόλαιον ἐὼν τὸ ὅσέον. ἄλλως τε καὶ καὶ ταύτη
κεφαλῆς ἢ τὸ τρώμα ἢ τυγχάνει τε πλιότερον ἐὼν
τὸ ὅσέον ἢ παχύτερον.

*Inter secandum verò ferra subinde auferenda,
attollenda, ne os incalascat, & aque frigide immer-
genda. Nam circumactiōne incalascens terebra, os ca-
lescit, siccatur, imò accendit, facitque ut plus absce-
dat ejus ossis, quod locum sectum ambit, quàm ab-
scedere oporteat. Quod si verò protinus, os ad mem-
branam usque secare animus tibi sit, sicque eximere,
terebra etiam tum sepius recipienda, frigidaeque aque
immergenda. Si verò statim initio inflati vulnēris
adhibitum non fueris, sed curationem ab altero tibi
traditam serius susceperis, acutiore & cavā terebrā
excidere os simul ac semel ad membranam usque
oportet*

oportet. quæ tamen subinde attollenda, tumque aliâ viâ tum specillo immisso ejus circuitus considerandus. Longè enim expeditius os secatur quod pus contraxit ipsumque fundit, sæpiusque os in summo fluctuans conspicitur: præcipuè eâ capitis parte inflatum si vulnus fuerit, ubi tenuius quàm crassius os existit.

Serra subinde auferenda, tollenda, & frigida immergenda. Admonitio est, encheiresin quâ uti ad excindendum os chirurgus debeat, inculcans. nimirum quum circumagi ferramentum aliquoties debeat; motus autem calorem excitet; ne nimis incalescens ipsum os in inflammationem præcipitet, monet ut aliquoties attollatur modiolus, partim ut quousque pervenerit, cognoscat, partim ut ferramentum ventiletur. Cui fini jubet aquæ frigidæ immergi. Hac de re sic Celsus Cap: 3. lib: 8. *Terebra verò, quam secundo loco posui, utendum, eaq; ne nimis incalescat, in aquam frigidam demittenda est.* Paulò ante tamen eodem capite, vult ut dum in modioli circumactione est chirurgus, instillet paulum olei rosacei vel lactis, quo magis lubricè circumagatur.

Ne os incalescat. Cranij os, in inflammationem proclive; tum quia calidâ abundat medullâ

dullâ: tum à vaporibus indefinenter e corpore ascendentibus. Hac de causâ osteotomiam quæ terebrâ fit præscripsit paulo ante Hippocrates, causamque addebat, ut calidus se effundens sanguis inflammationis metum auferat.

Text. *Facitque, ut plus abscedat ejus ossis quòd locum sectum ambit.* Hinc magis denudatur membrana, quæ aëre tacta ea incurrit symptomata, quæ jamjam retulit Hippocrates. ut non dicam, ipsum cerebrum nativo suo spoliari tegmine, in quo plus habet propugnaculi, quàm habiturum sit osse exciso.

Text. *Si verò statim initio inflicti vulneris adhibitus non fueris.* Nunc jubet, utramque tabulam simul ac semel uti modiolò exsecet chirurgus. Causa ei, quoniam tum temporis non adeo membranæ metuendum, sicuti initio vulneris inflicti. Et quænam ejus rei ratio? respondet Hippocrates, quod;

Text. *Longè expeditius os secetur, quod prius contraxit ipsumque fundit.* Sensus est, quia paulatim membrana sponte ab osse divortium facit. nam os fissum fractumve & tot diebus neglectum, corrumpitur purulentumq; redditur. Sic autem alteratum os quia solito more

non nutritur (facultates enim naturales suo non funguntur officio) paulatim nativâ destitutum succulentiâ exarescit, contrahescit, ac in se contractum à membranâ secessionem facit. Perrumpat itaque licet præter opinionem modiolus, longius tamen remotam membranam non ita lædet, uti cum ei arctè adhærescit. Nonnulli arbitrantur hoc casu paulatim saniem ex osse læso in subjectam stillare membranam, eamque suo pondere deorsum detrudere. quæ sane ratio, vel idcirco minus placet, quod licet tum exsecetur os, nullo id fiet ægri commodo, alteratam ac corruptam membranam inveniet chirurgus, sicq; in calumniam rapietur modioli usus, licet morti causam dederit nullam.

Præcipuè, eâ capitis parte inflictum vulnus si fuerit, ubi tenuius quam crassius os. Hanc ob causam periti chirurgi non abs re monent, ut studiosi, junioresque chirurgi in siccata calvâ frequenter modioli usum instituunt, loco duræ membranæ chartam ei apponendo, ut eâ tanquam sagittarijs metâ præpositâ encheiresin sibi comparent, eoque securiores reddantur, siquando in vulnerato illud opus in-

stituentum. Nam sicubi, hic certe experimentum periculo non vacat; tractatur namque pars princeps.

ἀλλὰ φυλάσσεως χρὴ ὡς μὴ λάθῃς πρὸς βαλὼν τὸν πρίονα, ἀλλ' ὅπῃ δοκῇ παχύτατον εἶναι τὸ ὅσέον, ἐς τὸ αἰὲ ἐνσηρῖζειν τὸν πρίονα, θάμινά σκοπέμεσθαι, καὶ πρὸς αὐτὸ ἀνακινέων τὸ ὅσέον ἀναβάλλειν. ἀφελὼν δὲ τὰ λοιπὰ, ἡγεσθῆναι ὡς αὐτὸ δοκῇ συμφέρεν τῷ ἔλκει. καὶ ἥν ἐξ ἀρχῆς λαβὼν τὸ ἵημα αὐτίκα βέλη ἐκπρίξας τὸ ὅσέον ἀφελῆναι ἀπὸ τῆς μήνιγτος, ὡσαύτως χρὴ πυκινὰ τε σκοπεῖσθαι τῇ μήλῃ καὶ πρὸς αὐτὸν ὅσον πρίονον, καὶ ἐς τὸ παχύτατον αἰὲς ὅσας τὸν πρίονα ἐνσηρῖζειν, καὶ ἀνακινέων βέλεσθαι ἀφελῆναι τὸ ὅσέον. ἥν δὲ τευπαῖς* πάνω* χρὴ, πρὸς δὲ τὴν μήνιγτα μὴ ἀφικνέσθαι, ἥν ἐξ ἀρχῆς λαμβάνων τὸ ἵημα† τευπαῖς, ἀλλ' ἐπιλιπεῖν τὸ ὅσας λεπτόν, ὥσπερ καὶ ἐν τῇ πρίξι γέγραπται.

* ἡγεσθῆναι non-
nulli

† Alij τευ-
παῖς

Quamobrem animadvertere oportet, ne adhibiturus terebram horum immemor sis, sed ubi crassius os ibi ferram imprimere debes; considerando interdum, osque educere tentando. Quo exemto reliqua curatio talis sit, qualem ulcus requirit. Quod si à principio, curationi adhibitus os in universum excidere tuoles, eodem

eodem modo specillo demisso ambitus modioli considerandus sæpius, ut quâ parte crassitiem maxumam os habet ei terebram apprimas, ac conare dimovendo os educere. Cum itaque terebræ occurrit usus, si statim initio curationi adhibearis, cave sis ne ad membranam usque penetret, Verum portio ossis tenuis relinquenda, sicuti jam scriptum.

Est hic nil nisi epilogus præcedentium. Iubet ut

Vbi os crassissimum ibi applicemus modiolum. Text.

Quid? necesse est is admoveatur ipsi fissuræ loco: at verò is modioli usum si non admittat (uti si in fragmenta aliquot comminutum cranium, ita ut compressionem illam ferre nequeat: aut si in ipsas inciderit futuras: si tempora læsa sint) tum uti vicinus eligatur locus, talis ubi os crassissimum.

Considerando interdum. Hoc est eximendo Text.
modiolum, ut quam fecerit impressionem cognoscere possis, ne ruditer hanc rem si instituas irruat in membranam, eamque lædat dentatum ferramentum.

Reliqua curatio talis sit, qualem ulcus requirit. Text.
Nimirum tractetur topicis siccantibus.

Vt quâ parte crassitiem maxumam os habet, eî Text.
terebram apprimas. Hoc vult, ut eâ parte for-

tius premas modiolum, idque ut loco tantum perforato spatium habeat natura, per quod ejicere superflua queat, tum & per quod idem immitti possit menyngophylax. nam agit de usu modioli qui instituitur initio vulneris illati, qui voluit ne interna tabula universim, sed uno tantum pertundatur loco; qua de re ante plenius egimus.

